

COMMENTARII
DE REBUS
IN
SCIENTIA NATVRALI
ET
MEDICINA
GESTIS.



VOLUMINIS XVIII. PARS IV.

LIPSIAE MDCCLXXIII.

APVD IOH. FRIDERICVM GLEDITSCH.

Venduntur etiam

Amstelodami apud I. Schreuder, Londini apud Io. Nourse, Parisiis apud
Briasson, Venetiis apud I. B. Pascali, Patauii apud Io. Manfrè,
Holmiae apud L. Saluium.



I.

Verhandelingen uitgegeeven door de Holland-
sche maatschappye der weetenschappen te
Haarlem XII. Deel. Te Haarlem by I. Bosch
1770. 8. Alph. 1. pl. 14 $\frac{1}{2}$ tab. aen. 10.

i. e.

Commentarii societatis scientiarum Harlemen-
sis ad annum 1770. Tom. XII.

De *structura et usu vrachi* commentatio. Auct.
I. Cl. ANT. PORTAL Medic. Prof. Monspel. ex
Francogallico translata a Cl. L. BLIKKER. Reli-
cto Auctorum, qui super hac rescripserunt, dissensu,
disquirat Noster ; 1) structuram vrachi omni aetati
conuenientem, cum eius mutationibus, quas pau-
latim subit. 2) causas eius inuestigat, ex quibus
usum determinet. 3) demonstrat, quo morbo ipse
vrachus a naturali sua forma per morbum deflectat,
quibus obseruationes, quae huc spectent, adiicit.
Constat vrachus in fetu quinque vel semestri qua-
tuor filamentis, ita inter se complicatis, vt ab um-
bilico ad vesicam fere usque vrinariam continua sibi
videantur. Hic pedis anserini ad instar a se sece-
dunt

- dunt filamenta, quorum duo partibus lateralibus adhaerent, duorum reliquorum alterum anteriorem, alterum posteriorem eius partem tangunt. Iunguntur vesicae vrinariae ita, vt superius eius tegumento non adhaereant, inferius vero cum fibris muscularibus firmiter connectantur. Filamenta haec in toto suo tractu obuoluuntur tunica cellulari peritonei, quae, fundum vesicae tegens, prolongata, vaginam mentitur, cui *tunicae vaginalis* nomen tribuit. Forma vrachi ex hac descriptione patet triangularis, cuius apex vmbilicum, basis vero fundum vesicae respiciat; fundi superior pars libere haeret in spatio isto, quod ex secessu filamentorum vrachi formatur, cum vrachus infundibulo longo, angusto tamen ventre respondeat. Continet interdum tunica ista vaginalis humorem, quo cellularis tunica distenditur, et vrachus ipse ampliatur.
- p. 9. Inter fibras musculares ibidem duo detexit spatia vacua, quae responderent secessui partis inferioris vrachi, quae ex secessu fibrarum muscularium orta ex solo textu cellulari constarent. Eadem Cel. LIEUTAUD in aliis locis tunicae muscularis vesicae inuenit *).
- p. 11. Accidit, vt in his spatiis membrana interna vesicae dilatetur, et herniam veram formet, quas in tribus infantibus et viro triginta quinque sex annorum clare reperit. **)
- p. 14. Vrachus in fetu octimestri vel in maturo nouem mensium a priore non differt, nisi vt filamenta eius paullo longius inter se superius, inferius fibris muscularibus vesicae coniungantur, vt difficile separentur: sint paulo crassiora, magis elastica, nullo vero cauo instructa, tunicae eius arctius adhaereant, ex quo superficies eius inferior minor euadat. Rarius in

*) Mémoires de l'Académie Royale des sciences année 1752. v. comm. nostr. Vol. VI. p. 650.

**) vid. ib. année 1701.

in hac humor deprehenditur. Filamenta haec iam paulatim magis cum fibris muscularibus et tunica eius firmiter coniunguntur, ita, ut concrecant, et vrachus seorsim decrescat, cuius in senio interdum non, nisi vestigia detegantur. Ex iis, quae examinavit, cadaueribus asserit Noster, vrachum, quo propior fetus ad partum fuerit, eo maiorem fuisse. Hinc etiam usum, quem habeat vrachus in fetu, determinat, quod fluctuantem vesicam firmet, ne ea, ob angustam cauitatem peluis, extra sedem idoneam prolaberetur; qui vero usus in infantibus cessat. Cum enim vesica urinaria tum aliam sedem aliamque faciem accipiat, vrachus etiam mutetur necesse est: hinc filamenta coeunt et ligamentum verum formant. Urinam, in quibusdam aegris per vrachum excretam, ex superioribus declarat causas: quibus patuit, duo inueniri spatia vacua, ex quibus etiam vera hernia oriatur. His itaque in vesica praesentibus, impedimento vero urinae, per viam naturalem excernendae, obiecto, eam hac praeternaturali via excerni non improbabile videtur. Haec exemplo quodam declarat. *Bartholomaeus Rossignot* chirurgus Cahuzacensis, aetate 82 annorum, vita laboriosa, qua etiam multum equitauerat, peracta, dolores vehementer in pene et vrethra vagos sensit, ut etiam urina, quo minus excerneretur, impediretur. Medicamentis diureticis frustra tentatis, cerei applicati sunt absque leuamine; urina potius diebus nonnullis post per umbilicum excreta videbatur, ut etiam tunc per vrethram exire plane cessaret. His ad sextum mensem durantibus aeger obiit. Secto cadauere, Noster canalem coniformem, ab umbilico ad vesicam usque tendentem, detexit, cuius diameter ad umbilicum tertiam partem digiti, ad vesicam vnum et semi digitum, longitudo vero sex digitos aequauit. Vesica collapsa paruo pomor-
p. 18.
p. 20.
p. 25.

respondit, cuius tunicae admodum crassae, collum valde durum et rugosum; exitus vero plane clausus erat. Vesicam vrinariam ita collapsam deprehensam esse, Cl. Auctori notatu dignissimum videtur.

p. 31.

2.) *Commentatio de praeparatione et utilitate pulveris hypnotici, cum adiecta curationis historia, vigiliae chronicae, usu huius pulveris levatae.* Auct. Cl. SAMUEL CHRIST. KRIEL. Cl. IACOBI *) pulverem commendavit, qui, ex regno minerali praeparatus, hoc haberet praecipui, ut somnum naturalem produceret, dolores compesceret, nec iis symptomatis, quae opium sequerentur, stipatus esset. Hunc igitur pulverem, quo obscuriores Nostro videntur Cl. Auctoris et descriptio, et praeparatio, eo paulo studiosius investigare suum esse duxit, quo paullo clarius et partes eius constituentes, verum praeparandi modum, nec non, quas Cl. IACOBI asserit, declararet virtutes.

p. 34.

Iam adhibuit aquae calcis viuae libras duas, salis tartari, vel cinerum clauellatorum vncias duas, florumque sulphuris vncias quatuor; haec in phialam immissa, igne in balneo arenae eo usque tractavit, quo flores sulphuris euoluti ascenderent; His frigefactis, ouaque corrupta redolentibus et per filtrum colatis, donec colorem pellucidum aureumque ostenderent, adiecit mercurii viui purissimi vncias duas, quam deinde totam massam in cucurbitam vitream immittens, spiritus nitri fumantis vncias quatuor, vel quantum ad extinctionem mercurii satis esset, superimpofuit: Priore tum solutione falsa
florum

*) vid. T. I. Act. nou. Academ. Caesar. in appendice p. 165. seq. vbi I. C. IACOBI dissertatio de viribus hypnoticis, a minerali regno haud alienis inserta legitur. vid. comm. nostr. Vol. VII. p. 153.

florum sulphuris in vas, ex porcellana confectum, reposita, alteram mercurii solutionem sensim instillans, massam instrumento quodam agitavit, quo eo melius misceretur: hinc sub qualibet guttula effervescentiam ortam, pulveremque nigrum praecipitatum vidit; effervescentia vero cessante, requieuit Noster, et, cum omnia iuste separata viderentur, liquidum a pulvere praecipitato prudenter, ut decet, segregavit, pulveremque aqua pura eo usque edulcoravit, donec nullum saporis falsi vestigium relinqueretur, tandemque eum in aere vel sole, calorem sani hominis non superante, exsiccauit, et in mortario vitreo bene tritum ad usum suum reposuit.

Ex liquido falso, iuste ad pelliculam euaporato, p. 36.
cristallos, nitro regenerato vere similes, obtinuit.

Pulvis noster cum aethiope minerali convenire videtur, nisi ut color eius ruber sit paulo obscurior, odor vero ad narcoticam indolem accedat. Hunc pulverem Cl. IACOBI descriptioni ex omni parte respondere, per sequentem historiam morbi probari asserit Noster. p. 37.

Quinquagenarius macilenti habitus, proceraeque staturae, studiis admodum vacans, doloribus capitis pertinacissimis, grauibque saepius affectus est febribus. Nostrum d. 15. maii 1769 consulens, de vigilia iam per annum continua, nullis medicamentis, nec opio ipsi de cente, quaestus est. Nam absque leuamine hactenus, venae sectionibus, pediluviis, clysmatibus, laxantibus, ipsoque opio capiti externe applicato, cum diluente et frigidiora diaeta usus est. Cum nulla, nec anamnestic, nec diagnostica adessent signa, ex quibus ad causam proximam vigiliae concluderet, eam haud imprudenter ex doloribus praegressis vehementissimis capitis deriuavit. Tentavit primum scrupulum semis huius pulveris pro dosi, ante quam cubitum iret, sumendum, cum effectu bono, nec tamen constanti; duplicem p. 41.

deinde propinauit dosin, et aeger, symptomatis omnibus cessantibus, optima fruiſtus eſt ſanitate. Comparat porro Noſter puluerem hunc cum opio, cui virtute ſua praeſertur, et demonſtrat tandem ex ipſa particularum conſtituentium indole modum, quo pulvis in corpus noſtrum agat.

P. 45. 3.) *Commentarius ſuper agricultura Brabandenſium et Vlamiagarum emendata.* Auſtore Cl. I O S U A VAN IPEREN.

P. 121. 4) *Tractatus de praeparatione olei animalis* DIPPELII Auſt. Cl. B. TIEBOEL, pharmaceuta Groningenſi. Cum oleum hoc non ubiuis, quo medicus iuſte vta-
tur, habeatur; methodus vero praeparandi apud Auſtoreſ ſit varia, ſuam, qua eiſmodi oleum bonae notae confecit, communicat Noſter. Quo modo Cl. DIPPELIUS oleum hoc praeparauit, patet; eum vero falſo huius inuentorem dici, ex eo conſtat, quod ante eum Cel. HELMONTIUS eiſ iam meminertit *). Omiſſis vero Auſtorum, quorum catalogum Noſter infert, de hoc oleo ſententiis, praeparandique eiſ modo, tres communicat proceſſus, quibus hoc oleum vario modo idem produxit.

P. 135. Olei cornu cerui foetidi vncias ſex poſt aliquot dies, cum nihil amplius fundum peteret, tum tribus vel quatuor partibus aquae tepidae commiſcuit, et per viginti quatuor horas leni calori, ubi quauis hora maſſam agitare, expoſuit. Aqua hac poſtmodum ſeparata, aliam ſuper infudit eodem procedendi modo: oleum tum in retortam ope tubuli metallici immiſit, ne tubulus collum retortae tangeret. Retorta deinde in balneo arenae locata recipienteque cum luto bene applicato, altero die deſtillationem leuiſſimo gradu ignis incepit. Primo guttulas roridas

*) vid. Aurora medicinae.

das in collo retortae: deinde minima spicula falis volatilis vel in collo retortae, vel ad orificium recipientis vasis, vel denique in eius interna superficie vidit. Tria olea ex quolibet processu habuit: primo oleum dilute flauum cum liquore vrinoso: deinde, alio vase recipiente applicato, sub eodem gradu ignis tres et semi vncias olei paulo purioris accepit; iam vero igne maiore admoto, nouo excipulo applicato, oleum crassius sensimque nigrius ascendit, residuo crasso asphalti ad instar vnciarum trium fere relicto. In altero processu oleum secundum, in retortam infusum, in balneo arenae denuo destillauit: primo oleum tenue flauum cum liquore vrinoso prouenit; alterum purius excolor ad tres circiter et semi vncias, et tertium colore paulo clariore cum primo et tertio oleo primi processus commiscuit. In tertio processu olei secundi duas et semi vncias in puram retortam cum eadem quantitate aquae purae immisit, loco vero vasis recipientis vitrum hypoclepticum, cuius figuram et descriptionem adiicit, applicuit, et leni tali destillatione supra duas vncias olei purissimi, fragrantissimi et pellucidissimi, sine flauo colore vel alio ingrato odore accepit, quod deinde in lagenulas ad drachmam vnā prudenter ad vsum reposuit. Annotationes tandem adiecit, quae plerumque ex processibus iam patent; quo vero diutius oleum bonum seruetur, lagenulae plenae sint oleo necesse est.

p. 138.

p. 142.

5.) *Animaduersiones physicae in vsum anthennarum insectorum.* Auctore Cl. IOB. BASTER. De vfu harum anthennarum nondum auctores inter se conueniunt, alii enim organa genitalia, alii organon odoris, alii demum auditus illis tribuunt: qua de causa Cl. Auctor studiosius paulo in hanc rem inquirens 1) ad structuram formamque externam anthennarum;

p. 164.

2) ad magnitudinem; 3) sedem; 4) situm et motum; 5) varietates anthennarum apud insecta non solum vnius generis, verum etiam vtriusque sexus; 6) declinationem vel conuenientiam anthennarum in insectis, quae vel in aere, vel in aqua, vel in terrae gremio viuunt; 7) inter nam tandem earum attendit structuram. Haec itaque omni, qua decet, examinavit diligentia. Ratione structurae formaeque externae eas in octo, Auctore Ill. LINNAEO, diuidit species, quas fuscè satis exemplis iustis declarat. Reliquis momentis, ad quae praecipue attendit, exempla idonea applicat, ex quibus hoc colligit:

P. 176. 1) se anthennas in sexu potiori maiores pluribusque articulis obseruasse, quam in sexu sequiore; 2) omnes fere admodum compositas, papilionum vero plurium valde simplices fuisse; 3) eas in papilionibus ad apices, in sphinge in medio, et in phalaena ad initium crassas inuentas esse; 4) quaedam insectorum cum anthennis alimenta quaesuisse. Cum enim papilionum anthennis solutionem sacchari affunderet, statim linguam prorigi ad hoc arripiendum vidit;

P. 178. ex his tamen phaenomenis non ad vsum anthennarum concludere ausus est Noster, nisi vt suspicaretur, insecta anthennis suis vim exercere, quae a nostris organis sensorijs plane differat, nec ideo vnquam a nobis detegenda sit. Adiicit tandem Cl. Auctor duas tabulas aeneas, in quarum priore insecta ea varia, quorum in tractatione sua meminit, cum suis anthennis; in posteriore vero eas separatim microscopio delineatas ostendit.

P. 189. 6) *Tractatus de variolis veris, eundem aegrum iterum adgressis.* Auct. Cl. GUALTH. VON DOEVE-REN. Inueteratum fere praeiudicium, *hominem non nisi semel variolis veris affici posse*, adgreditur Noster 1) ex propria experientia; 2) ex aliorum, fide dignorum

rum obseruationibus; 3) ex indole contagiosa variolarum in eos, circa aegros variolosos versantes, quamuis variolas iam perpeffi sint; 4) ex ipsis variolis, homini plus vna vice eodem contagio communicatis; et 5) demum ex vniuersali natura et conuenientia aliorum morborum contagiosorum cum variolis. Contigit Nostro, vt variolas, aegrum bis **p. 192.** inuadentes, in ipsa sua vxore obseruaret. Ea enim d. 15. aug. 1759. cum primipara esset, a contagio, tunc valde grassante affecta, variolas veras et fere confluentes, bene superauit, cum relictis earum, in facie praecipue, vestigiis, puella vero iis succubuit: Nec in vrbe quisquam fere fuit, quin hoc sciret. Anno 1768 d. 8. decemb. cum sextum fetum feliciter peperisset, bene quidem se habuit, nisi vt interdum leni insultu febrili, cum debilitate afficeretur. Die 16 symptomata variolarum contagio non grassante persentiscebantur, febris nimirum grauis cum horrore, dolore capitis, axillarum lumborumque cet. ad 18 d. durantibus; eruptione nunc vero quadam praesente, symptomata omnia cessarunt. Non satis ad eam, cum variolas spurias eas suspicaretur, attentus fuit; verum diebus quibusdam post veras, distinctas eas obseruauit, suppuratio in facie non perfecta erat; quae vero in brachio, in dorso, et lumbis conspiciebantur iustam suam scenam ludebant, vt de veris variolis dubitatio superesset plane nulla. D. 24, cum suppuratio ad statum peruenisset, Cll. CAMPER, GUMMER, BRILL, SWYGHUISEN, qui aegram ante nouem annos etiam obseruarunt, et GEUNS accessere ad aegram, qui omnes variolas istas veras iudicarunt. D. 28 exsiccabantur et 3 demum ian. 1769 omnes deciderunt cum relictis suis vestigiis. Obiectionem sibi factam, infantem **p. 200.** nimirum, matris aegrae lac sugentem, aequae ac reliquos duos infantes, circa matrem obuersantes, a vario-

variolis liberas fuisse, ita soluit, vt variolae, contagio non grassante, non ita facile plerumque infantulis communicentur, nec liberi hi ad contagium suscipiendum recte dispositi fuissent, cum Nostro eorum patre vterentur, in aetate 71 annorum nondum variolas perpeffo.

Alterum exemplum Noster habuit in puero, novem annorum, ad quem d. 13 m. 1759, contagio valde solemni, accerferetur. Ex symptomatis Noster ad variolas concludit, quas parentes ideo negabant, cum aeger anno 1754 variolis veris, auctoritate et cura Cl. EDING laborasset, quarum etiam vestigia in facie detegeret. Hinc antifebrilibus, antiphlogisticis, cet. frustra propinatis, diebus quatuor post variolae admodum copiosae eruperunt, quae, scena iusta sua finita, aegrum saluum relique-

p. 203. re. Tertium exemplum a Cl. SWYGHUISEN, strenuo aduersario contagii variolosi iterum reuerfuri, Nostro communicatum, quod adeo manifestum fuit, vt Auctor iste, praeiudicio suo abiecto, non amplius de contagio reuerfuro dubitaret. Totum deinde catalogum Auctorum fidissimorum refert, ex quibus idem patet, variolas post contagium naturale aequae, ac artificiale, eundem aegrum iterum invasisse. Porro ex experientia, quam bonis confirmat exemplis, constat, contagium hoc et aegrorum corpus totum inficere, et partes quasdam, quas contagium immediate tangat, aggredi.

p. 221. Nec minus hoc patet ex exemplis eiusmodi, copiosissimis, vbi infantes contagio varioloso vix liberati, vel post primam eruptionem alteram, vel ter-

p. 226. tiam, per quaedam intervalla experiuntur. Cum variolae cum aliis morbis contagiosis admodum conueniant: hi vero homines plus vna vice inuadere soleant, non dubitandum videtur et hoc de variolis affirmare. Probatur hoc exemplis ab hydrophobia

phobia, morbo miliari, peste humana aequae, ac bovinae, petitis. Ex adiectis tandem, quae apposuit p. 233. Noster, patet, homines per insitionem magis ad variolas subeundas disponi, quam per contagium naturale: vel eos, qui a contagio naturali per omne vitae tempus liberi fuissent, ex insitione variolas experiri.

7) Commentatio de *utilitate et damno, ex instrumento vario modo facto, redundantibus* Auct. Cl. N. YPEY. p. 243.

8) Observatio *) de *fundo uteri inverso amputato* p. 257. et curato, cum idoneis adnotationibus a Cl. G. MULLER. M. D. Appingedamensi. Puerpera, partu feliciter absoluto, extractione secundinarum gravissimis symptomatis afficiebatur. Urina post partum nulla excreta, Noster partem placentae, in vagina ad corpus quoddam rotundum adhaerentem, extraxit, quo facto urina quotidie efflueret; aluo vero clausa, nec ullis adminiculis soluenda, corpus, in vagina relictum, disquirens id in parte anteriore amplius, vaginam exacte occludens, in parte posteriore angustius, totum vero, membrana tenui glabra obvolutum et fere indolens inuenit, ita, ut de uteri fundo inverso non amplius dubitaret. Excretionibus postmodum aluinis et urinariis, quae rursus cessarent, clysmatibus et cathetere promotis, aegra melius se habuit, cum corpus hoc sensim imminueretur et orificium posset detegi, et digitum iuxta collum corporis carnosum in uterum possent immittere, usque dum aegra, ex lecto iterum surgens, hoc corpus ad labia pudendorum prolabi sentiret. Iam Cl. Auctor ad operationem accessit. Corpus ipsum
pyrum

*) Societati haec observatio communicata est a Cel. VAN DOEYEREN.

- pyrum inuersum cum petiolo mentiebatur, cui ope catheteris muliebris filum argenteum methodo Cel. LEVRET circumduxit, quod ad partem, vbi dolor sentiretur, vsque attraxit, hoc per aliquot dies continuato, corpus sensim sub ligatura delapsum est, vbi, fluido ferofo putrido promanante, reliqua pars vteri sensim sensimque ascendit, symptomata cessarunt, et
- p. 267. aegra recte conualuit. Ex phaenomenis, quae obseruauit Noster, patet fuisse *inversionem vteri imperfectam*, non vero *sarcoma*, quod paucis diebus ante operationem suspicatus erat. Nam 1) ex parte placentae relicta constat, ex imprudentia obstetricis malum hoc ortum suum duxisse; 2) corpus hoc carnosum non diu puerperio post ad oui gallinacii magnitudinem vsque imminuebatur; 3) erat intus cavum membrana polita obuolutum; 4) tandem femina haec plethorica, optima sanitate instructa, fluxum catameniorum, ante morbum, iusto tempore celebratum non amplius, quamuis infantem non lactet, experitur. Audaciam operationis Cl. Auctor ex eo defendit, quod de inuersione vteri non persuasus ad suspicionem sarcomatis peruenerit, et sub finem emendationem fili argentei, quo encheiresis perficitur, adiecit.
- p. 275. 9) *Observationes et adnotationes super frigus mense ianuario 1768.* Auct. Cl. I. C. PALIER.
- p. 291. 10) *Animaduersiones de iusto tempore, loco et modo, partes demortuas amputandi,* a Cl. IACOB VAN DER HAAR. Ex dissensu Auctorum partes gangraena, sphacelo vel quacunque labe demortuas amputandi, cum alii partem in ipso progressu gangraenae abscindi velint, alii, medicamentis antisepticis interne adhibitis, hoc naturae relinqui malint, collegit Noster, iustum tempus, locum et modum determinat.

terminandi operae pretium omnino esse. In neutram vero partem abit; medicamentis potius roborantibus, antisepticisque antea datis, naturae viam, cum iam demortua pars a sana abscedere videatur, sequi, eamque tunc amputare Cl. Auctori prudentius videtur. Iam studiosius methodum suam describit: 1) operationem non in aegro et debili, sed in emendato et in robustiore corpore tum praecipue, cum in altero latere eminentia quaedam in sana parte conspiciatur, instituendam esse; 2) partim demortuam ad vnam, duas vel tres lineas a parte vere sana cultro et ferra abscindi debere; 3) hoc in vulnere, per tempus iam quoddam suppurante, parua superficie, eminentibus marginibus fieri praestare, vnde nouum vulnus ad suppurationem sine noua inflammatione, cito peruenturum esse sperari poterit; 4) ad operationem non nisi cultrum aptum et ferram, paruum fasciarum apparatus requiri; 5) nec ligatura arteriarum opus esse, neque haemorrhagiam inde metui, cum trunci maiores arteriarum iam paulo ante demortui, retracti et occlusi videantur; 6) cutim iam ante operationem attractam, tunicam adiposam et musculos trunco firmiter adhaerentia, iam propullulante humore lymphatico, ex vasis minimis ossi sano firmitus accrescere solere; 7) suppurationem magnam ex tali methodo vix metuendam esse; 8) Et vulnus hoc multo minus, aegro non ita dolorificum, breuiusque quam aliis encheiresibus, esse sanabile. 9) Hanc methodum naturae conuenientissimam esse, nec, cum aliis partibus simul prospiciendum sit, plethoram esse metuendam; 10) tandem, si pes circa furas abscindatur, hoc commodi inde redundare, vt bene possit truncus pedi artificiali applicari. Adii-

p. 305.

p. 317.

ctas

Etas a fanis absque omni noxa abscedere
solere.

P. 334. 11) *Tractatio de noua demonstratione, quae sit pro-
portio magnitudinis a - b ad indeterminatam potentiam n.*
Auct. Cl. I. H. VAN SWINDEN.

P. 359. 12) *Commentatio super tres species arcuum coe-
lestium alborum* a Cl. IO. FLORENTIO MARTINET.

P. 373. 13) *Commentarius de duobus admodum magnis
ossibus, ad aggerem Bommelsensem repertis* a Cl. I. C.
PALIER. Accepit Noster, cum d. 14 febr. 1757
stagnum Maasense (*Maas-dyk*) iuxta pagum HEDEL
ad aggerem Bommelsensem (Bommeler-waard) fines
suos transfiret, duo admodum magna ossa, sub radi-
ces aggeris haftenus haud dubie contenta, vi vero
aquae iam in terram deiecta. Alterum erat, ex
mente Cel. CAMPERI, os femoris ex elephante,
ad libras 40, et 41 pollices Rheinlandicos longum,
in extremitate altera 28, in altera 21 et in medio
16 pollices in peripheria crassum. Color est ex
rubro brunnus et splendens; diaphysis valde dura;
in altera extremitate multae paruae apophyses po-
rosae, in altera magna porosa cauitas, 12 pollicum
perimetro conspiciuntur. Alterum erat vertebra
thoracis duarum et dimidiaae librarum, 27 digito-
rum in ambitu, cum cauo duorum digitorum et
duarum linearum in diametro, colore paullo flauio-

P. 379. re. Tres quaestiones mouet Noster 1) ad quam-
nam partem corporis haec ossa pertineant? quam
Cel. CAMPER, qui haec ossa in museo suo seruat,
soluit; 2) sic et alteram, ad quod animal pertineant?
ipse ita diluit, vt ad elephantem referret 3) quaerit
porro: an ex elephante esse possint? Academia
scientiarum Parisiensis ossis femoris, ex elephante
Regis,

Regis, qui dissectus est, longitudinem ad 2 pedes et nouem digitos refert *); cum hac vero descriptione haec omnino conuenire videtur. Icon, qua vertebra delineata conspicitur, adiecta est.

14) *Effectus fulguris solius in naue triremi anno p. 391. 1749 cum adnotationibus communicati a WILLHELMO MAY.* Cum effectus fulguris saepissime in acu magnetica conspiciantur, ita, vt a sua directione manifeste declinet: Noster hanc declinationem in vndecim acubus magneticis, in hac naue praesentibus, ex vnus fulguris effectu distincte obseruauit, cum aliae versus orientem, aliae occidentem, et aliae versus alia loca directae essent, nec vlla iustam directionem seruaret. Hanc rem eruditorum disquisitioni vltiori tradit Noster, cum omnino operae pretium sit, hanc declinationem rectius determinare, cuius commoda in rem nauticam redundarent non vulgaria. Praemisit relationem mutationum, ex effectu fulguris in naue oriundarum, ex quibus patet, fulgur circa corpora spatium vacuum effecisse, quo aer fixus, compedibus suis solutus, hos insignes effectus prodidit.

14) *Descriptio anatomica tetrodonis laevis compressi, Zonnevisch **).* Auct. Cl. MARTINO P. 413. DOMSMA, chirurgus Amstelodam. Piscis hic captus, 200 circiter librarum erat, forma fere rotunda, attamen lata non crassa: cutis aspera multo tenaci muco praedita, colore albo coeruleo, et ita firma

*) LINN. Systema Nat. P. I. p. 448.

**) LINN. System. Natur. P. I. p. 410. a quo ad amphibia refertur et dicitur. *Tetrodon mola laevis compressus cauda truncata, pinna breuissima dorsali analique annexa.* HOUTTYN *Natuurlyke historie.* Tom. VIII. P. I. *Mollensteenvisch.*

firma duraque, vt instrumentis vix cederet. Rostro (*snuit*) est instructus magno; valde duro absque pinnis narium, sub quo os paruum rotundum conspicitur, quod intus duobus magnis cartilagineo-
osseis clauditur maxillis. Ab hoc non longe distant duo oculi magni, bouis magnitudinem superantes, firmis osseis orbitis inclusi, magna copia albi, tenacis, pinguedinosi humoris praediti, et extus tenui membrana, ex ipso oculo oriunda, praeclusi. Post hos oculos oblique deorsum duae branchiae duplices, non ita magnae conspiciuntur. Postea pinna magna, ad piscis vero magnitudinem parua detegitur. Dorso valde duro et aspero gaudet, abdomine latiore, inuenitur iuxta anum admodum magna nigra pinna, singula versus caput angulum rectum faciens. Pone has pinnas anus, semicirculo ad singulam pinnam vergens ambitu inciso, nulloque fere motu instructus.

P. 417. Duae costae magnae osseae a rostro ad dorsum et anum usque procedunt. Dissecto pisce, substantiam eius Noster fere totam cartilagineam, praecipue circa anum, inuenit. Conspiciebantur in ore duae tonsillae suo loco, aculeis acus ad instar instructae, inter has glandulas tenuis membrana, ex convolutis vasis, facile explicandis erat. Branchiae internae magnae erant et cartilagineae, sub quibus in quolibet latere os firmum iugale apparuit. In pectore detectum est cor magnum, ad duas partes musculosum, et vnam album, ex substantia, piscibus propria (*viscig*) cum magnis cauis firmisque membranis. Lumina vasorum cordis digitum aequabant, cor ipsum pericardio crasso et firmo, parum liquoris continente, cingebatur. Diaphragma, eo ex corpore hominis crassius, maximam partem tendineum erat: adhaesit ei cum firmo ligamento hepatis magnum, colore flauescente, membrana firma pellu-

pellucida instructum. In medio eius magna vasa biliosa et sanguifera cum vasis lymphaticis egregie conspiciebantur; substantia vero hepatis adeo mollis erat, vt, membrana separata, in massam flauescentem oleosam conflueret. Adfixa erat superficiei eius concauae vesicula fellea, cum bile intus contenta, adeo crassa, vt cultro discindi posset. Bilis ipsa peculiari tenui membrana, vt vitellus oui, circumdata erat. Intestina crassitiem bouinorum aequarunt, tunicae intestini (vnum tantum esse videbatur) semi digitum crassae et admodum firmae erant, villosa valde rugosa est: excrementa intus non, nisi vermis longus, flauus, planus et tenax, aderant. Ventriculus superior tantum intestini pars dilatata, nec adeo magna videbatur. Spatium a faucibus ad ventriculum quatuor manus replebant, quod oesophagum Noster vocat. Valuulae in intestinis non; verum firmus satis, musculosus conspiciebatur sphincter ani. Tunicae vesicae urinae admodum firmae erant, quae magnam urinae copiam intus continebat. In latere sinistro sub diaphragmate ren magnus, rubicundus, spongiosus, multis vasis conspicuis detectus fuit. Bulbus oculi corneus fere totus, a cuius parte posteriore nervus opticus valde longus et tenuis conspiciebatur, ex quo rami in musculos oculi abierunt; muscoli vero erant magni firmi, maximam partem tendinei, praeter hos ramos nerveos alios etiam ramusculos accipiebant. Tunica coniunctiua magna est, multis vasis sanguiferis praedita, super mucum oculi antea descriptum tendebatur; cornea admodum crassa et dura, sed pellucida fuit: iris immutabilis et magna. Tunica sclerotica valde nigra, crassa et admodum splendida, facilis secessu. Retina tandem egregie in conspectum prodibat. CrySTALLINUS humor prae reliquis eminebat, firmitus cohaerens, et rotundus erat.

erat. Magna gaudebat pelluciditate, obiecta, ad instar microscopii, ad duas tertias maiora repraesentabat. Reliqua Cl. Auctori studiosius disquirere non licuit. Adiecta est icon eiusdem piscis.

15) *Observationes meteorologicae Zwanenburghenses ad annum 1769.*

Observationes et relationes societati communicatae.

p. 3. 1) *Observatio singularis piscis marini, circa tropicum cancri, detecti a Cl. IOSUA VAN IPEREN.* Absque ulteriori examine, et sine omni dissectione anatomica describit Noster tantummodo locum et modum breuissime, quibus monstrum hoc marinum conspiciebatur. Nomen ei in commentariis piscis albi (*witvisch*) inditur, ob album splendidumque colorem.

p. 6. 2) *Relatio de variolis ante partum.* Auctore E ODEM. Vxor Cl. Auctoris grauida duos liberos, variolis affectos, absque omni incommodo curans, infantem sanum quidem, in quo tamen vestigia variolarum conspicerentur, peperit. Paulo ante partum, ubi fetus absque dubio laborauit variolis, anxia fuit.

p. 8. 3) *Relatio de infante absque manu dextra nato, in cuius loco paruula manus in latere dextro pectoris conspiciebatur.* Auctore Cl. ADRIANO WOLFF. Descriptionem eius antea accepit Noster a chirurgo quodam perito. Natus est hic infans d. 13 dec. 1765 sine manu dextra: clauicula cum scapula firmissime cohaesere sine vlllo motu: eminent ex earum coniunctione sursum apophysis quaedam ossea, carne et integumentis obducta, pollicem alta, et digitum crassa. Oriunda est infra papillam mammae paruula manus intra duas costas. Corpus intra costas, et reliquum manus extra pectus conspiciuntur:

tur : palma versus sinistrum latus cum manu ipsa eiusque digitis, oblique porrectis, vergunt. Praedita est vno pollice, duobus digitis et vno paruo, praeter digitum vnum nihil deficere videtur. Digitum, phalangae et manus ipsa moueri, a se deduci et patiebatur, et infans ipse haec mouere posse videbantur. Sanus praeterea erat. D. 12 maii 1760 Noster eum ipse examinans nihil peculiaris, nisi manum hanc herpete inquinatam, et omnem eius motus spontanei defectum, obseruauit. Adiecta est icon.

4) *Obseruatio deglutitionis difficilis.* Auctore Cl. p. 13.
S. BRUGMANN. Aeger 51 annorum boni corporis habitus, multis annis deglutitione difficili laborans, tandem obiit. Cadauere aperto Noster sarcoma oui gallinacei circa cardiam inuenit, multo humore mucoso corrupto cinctum adeo, vt sinistra pars ventriculi, ab eo infecta, gangraenam iam ostenderet. Substantia sarcomatis non cohaesit amplius, poterat digitis conteri. Hic tumor absque dubitatione causam deglutitionis impeditae proximam dedit. Aliud sarcoma in fundo ventriculi ad oui anserini magnitudinem detexit cum multis carunculis carnosiss. Reliqua sana, quamquam aliquo modo mutata videbantur.

5) *Continuatio transitus difficilis ingestorum per oesophagum.* Auctore EODEM. p. 18.
Aeger 56 annorum sanus, nisi vt a iuuentute iam ad vomitus spontaneos, sine alio incommodo dispositus esset, decem hebdomadas ante mortem difficultatem deglutiendi circa cardiam sensit, quae in dies crescens aegrum adeo vexauit, vt fluida tantum posset ingerere, materiam saepius copiosam tenacem, mucosam et foetidam euomeret, symptomatisque grauissimis torqueretur, quibus tandem, appetitu omni et sapore perditis, tabe emaciatus succubuit. Multas carunculas

culas exulceratas, materia putrida corruptaque plenas, ad cardiam inuenit Noster, quibus tota pars inferior oesophagi infecta et gangraena destructa fuit, quin imo ipsum diaphragma circa foramen oesophageum cum adiacentibus partibus simili labe inquinata erant. Materia quoque copiosa putrida, nigra in ipso ventriculo paruo cum variis sarcomatibus exulceratis detecta fuit.

p. 21. 6) *Observatio duorum infantum, ex una grauida alterius septendecim dies post alterum partorum* a Cl. HENDRIK DE BOSCH. Femina 30 annorum d. 22 aug. 1767, puellam sanam pariens, ex lochiis mammisque lacte turgidis cessantibus, et ex abdomine satis tumido aliisque incommodis alium fetum, in vtero haecenus relictum, habere videbatur. Motum, in abdomine ab obstetrice perceptum, Noster non, nisi abdomen tumidum potuit detegere. Cum eidem nihil suaderet, decem diebus post officiis suis fungebatur, usque d. 7 sept. alium sanum filium pareret. Cognouit ex matre, se ad medium fere grauiditatis tempus catamenia obseruasse. Puella mortua est; filius vero bona haecenus valetudine fruitur. Adiicit postea Cl. Auctor similes obseruationes aliorum auctorum, vt inde pateret, hoc phaenomenon singulare esse.

p. 30. 7) *Observatio diabetes, paucis diebus letalis.* Auctore Cl. HERM. GER. OOSTERDYK. Vir, 52 annorum, firmo et robusto corpore, multis negotiis occupatus, copiosa emissionem vrinae per 14 dies vexatus, d. 23 mart. 1768 Nostrom consuluit. Causa eius ex relatione aegri Nostro obscura, ei cereuisiam fortem, rubrum vinum cum mixtura condensante, adstringente parumque aluminosa suavit. Sed haec aequae ac dosis postea duplex frustra fuere; nec pilulis mucilaginosi roborantibus conducentibus; diabete potius cum aliis symptomatibus, debilitate in-

inprimis, continuo incrementibus paulo post, cum intra viginti quatuor horas decem circiter lagenas urinae excreuisset, nec, dum duas non ingessisset, inter ipsam missionem urinae placide exspirauit.

8) Relatio de peculiari intestini voluulo. Auct. Cl. p. 37.

C. A. KLOEKHOF. Vir, 40 annorum, duro labori vitaeque generi aduetus, tribus vel quatuor abhinc septimanis dolores abdominis vagos sentiens, iisque, in progressu morbi incrementibus, et in duobus abdominis lateribus, praecipue circa umbilicum fixis redditus, nec ullis remediis ab iisdem liberatus sexto die obiit. Aperto cadauere, partem intestini ilei, profunde iacentem, ad sex digitos admodum inflatam, coloris feueri rubri, superius ligamento plano angusto ita constrictam vidit Noster, ut digitum vix posset transmittere. Processus vermiformis supra cum hoc intestino per tunicam pinguedinosam concretus erat. Hic processus tandem laqueum quasi formabat, in quo intestinum ileum ad confinia coli inuolutum haesit. Potu vero spirituofo hoc intestinum plane obstructum fuit, post hanc coangustationem intestini cauitas naturalis erat, vermem quendam in se continens. In eiusmodi itaque morbis dolores non tam in latere adfecto, quam potius circa umbilicum percipiuntur.

p. 39.

9) Annotationes super effectus inflammationis intestini ab EODEM. Vir, 50 annorum, euacuante ex

p. 41.

ialappa adhibito, nec post eius euacuationem aluo aperta, cibisque non facile digerendis assumtis, vehementissimos dolores colicos percepit, sub quibus tertio die post obiit. Cadauere postero die aperto, flatus summo cum impetu ex abdomine admodum tumido prorupere foetore ingratissimo: copia postmodum humoris flauo pellucis etque, cum purulenta materia commixti, effluxit. Intestina tenuia flatibus et eiusmodi humore ita distenta erant, ut

etiam, āpertura in iis cum acu facta, non collaberentur. Ileum inprimis gangraena destructum erat. Colligit ex his 1) ad suppurationem non tam solida, quam potius fluida requiri, nec semper ad eius generis destructione minimorum vasorum opus esse: patere hoc ex suppuratione, in internis vel externis membranis vasculosis oborta; 2) ex inflammatione pulmonum et pleuritide, iam in suppurationem abitura, magnos, auctore HIPPOCRATE, oriri dolores; eos vero ad partem sopiri, si pus e pectore, via sibi parata, erumpat; 3) suppurationem, quarto die post inflammationem vel etiam tardius vulgo creditam, interdum citius oriri posse, si maior vel minor eius dispositio adsit, praesertim cum inflammatio in robustis citius generetur, quam effectibus suis appareat: hinc fallaciam dierum criticorum patere. 4) Intestina, flatibus ita distenta, vt vulnere, in abdomine facto, prorumpant, nec vlla vi reponenda, flatibus suis, per inflatam acum vel alio acuto instrumento, non liberari, nisi acus ad hunc finem iuste adaptatae sint, citiusque possint applicari.

P. 46.

10) *Commentatio de cultura turfi, et regeneratione minimorum surculorum, prouti in Langstraat inveniuntur.* Auctore I. ZEILMANN, mercatore Roterodamensi.

P. 58.

11) *Relatio singularis partus, per nonnullos annos occulti.* Auct. Cl. I. BRUGMANN. Femina 48 annorum, magnos inter dolores et foetorem, officula nonnulla et membranas fetus, quem ante sex fere annos vtero gesserat, ano excreuit. Catameniis postea iuste fluentibus, obstructione paulo post urinae, inter magnos dolores hypogastrii et intestini recti, cathetere liberata, fragmenta ossea fere omnia ano deposuit, vt symptomata statim inde cederent. Intra hoc tempus iterum grauida filium sanum, adhuc
vium

viuum, enixa est. Colligit ex his, fetum hunc forte tubarium fuisse.

12) *Relatio de inuersione uteri.* Auct. EODEM. p. 62.
Femina 29 annorum plethorica mense iunio 1760 filium sanum peperit; secundinis ab obstetrice extractis, vterus inuertebatur, vt magnam partem extra pudenda propenderet. Hoc nulla arte reponendo, vrina non nisi catheteris ope, fluxit. Ad hunc vsque diem debilis quidem, sed et sana viuit, catamenia iusto tempore celebrans.

13) Communicat Cl. DAN. RADERMACHER p. 65.
quotidianas mutationes insitionis variolarum, in se ipso 1769 obseruatas. Quae hic occurrunt, sunt phaenomena, quouis die conspicua. Adiicit porro insitiones variolarum a Cl. TEN. HAAF, in Cl. VINK, patre et filio, eodem cum successu institutis. Ad- p. 89.
dit tandem rationes, cur has relationes communi-
cauerit, quae fere omnes in laudem insitionis vergunt.

14) *Chorea St. Viti per electricitatem curata.* p. 91.
Auctore Cl. MAX. IAC. DE MAN. Puella 10 annorum, rigiditate in musculis colli, qua caput versus humerum dextrum tenderetur, post febrem miliarum relicta, omnia tandem phaenomena ostendit, quae choreae St. Viti attribuunt, cum voce impedita: quam Noster per electricitatem sic curauit, vt angustam laminam auream, cuius extremitatibus ligamentulum fericeum annexerat, ceruici applicaret, vt ita ligamenta ad labia possent coniungi atque firmari; alteram eiusmodi laminam inferius spinæ dorsi apponeret, ei vero catenas cupreas adiungeret. Hac methodo, per sex circiter septimanas continuata, ita, vt ter vigesies operationem adhiberet, aegra prorsus restituta est, cum quotidie, et post quamlibet operationem et imminutionem conuulsionum, et emendationem vocis sentiret.

- p. 105. 15) Relatio *singularis in oculo sinistro symptomatis* Auct. Cl. IOB. BASTER cum annotationibus Cl. HOFFMANN. Radiis solis d. 23 dec. 1764 vehementer reflexis, oculus Cl. Auctoris sinister ita afficiebatur, vt tribus diebus post, sine externa mutatione, obscuritas in eo quaedam nasceretur, quae sensim aucta, lenteque crystallina albescente, postea flauo viridescente reddita, in verum glaucoma post annum degenerasse videretur. Huic, suatore Cel. ALBINO, nihil opponens d. 23 iunii 1768, cum soli se nimium exposuisset, ophthalmia eiusdem oculi afficiebatur, qua breui, iustis medicamentis, liberatus est. D. 29 iunii subito oculum cum doloribus tumere sentiens, emunctis naribus, summos et intolerabiles intra sexagesimam passus est dolores. Sanguis postea ex naribus et oculi canto interno effluxit, quibus melius se habuit. Sanguis, e vena missus, crassa conspiciebatur crusta inflammatoria. Fascia comprimente post sex horas deligata, glaucoma, cum nonnullis membranis et sanguine grumoso, extra corneam ruptam, palpebrae inferiori adhaerere videbatur. His, vt decet, tractatis, humoribusque effluxis, bulbus ita restitutus est, vt oculum artificialem bene posset applicare. Cl. HOFFMANN, exemplis fere eiusmodi praemissis, effectum hunc radiorum solis in membranam retinam et fibras ciliares explicare annisus est.
- p. 116. 16) Epitome literarum a Cl. PALIER ad secretarium societatis *circa singulare ouum venti* (Wind-ei) missarum. Repertum est hoc ouum in nido gallinae, quod, vti ex adiecta icone apparet, duo, sibi per funiculum connexa, repraesentare videtur oua, cum tamen vnicum sit, et in altero vitellus, in altero vero albumen contineatur. Monstrosa adicitur maxilla cum alueolo, in quo, icone delineatus, dens repertus est.

17) Communicatur *singulare meteoron*, a Cl. I. P. 119.

FLOR. MARTINET *obseruatum*, cuius icon adiecta est.

18) Obseruatio *cometae*, in *capite bonae spei* p. 121.
mensibus aprili et maio 1766 instituta a Cl. HS. EK-
STEEN.

19) Obseruatio *de exitu veneris ex disco solis*, Ba- p. 123.
tauiae d. 4. iunii 1769 in obseruatorio instituta, a Cl.
IOH. LAUR. MOHR.

20) Obseruatio *de exitu Mercurii ex disco solis*, p. 131.
d. 10 nou. 1769 ibidem facta, ab EODEM.

21) Descriptio *partium genitalium praeternaturalium* p. 135.
viri cuiusdam in xenodochio Zwollensi, cum ad-
iecto instrumento urinam excipiendi et seruandi. Auct.
Cl. IO. VELTKAMP. Io. Ioele 28 annorum, fir-
mi corporis habitus et mediocris staturae ab in-
eunte aetate ad sexum sequiorem relatus, a quo
etiam nomen accepit; a Nostro, cum barba nigra
prodiret, omnibusque fere risum moueret, exami-
natus est. Umbilicum non iusto loco, sed ad ossa p. 136.
pubis musculis abdominalibus a naturali via aberran-
tibus, ossibusque pubis non sibi inuicem annexis in-
venit, vbi herniam umbilicalem mentiebatur, sub
quo duo aderant foraminula, quibus vrina effluxit.
Subsequitur penis breuissimus cum glande parte-
que praeputii. Scrotum naturali maius in
utroque margine pilis ornatum, cum duobus testicu-
lis. Inter herniam et penem foramen detegitur, ex
quo semen emittit. Valde trahitur ad sexum sequio-
rem. Haec figura adiecta delineantur aequae, ac
peculiare instrumentum, in quod vrina excipitur,
ibidem per tempus seruatur, et tandem canali ex-
cernitur. Compositum est ex tenui lamina cu-
prea, et continet vrinae vnus ponderis quantitatem.

II.

Neue Bemerkungen und Erfahrungen zur Bereicherung der Wundarztneykunst und Medicin von IOHANN CHRISTIAN ANTON THEDEN, Königl. Preussl. dritten Generalchirurgus, Regimentsfeldscheer des hochlöbl. Artilleriecorps und Mitglied der Römischkaiserlichen Academie der Naturforscher. Berlin und Stettin bey Friedrich Nicolai, 1771. 8. Seiten 208. ohne Zuzeichnungsschrift, Einleitung, Erkläerung der Vignette und Jnhalt.

i. e.

Nouae annotationes atque obseruationes, chirurgiam et medicinam spectantes. Auctore IOANNE CHRISTIANO ANTONIO THEDEN.

Multa lectu digna hunc librum, cuius solummodo summam indicare nostri instituti ratio fert, continere, nostrumque Auctorem, qui per triginta et quod excurrit annos, Borussiae copiis, ut medicus et chirurgus, inseruit, theoriam experientia accurata ac firma stabilitam hic tradere, ex singulis, de quibus videamus, intelligent Lectores. Ex introductione, quae huius instituti rationem reddit, vidimus, Cl. THEDEN operationes chirurgicas, quantum licet, non praeter summam necessitatem admittere; rursus aquam frigidam ad inflammationes discutiendas, nec non ad alios externos morbos profligandos ex voto adhibuisse; pariter et medicamenta saturnina a GOULARDO *) laudata, iam diu ante eum vtiliter applicuisse.

In

*) v. comm. nostr. prim. decad. suppl. I. p. 113.

In prima sectione differitur de magna vtilitate inuolutionum extremitatum cum fasciis. Vfus est iis Noster cum felici successu, venaesectionibus male succedentibus: porro in hydropicis affectibus, varicibus, in vlceribus phagedaenicis, in vulneribus atque contusionibus, in aneurysmate spurio, in gangliis; ac tandem ad sedandos dolores, si operationes chirurgicae extremitatum instituantur. p. 1.

In laesione tendinis muscipuli bicipitis, ex venaesectione minus bene succedente orta, ac cum dolore ac inflammatione coniuncta, quid quod supuratione, fascias ita applicat: circumuoluit nimirum singulum digitum, fascia vnum digitum lata ac vlnam dimidiam longa, tum longa fascia cum spiralibus gyris inuoluit reliquam extremitatem superiorem. Vulneri, si adest, linteam, vnguento albo camphorato illitum, imponit. p. 6.

Eadem ratione, addito interno resoluentium, euacuantium et diureticorum remediorum vsu, quorum effectus, fasciis applicatis, inprimis validi erant, pertinacissima pedum oedemata, imo ascitem Noster sanauit et hic exemplis illustrauit. p. 8.

Miramur porro vtilitatem inuolutionum, a Nostro laudatam, in vulneribus puris ac contusionibus. Quo validiores sunt contusiones, quo grauiora sint vulnera eorumque symptomata, eo certiore effectum salutarem exspectat Noster ab inuolutionibus, atque nonnullis quoque exemplis illustrat. p. 18.

Aneurysma, per brachium totum diffusum, ac post venaesectionem relictum, inuoluto singulo digito et toto brachio vsque ad humerum per decem hebdomadas, discutiebatur vsque ad paruum nodum; qui, cum paululum incresceret inuolutionibus sepositis, denuo inuolutus, quoque euanescebat. p. 20.

cebat. Omnino aneuryfmata putat melius fasciis coerceri posse, quam sola compressione.

p. 28. Hae fasciae nec nimis laxandae, nec nimis tendendae: illud speratum effectum inanem reddit, hoc humorum motum nimium imminuit. Fasciae antea humectatae laxae sunt imponendae, ac continuo sunt humectandae. Iis enim siccatis, fasciae remittunt. Nullus locus sit a fasciis liber. Quilibet enim locus, fasciis non tectus, tumet et dolet. Fasciis applicatis cessat dolor cum reliquis symptomatibus, atque tumor. Fasciae, tum relaxatae, denuo sunt circumducendae et intendendae. Fasciarum porro sit aequalis firmitas, alias locus, ubi fascia laxius est applicata, dolet et tumet atque effectus non respondet votis. Quod si vero cutis ubique aequalem effectum in partibus, quas circumdat, sentit, oscillatio fibrarum et vasorum augetur, affluxus arcetur atque extrauasati humores discutiuntur et ad circulum humorum reducuntur. Quapropter nec absolum Nostro videtur, internis sugillationibus abdomen involuere, si muscoli eius ita nimis debiles sint, ut extrauasatorum humorum receptioni nequeant inferuire.

p. 29. In altera sectione remedii topici, quod aquam vulnerariam seu sclopetariam suam appellat Noster, utilitatem declarat, additque annotationem de repositione luxati brachii. Aqua haec composita est ex aquae acetosae, spiritus vini rectificatissimi, ana libris tribus, sacchari albi finissimi libra vna, spiritus vitrioli vnciiis decem. Laudatur haec aqua in contusionibus ac sugillationibus, tumoribus, luxationibus et ossium fracturis, in vulneribus cutaneis, in sedandis haemorrhagiis, in adustis. Applicatur haec aqua vulneraria calide et frigide ac linteamina continuo sunt humectanda, ne, iis siccatis, dolores orian-

orianantur. Relinquit haec aqua mucosi quid in cute, quod aqua vegetominerali GOULARDI ablundum est, eamque interdum cum aqua vulneraria coniungit. Rursus aquae vulnerariae, si nimis siccant, unguentum nutritum, in adustis e. gr., iungit. De luxatis partibus reponendis nonnulla monet, suamque methodum describit, quam vero hic tradere breuitas non permittit. Haemorrhagias sedavit arteriosas, amputatione mammarum, testiculorum, haec aqua. In adustis lenit dolores ac impedit suppurationem.

In tertia sectione de sedandis haemorrhagiis arteriosis sine ligatura, amputatione peracta, extirpatione mammarum ac tumorum, castratione ad cavendos motus epilepticos, qui saepe per ligaturam excitantur, agitur. Praefert itaque Noster ligaturae forcipique (*valet à batin* s. *bee à batin*) s. melius agarico, quem prorsus reiicit, simplicem arteriae deligationem cum copiosis linteis carptis atque pulvillis, emplastris glutinantibus, quoniam sese arteria ipsa retrahit atque contorquet.

p. 41.

Haemorrhagias itaque, castratione instituta, sedat Noster agarico, quoniam per ligaturam hic epilepticos motus, per totam vitam continuantes, excitatos vidit. His miseris hanc operationem suadet: superior testiculi pars aperiatur, pars epididymidis ex annulo abdominali dependens ac cum vicinis partibus concreta separetur, ac quantum licet, reponatur in abdomen. Ita tensionem epididymidis ac nervi potissimum, a qua deriuat Noster epilepsiam, quae ligatura excitatur, tolli posse censet.

p. 52.

Exempla, hanc ipsam rem illustrantia, a Nostro hic proposita, cum breuiter repeti nequeant, Cl. Auctoris conclusiones tradamus, quae, ex his derivantur

p. 58.

vantur atque in eo cernuntur, vt haemorrhagiae non adeo periculosa etiam videantur ac antea, eaeque sine ligatura tutius compesci possint ; porro vt euitentur epileptici motus, ligatura non admissa. Vndecim aegri a Nostro sunt castrati, omnes sanati, nec vlla incommoda habent, de quibus conquerantur. Generationi inseruiunt, et vir ob hydrocelen castrandus Cl. Auctori asseueravit, se esse ad hoc opus generationis recte perficiendum aptiorem ac antea.

p. 59. In quarta sectione ad haemorrhoides faccatas Noster progreditur. Pertinent hae ad haemorrhoides coecas internas, quae saepe faccos s. nodos magnos sistunt, ac in orificio ani apparent. Eiusmodi tumores, nisi sponte sese aperiunt, suadet Noster, sine periculo extirpare, nec timet de fistulosis incommodis.

p. 63. In quinta sectione de haemorrhagia arteriae intercostalis laesae sedanda, sine ligatura atque compressione a Nostro disputatur. Ob inflammationes atque mortem, quae secuta esse Noster vidit, omnes methodos de ligatura arteriae intercostalis Noster reiicit, insimulque Cl. LEBER I *) methodum, quae Nostro Cl. GERHARDI methodus emendata videtur. Ac suadet instrumentum, bis a Nostro felici cum successu adhibitum, vt folium myrti paruum formatum, ab vna parte acutum, ab altera parte autem obtusum, quocum dissecatur venitus arteria. Tum alio instrumento similis formae ab vtraque parte autem obtuso reponitur arteria ad pollicem fere dimidium ac linteis carptis seu agarico firmatur.

p. 65. In sexta sectione de inflammatione pedis, cartilaginibus vexatis agitur. Ligamenta capsularia in articulis, humoribus extrauasatis in iis collectis posse

*) v. comm. nostr. Vol. hoc p. 33.

posse feliciter aperiri, modo aeris accessus impediatur, ac tempus discussionis, maturationis et incisionis bene distinguatur, probat Noster exemplis.

In septima sectione laudatur vtilitas embrocharum in anchylosi, ac varia de altitudine, a qua guttulas in laesam partem cadere oporteat, ac de compositione illarum aquarum differuntur. p. 71.

De vulnere capitis caeso in osse occipitis cum fissura ossis parietalis dextri, in sectione octaua exemplum narratur, quod non sanatum est; cui adiungitur aliud simile, quod trepanatione, duobus annis post laesionem externam capitis feliciter administrata, ac lamella, quae separata erat interne a cranio, atque durae matri imposita, eiecta, prorsus sanitati restituebatur. p. 73.

Nona sectio pertractat trepanationem aliarum partium corporis humani praeter cranium. Putat enim Noster hoc remedio, quod et in spina ventosa atque carie ossium adhibetur, et tum vti posse chirurgos, si globuli plumbei ossa petierint, ac impressionem atque contusionem effecerint. Perforandum enim tum locum contusum atque impressum esse Noster censet. p. 78.

De vnitate ossium soluta, iis caesis aut exfoliatis, decima sectio observationes tradit. Portione ossis frontis abscissa, vulnus a Nostro purgabatur, quo vnito, emplastris glutinantibus, puluillis ac fascia capitali reflexa cum duobus capitibus firmato, intra octo dies aeger restitutus est. Item aequè feliciter, digito prorsus discisso, Auctori successit, relicta tamen eius rigiditate. p. 81.

- p. 84. Sectio vndecima continet vulnus sclopeti per genu, quod exfoliationem magni fragmenti ossis femoris minabatur, a Nostro per compressionem impeditam, ita, vt sine inflammatione, suppuratione atque exfoliatione aeger sanaretur.
- p. 87. Cl. Auctor in duodecima sectione in sclopetorum vulneribus porro suadet, musculis secundum longitudinem laesis, eos secundum latitudinem discindere. Id quod exemplis, vbi musculus deltoideus ac glutei fuerint laesi, probat.
- p. 91. In tertia et decima sectione deligationem vulnorum sclopetorum, proelio finito, persequitur, ac suadet cum aliis emollientia ac dilatationem, quae, si opus, plane non est differenda, ac dissuadet siccam atque spirituosam deligationem.
- p. 94. Quarta et decima sectio continet remediorum saturninorum, a Cl. GOULARDO *) laudatorum, effectus salutes in inflammatione, discussione, suppuratione, scabieque. Nec non GOULARDI cereos Cl. Auctor longe praefert Darandianis. Quemadmodum autem Goulardiana remedia maxime utilia censet Cl. Auctor: sic ea non noua iudicat, vti ex superioribus intelligitur, ac cum cautione adhibenda suadet.
- p. 97. Quintae et decimae sectionis summa in herniis incarceratis atque singulari omenti hernia cernitur. Laudat Noster in iis cum aliis aquam frigidam atque glaciem, nec non hanc iuuasse obseruauit, si illa inefficax fuerit. Applicuit per horam quater aquam frigidam, et vidit citos atque tardos effectus salutes, prout incarceratio diu siue breuiter durauisset.

*) v. comm. nostr. prim. decad. supplement. l. p. 113.

De cartilagineis concretionibus in genu quae p. 106.
dam in sectione decima sexta leguntur. Oriuntur
hae fortasse, vti Nostro videtur, ex glandula pressa,
fortasse et ex aliis causis. Suadet tum Noster ex-
stirpationem huius tumoris, eamque duobus exemplis
confirmat. Liberi aeris autem accessus, vulnere
facto, omni modo est impediendus. Quam ob caus-
sam patellae laesae amputationem dissuadet, atque
minus huius operationis felicem euentum, quem
Noster vidit, ex liberi aeris accessu in vulnus deriuat.

In decima septima sectione de doloribus, post p. 109.
fracturas ossium in corpore relictis, qui tempesta-
tum vicissitudine potissimum excitentur, Noster agit.
Ipse Noster hos tulit, eosque adscribit pressioni calli,
in quo impetum humorum tum maiorem sensit.
Probabile quoque Nostro videtur, hos dolores non
prius cessare posse, quam si partes laesae penitus se-
paratae, et eorum loco nouae formatae sint. Qua-
propter quoque nullum horum dolorum remedium
notum esse censet. Externe partem fasciis cum
successu inuoluit, etiam si interni dolores remanserint.

Decima octaua sectio tractat nonnullos erro- p. 111.
res medendi ex minus recte formata diagnosi.
Spontaneam atque aegro insciam alui et vrinae ex-
cretionem, ex paralyti sphincterum profectam, et post
lapsum in spinam dorsalem ab equo ortam, simul pe-
dibus motu destitutis, curare voluerunt sine cognitis
causis. Abscessum porro ad anum, ex nimio re-
frigerio huius partis, cum totum corpus insigniter
calebat, aperuerunt; sed nimis parua incisio retar-
dabat vulneris sanationem.

Decima nona sectio superuacanea atque noxia p. 120.
instrumenta chirurgica recenset. Forceps, quo
Qq 2 arripi-

arripitur arteria, (*valet à batin* seu *bee à batin*) plane a Nostro reiicitur, vti iam ex superioribus patet *). Caetera, cum iam a plerisque inutilia iudicata sint, praeterimus, ac miramur, Cl. Auctorem non plura reiecisse instrumenta chirurgica, inprimis nimis composita, quae plane nullam merentur attentionem.

p. 217. In vigesima sectione vulneris articularis manus ac brachii, vbi vlnae capitulum abscissum erat, enarratur exemplum.

p. 130. Sectio vigesima prima tractat tumores et morbos rheumaticos. Dolor est signum pathognomicum rheumatismi, eumque a catarrho distinguit. Hic in glandulis mucosis, ille in tenerrimis vasis lymphaticis nervosarum partium sedem suam figit. Rheumatismum cum dolore, febre, rubore et tumore partis appellat Noster calidum: qui prodit lympham biliosam, purpuraceam aut aliam acrimoniam, facileque in cholericos cadit: rursus in internis aequae, ac externis corporis humani partibus oritur. Rheumatismum cum dolore et tumore, sine rubore tamen et febre nuncupat frigidum. Hunc occasionem dare posse steatomati, sarcomati, sarcoceli aliisque tumoribus et vlceribus, inprimis steatomati quod a decubitu materiae rheumaticae atque arthriticae proficiscatur, Noster putat, atque nonnullis exemplis illustrat. Methodum medendi igitur dirigere debet indoles huius morbi frigida atque calida

p. 142. Vigesima secunda sectio praedicat utilitatem aquae frigidae in externis morbis, nec non internum eius usum in variis morbis. Usus est Noster aqua frigida in oedemate extremitatis totius inferioris ex clauo, imprudenter excisso, qui valde postea premebatur, dum totam hanc extremitatem

fac

*) v. supra p. 607.

saepius aqua frigida imbutis linteis felici cum successu humectabat, praemissa venaesectione. Febribus malignis laborantibus aegris in summa debilitate, mortem appropinquantem indicante, aquam frigidam non frustra adhibuit, eorumque abdomen, extremitates superiores ac inferiores humectavit, faciemque lauvit. Quo facto, propinauit analeptica, quae sequebantur sudores, aegris semper salutare. Multi, hoc remedio usi, sanati, qui vero eius usum neglexerunt, mortui sunt. Pariter melancholiam et interne maniam aqua frigida curavit.

Aequae felici successu eius interno usu interdum p. 149. solo, interdum additis nonnullis remediis paucis, malum hypochondriacum, ventriculi debilitatem, ructus, vertiginem, atque maniam sustulit. Laudat igitur cum Cll. HAHNIO, SCHWERDTNER et BERGIO usum aquae frigidae.

In vigesima tertia sectione traditur methodus p. 156. medendi febribus quartanis. Rhabarbarum propinat Noster his ut digestivum et euacuans. Ut digestivum addit terreum et sal mirabile GLAUBERI; euacuandi causa coniungit cum rheo ipecacuanham et sal medium, hyemali tempore tartarum emeticum. Per tres hebdomadas ita continuat, dein mane et vespere integritatis diebus, sex vel octo grana sulphuris antimonii aurati tertiae praecipitationis cum aequalibus partibus salis mirabilis GLAUBERI et absorbentis cuiusdam exhibuit per quatuor vel sex dies, cui pulveri saepe numero cessit febris. Recidivas postea arcet cortice, quem suadet phthisicis in infuso frigido, ac cui vim resorptioni efficiendi atque resistendi in magnis vulneribus tribuit.

- p. 159. In vigesima quarta sectione tetanus s. spasmus maxillae inferioris consideratur. Animaduertit Noster tetanum hunc iis non facile contigisse, qui puro ac libero aere viuerent. Quapropter etiam ventilatores inuenit, iisque magno cum fructu vsus est. Opium praeterea optimum contra hunc esse remedium cum aliis Noster fatetur.
- p. 162. De incommodis infantum saepe letalibus ex abusu alimentorum, laesam digestionem indeque denegatam nutritionem inducentium, exempla nonnulla in vigesima quinta sectione Noster collegit, ac methodum suam medendi insimul addidit. Postquam itaque de lacte matrum ac nutricum varia proposuerat, et iustam diaetam omnino infantilem examinauerat, exempla infantum, ex nimio et peruerso usu alimentorum laborantium, in primis aequae, ac in secundis viis,
- p. 167. enarrat. Inter medicamenta, a Nostro iis propinata, et solutionem aquosam mercurii dulcis inuenimus. Mercurii duas vncias, nimirum accurate triti, coquit per duos dies cum aquae duabus mensuris (*Quart*) in balneo arenae, dein colaturae dimidiam mensuram, (*Quart*), in qua duae drachmae mercurii solutae erant, diuidebat in 120 partes aequales, ac mane et interdum vesperi vnam dosin propinabat. In obstructionibus glandularum in primis hoc vtile medicamentum iudicatur a Nostro.
- p. 174. Communicat hic Cl. Auctor in vigesima sexta sectione remedia nonnulla certa in quibusdam morbis; vt in oedemate pedum, angina, in gingiuarum laxitate, bronchocele, panaritio, partibus frigore tactis, in erysipelate et ophthalmiis inflammatoriis, serosis et vlcerosis, hypopioque. Cum vero iam diutius hic immorati simus, ac nostri instituti ratio ferat, Lectores nobis ad librum ipsum sunt amandandi

dandi, ac quaedam breuiter solummodo a nobis hic possunt notari.

Oedemati prodest fasciarum applicatio, a No- p. 177.
stro supra *) iam laudata, quae internorum reme-
diorum vsum reddunt efficaciorum.

In discutienda angina laudat Noster aquam p. 180.
suam vulnerariam **) cum aequali parte aquae sim-
plicis pro gargarismate. Ad roborandum, tonsilla-
rum suppuratione absoluta, certa remedia Noster
iudicat, suam aquam vulnerariam, acetum lithargy-
rii aqua dilutum, ac phlegma aluminis.

Laxitatem gingivarum aqua vulneraria Cl. Au- p. 181.
toris cum melle rosarum, rursus phlegma aluminis
iuuat.

Panaritii sedes Nostro videtur quadruplex: in p. 185.
epidermide nimirum, contextu adiposo, tendinum
vaginis, seu tandem in perioftio. Mox ab initio pa-
naritium tollit crebrior applicatio aquae vulnera-
riae Nostri, seu aquae vegeto mineralis.

Pari modo utilis est aqua vulneraria Nostri in per- p. 187.
nionibus. In partibus frigore tactis, niuem ac a-
quam frigidam certissima praedicat remedia.

In phlegmone et erysipelate non timet Noster p. 188.
de epithematibus humidis, quae tepida ac frigida,
prout opus est, hic suadet.

In vigesima septima ac vltima carcinomatum p. 194.
mammarum, cum et sine amputatione curatorum,
exempla collegit. In amputatione mammarum
plane reiecit ligaturam arteriarum mammariarum,
eique agaricum ac lintea carpta praefert. Cicutam,
remedium anticancrosum a STOERCKIO certissi-
mum iudicatum, licet omnem cautionem adhibuit,
et ipsum Viennense extractum cicutae propinavit

Qq 4

aegris,

*) v. p. 605.

**) v. supra p. 606.

aegris, omni ex parte obsequiosis, non inter certissima remedia refert.

p. 197.

Mulier, per viginti et quinque annos, scirrhus duos in mamma sinistra prope papillam sine incommodo habuit, ab externa causa ortos. Postea autem dolores apparebant, et scirrhi, in carcinoma mutati, variis remediis antea tentati, rumpebant. Hoc itaque carcinoma apertum Noster vegetabili diaeta, et crebrioribus euacuationibus cum pulpa tamarindorum in fero lactis soluta, interne, et oleo myrrhae per deliquium externe, felici cum successu sanavit.

III.

Differtatio anatomico physiologica de valuula EUSTACHII, Praeside IOANNE FRIDERICO LOBSTEIN, Anat. et chir. P. P. O. Defensa a Io. Mich. Dioboldt, Argentinensi, Argentorati. 1771. 4. p. 26.

p. 9.

Cum haec et sequens dissertatio, et ob institutorum experimentorum facilitatem, naturaeque imitationem, et ob diligentiam, in disquirenda partium structura adhibitam, nobis non omnino displicuissent: eas Lectoribus nostris breuiter indicare non dubitauimus. Enumeratis auctoribus, qui valuulam Eustachianam, quam valuulam magnam melius dici posse putat Cl. Auctor, primum descripserint, icones eiusdem dederint, vel eam prorsus in dubium vocauerint; atque nonnullis dubiis verbis definitis, ipsam valuulae, uti in fetu perfecto conspicitur, figuram, situmque naturalem describere aggreditur. Aperta nimirum iuxta longitudinem vena caua superiore usque ad diaphragma, oriri vidit strigam eminentem, tenuis originis, quae, sub quali

ouali fossa progrediens, sensim in membranam expansa, et ad superiorem auris partem veniens, gracili fine, e regione suae originis desinat. Hoc aspectu eam duo arcus formare dicit, alterum ad ostium venae cauae inferioris, semicirculo aequalem; alterum cauum auris respicientem, illo minorem. Separata scalpello tunica sinus interiori, musculosae valuulae fibrae reperiuntur, quae, cum ex ima circuli ovalis parte, tum ex calloso orificio auricularis circulo oriuntur, et in strigam illam confluent. Vt usus huius valuulae clarius pateret, vena caua superiore aurisque parte superiore incisis, et sanguine purgatis, atque corde in naturali situ manente, venae cauae inferiori in abdomine siphonem immisit, eumque sensim aqua repleuit, quae, conuexam valuulae EUSTACHII partem in cauum auris intrudens, illud introiit; flumine vero aquae intermisso, limbus valuulae conuexus redditus venae ostium clausit, impediitque, quo minus aqua reflueret. Vsum igitur valuulae primum in eo consistere existimat Cl. Auctor, ut cavitatem auris sinusque ab ostio venae cauae discernat. Quod quidem in cadauere, cum fibrae omnes laxae sint, exacte perfici negat. Sanguinem vero venae cauae superioris per hanc valuulam, ne in cauam inferiorem ruat, impediri, tum solum concedit Auctor, cum illa venae ostio appressa sit; ea enim eleuata, illud omnino fieri posse putat, nisi vis sanguinis, ex caua inferiore venientis, maior id prohibeat. Qua in re ab aliis anatomicis dissentit. Alium vsum, ex quo consensus, qui sit inter valuulam illam et foramen ouale, pateat, colligit esse in eo, quod illa cum cauae ostii inferiori parte tubum quasi longiorem formet, quo vehementius sanguis in foramen ouale mittatur. Id quod cum ex praesentia et defectu, incremento et decremento, harum partium

p. 12.

p. 13.

p. 15.

p. 16.

congruente inter se, tum ex situ earum et actione fibrarum demonstrat, obiectionemque, quae ex contractis fibris oriri possit, refutat, et denique, tempore diastoles incipientisque systoles sanguinem ex dextra aure per foramen ouale fluere, contendit.

IV.

Dissertatio inauguralis anatomico physiologica
de foramine ouali. Defensa a IOH. MICHAEL
DIOBOLDT, Argentinensi. Argentorati. 1771
4. pag. 30.

- E**x scribendi ratione, ipsiusque Auctoris verbis et coniunctione, quam haec cum priori dissertatione habet, utramque dirigente Cl. LOBSTEINIO propositam esse, colligimus: nos igitur praecipua momenta recensere hic conabimur. Fatis foraminis oualis eiusque valuulae enarratis, Cl. Auctor harum partium descriptionem, et ex fetu, et ex adultis desumptam, exhibet. Quapropter septo interauriculari, annulo ouali, foramine ouali et eius valuula, quae in anteriore aure conspiciantur; nominatis, in aure posteriori conspici affirmat, valuulam ex coniunctione membranae dextrae et sinistrae auris enatam, eamque cum septo in horizontali linea progredientem, et cuius duo cornua, alterum superius, alterum inferius, conspiciantur. Ex eo, quod in praecedente dissertatione instituerat, experimento repetit, aquam per foramen ouale in aurem posteriorem fluxisse. Praeterea autem per venas pulmonales auri posteriori immissa aqua, non aurem dextram intrare potuit, nisi magna vi adhibita. Separata interiore sinuum membrana, fibrarum duplex stratum, alterum validum, ad dextram annuli oualis partem tendens; alterum tenuius, sinistram eiusdem
- p. 10.**
- p. 13.**
- p. 15.**
- dem

dem oram petens; ex calloso circulo, in vtraque aure simili fere modo progredi videbat. Spatium, quod haec fibrarum strata repleat, in anteriore aure occupare fibras, ex posteriore aure venientes, et ad valuulam Eustachianam tendentes; in posteriore vero directionis variae et complicatas fibras. Sic effici in anteriori sinu columnam superiorem crassiolem, inferiorem tenuiorem. Valuulae fibras a dextra circuli ovalis parte oriri, eamque superius et inferius ita disponere, vt semilunaris fingatur et efformetur. Physiologorum de harum partium vsu sententias refert, reiectisque caeteris, Haruaeanae amplectitur, statuitque ideo has partes adesse, vt tempore dilatationis et initio contractionis auricularum sanguis in aurem posteriorem emittatur. Quod ipsum consensum harum partium cum valuula Eustachiana, de quo in superiori dissertatione dictum est, quoque confirmat, atque ex obliquo sanguinis influxu, cur in fetu perfecto foramen ouale superius apertum reperiatur, patere arbitratur.

p. 19.

p. 27.

V.

IOHANNIS ANTONII SCOPOLI S. C. R. et Ap. M. Consil. Mineralogiae Prof. etc. Flora Carniolica, exhibens plantas Carniolicae indigenas, et distributas in classes, genera, species, varietates, ordine Linnaeano. Editio secunda aucta et reformata. Impensis I. P. Krausii, Bibliopolae Vindobons. 1772. 8. mai. Tom. I. alph. 1. pl. 10. Tom. II. alph. 1. pl. 9. tab. aen. 65.

Primae editionis recensitionem suo tempore *) dedimus; haec autem, non modo multum aucta, sed

*) v. comm. nostr. Vol. IX. p. 415.

sed etiam plantarum iconismis perfectior reddita fuit ; praeterea naturalem, quem antea elegerat Cl. Auētor, ordinem, ideo cum Linnaeana methodo commutauit, quia, vt Florista, quaesiturus classes naturales, enormes saltus facere, et vnicum genus integram familiam quandoque constituere debeat, pleraque etiam herbaria eo ordine disposita sint, et Floristae praecipua cura sit, non eligere classes, sed plantas suas bene describere, et probe determinatas ad genera propria referre. Haec omnia egregie praestitit Cl. Auētor. Praemisit vbique generum characteres, eorumque scriptores, ADANSONIUM quoque notauit, et cuilibet suum reddidit inuentum, passim etiam eosdem reformauit, et genera aliter constituit. Synonyma selecta, nomina triuialia Ill. LINNAEI, loca natalia sollicitè annotauit, praeter specifica nomina, quae characteres distinctiuos secundum recentiorum methodum inuolunt, specierum etiam diagnoses apposuit, et descriptiones perfectas, non solum rariorum, sed et vulgarium plantarum addidit, vno verbo, omnia egregie perfecit, quae a Florista vnquam desiderari poterant.

Licet autem in plurimis LINNAEUM secutus fuerit, eiusque methodum, genera et species plerumque retinuerit; aliquando tamen ab Eodem recessit, aliorum, et inprimis TOURNEFORTII nomina generica substituit, genera nonnulla vel aliter et accuratius definiuit, vel noua stabiliuit. Species plures ad alia genera amandauit, multasque pro varietatibus proposuit. Quo itaque constet, in quibusnam a duce, quem elegerat Cl. Auētor, praecipue recesserit, plantasque nunc nominauerit, coniunxerit et separauerit, primaria annotemus.

Tom. I. In *Didynamiis gymnospermis* subdiuisionem, non
 p. 405. a calice quinquesido, cum per gradus insensibiles dege-

degenerent in labiatos, sed a germinibus, vel corona villorum, e corollae tubo nascentium, tectis, vel eadem destitutis, desumfit: hinc etiam e. g. *Chamaepitidin* non *Teucriti*, sed cum HALLERO *Bugulae* speciem constituit: *Teucrium* enim germinata nuda, *Bugula* vero eadem corona villorum cincta habet; *Chamaepitys* eodem ornatu incedit, et basis tubi corollae dilatata, et capsulae instar seminibus circumposita, eandem *Bugulae* potius, quam *Teucritio* iungit.

Tetradynamiarum characteres essentialia, in prima Tom. editione, ex circumferentia disci nectarei, e qua II. p. 1. stamina prodeant, desumserat Cl. Auctor; cum vero haec nota nimis subtilis saepe esset, veraque discrimina in varia structura fructus natura collocasset, priorem characterem prorsus omisit, et TOURNEFORTIUM, qui fructus anatomen optime tradidit, secutus est; hinc scripsit:

Siliculosas in genera diuidunt valuae septo parallelae aut contrariae, mono- aut polyspermae, emarginatae vel integrae, styliferae aut muticae, septo distinctae aut nullo. Siliculosarum vero essentias genericas suppeditant calyx erectus aut patens, siliquae figura, valuae rectae, aut reuolutae. Agaricos praeunte LINNAEO, in edit. I. ex pilei figura determinauerat, hoc vero infidum discrimen esse, postea inuenit, illumque ordinem elegit, quem sola structura et habitus suppeditaret. Attendendum enim esse monuit, an fungus nasciturus, volua tectus, an nudus sit, an mori T. II. incipiens putrescat, vel exsiccatus persistat contractis p. 414. fibris, an eius semina decidant, aut disfluant, vel explodantur; quatenus sit proportio caulis ad pileum, quae pilei fructificantis figura naturalis; qui denique lamellarum situs, numerus, figura, dispositio, vita; quibus omnibus in quolibet indiuiduo bene obseruatis, spes erit nascituram aliquando perfectam in his historiam.

Nomi-

Nomina generica, a Cl. TOURNEFORTIO et aliis adhibita, ab Ill. LINNAEO autem reiecta, bono consilio saepe restituit, vt sunt :

Limnopeuce.	Sphondylium.	Tithymalus.
Morocarpus.	Ros solis.	Caryophyllata.
Bonarota.	Lapathum.	Populago.
Linagroftis.	Onagra.	Bugula.
Aquifolium.	Chamenerion.	Calamintha.
Rapunculus.	Thymelaea.	Cassida.
Stramonium.	Moschatella.	Squamaria.
Belladonna.	Hypopithys.	Ketmia.
Grossularia.	Knavel.	Vulneraria.
Peruinca.	Tunica.	Caltha.
Kali.	Oxys.	Balsamina.

et quae sunt alia. *Onopordon* praeterea *Acanos* dixit, quo nomine plantam et olim THEOPHRASTUS, et nunc ADANSONIUS proposuit. *Rhinanthum* mutauit in *Mimulum*, et *Hypochaerin* appellauit *Achyrophorum* ; prius nomen ex PLINIO , posterius ex VAILLANTIO repetierat ADANSONIUS.

Verum mittamus nomina, ad res ipsas perueniamus, et genera quaedam, vel curatius definita, vel
Tom.I. noua ratione constituta, commemoremus. Ex *Panicis*,
p. 52. *Sanguinale* et *Dactylon* a LINNAEO dictis, duce HEISTERO, *Digitariae* genus constituit, illudque inprimis ab *Andropogone* glumis muticis differre monuit.
p. 63. *Sesleriae* genus, in priori editione conditum, denuo retinuit, illudque non tam *Airae*, quam *Phleo* potius proximum esse asseruit. Proprium *Airae* characterem a calice bifloro haud desumi posse, vel exinde patet, quia et quaedam *Auenae* similem habent, et *Aira coerulea* vni - et quinquefloros gerit. Hinc ea Cl. Auctor ad hoc genus retulit gramina, quorum spiculae constant receptaculo sustinente flores plerumque binos, biglumi calice, binisque petalis compositos,

positos, quorum utrumque muticum est, aut unicum aristatum, arista minime tortili; praeterea huic generi proprium est, habere flores hermaphroditos, petalum vnum, absque duplicatura, et germen, duabus squamulis nectariferis vallatum. De Bromo scripsit: *Gramina polyantha mutica ab aristatis diuidere potui; Fe-* p. 76.
flucas vero et Tritica, a Bromis notam aliquam, quae vere distinguat, inuenio nullam. Coniungam itaque haec tria genera in vnum, cum idem sit, siue ordines accurati militent, sub vno vexillo generis naturalis, siue ordo quilibet proprium genus constituat, dum modo cognitio specierum difficilior non reddatur. Character itaque Bromi erit spicula multiflora, plus minus aristata, flosculis omnibus hermaphroditis. Praeterea huc reduxit Dactylin glomeratam, quam a Poa remouet, petalum vnum aristatum, a Cynosuro calix multiflorus et bracteae defectus, a Dactyli calix acutissimus. Scherardiam, Asperulam et Rubiam nunc separatim conseruauit, et in Asperula aruensi stamina, in tubo corollae recondita, et capsulas duas, vnam p. 106.
abortiuam, vidit, hisque notis tantum a Galio differre monuit, et Asperulas, taurinam, tinctoriam et odoratam, LINN. inter Galia reliquit; Galio enim fru- p. 99.
ctum subrotundum, siccum, non coronatum, et stamina, vltra faucem corollae elata tribuit. Myosotidis genus dubium est, et margo baseos tubi corol- p. 121.
lae introflexus, crenulatus et germina protegens, feminaque nitentia idem cum Lithospermo coniungunt, a quo differt corollae centro, squamulis quinque clauso, et stigmate simplici. Saniculam, cum p. 185.
Astrantia iunctam, denuo exhibuit; et vbique umbelliferas a seminibus praecipue definiuit. In Dau- p. 189.
co semen singulum, quatuor angulis donatum, e quibus pili rigidi prodeant, inter angulos linea est eleuata; quorsum ergo pertinent plures Caucalidis species, vt grandiflora, leptophylla, et platycarpus.
Cau-

- p. 191. *Caucalis* semina gerit minime fulcata, aculeis sparsis, densis hispida; huc retulit *Tordylium nodosum*, et *Anthriscum*, nec non *Scandicem Anthriscum* LINN. Posterioris enim semina rostro carent, et prioris neque emarginata sunt, neque compressa, hinc a *Tordyliis* diuersa. *Athamantae* genus expunxit, restituit vero *Libanotidem*, eidemque fructum oblongum striatum, villosum, non echinatum, neque marginatum adscripsit. *Oreoselinum* et *Ceruariam Selini* species fecit. Seminum alae marginales, et dorsum tribus lineis longitudinalibus angulatum, notas esse *Imperatoriae*, *Aethusae* et *Angelicae* conuenientes
- p. 199. monuit Cl. Auctor; hinc duo semina, dorso vnice cohaerentia, alibi vero libera, *Angelicae* characterem constituere; in *Imperatoria* vero eadem planiora, tota interna facie inuicem cohaerentia, dorsumque lineis eleuatis, non autem angulis striatum
- p. 207. esse assumsit. *Scandix odorata* semine differt a *Pectine veneris*, *cerefolio* et similibus eamque ad *Myrrhidem* denuo reduxit, cuius essentiam constituunt semina longa, pentagona, angulis scabris, acutis; *Chaeropyllum hirsutum* autem semina gerit aristata, longa,
- p. 218. ideoque ad *Scandicem* reduxit. *Chaerophyllo* fructum laeuem, tenuem, longum, nitentem, reflexis stylis terminatum adscripsit. *Seseli* amplum fecit genus, omnesque umbelliferas, quae fructum ouatum, striatum, stylisque deflexis terminatum habent, eodem comprehendit, et *Seseleos* species fecit: *Athamantam Meum*, *Sium nodiflorum* et *Falcariam*, *Sison amomum*, *Aegopodium*, *Apium graueolens*, et *Carum*. Denique et RIVINI genus, *Siler* dictum, denuo introduxit, eidemque fructum oblongum, et semina conuexa atque porcata tribuit: monuitque in fructu immaturo strias, per siccitatem attenuatas, breues alas repraesentare, eas autem in perfectis seminibus obtusas esse, nec alis simili-

similes. *Cotinum* seorsim recensuit, *Scillam* autem p. 247. *Antherico* iunxit, et, cum in *Antherico calyculato*, stigmata tria absque stylis, et filiculas tres, polyspermas, constanter obseruasset, eandem ad *Scheuchzeriam* amandauit. In *Lychnidum* familia omnia va- p. 303. riant, solus stylo- rum numerus constans est; qui vero, ex mente Cl. Auctoris, ordines quidem, non autem genera diuersa constituit: hinc eandem coniunctim proposuit, et *Saponarias* quoque *Lychnidis* species constituit. Ita et *Alfines* genus naturale esse, p. 313. et *Saginam*, *Alfinem*, *Moehringiam*, *Stellariam*, *Arenariam*; et *Spergulam* LINNAEI comprehendere, concessit quidem, attamen ex lege methodi sexualis, ob stamina 4. 5. 8. separatim conseruauit *Saginam*, *Alfinem* et *Moehringiam*, reliquos vero fratres, qui stamina 10 gerunt, simul omnes *Stellariae* nomine coniunxit, *Lychnidis* exemplo permotus, quae species tri- et pentagynas, nec non petala bifida et integra comprehendit. *Cerastii* genus etiam diui- p. 319. dit, et *Sphaerocarpa*, quae secundum ordinem LIN- et NAEI constituunt, ad *Stellariam* reduxit, reliqua, quae 320. capsulas habent ceratoides, oblongas, cartilagineas, apice decemdentatas. *Centunculi* genere recensuit. *Sedorum* gentem, propter habitum, nectarium, et p. 323. porportionem numericam partium floris et fructus vno genere comprehendit, et in *Rhodiola* siue *Sedo roseo* stamina non semper 8, sed et 6 ad 10, et filiculas 3 ad 6: praeterea flores masculos, cum rudimento feminei sexus, cui quatuor nectareae squamae circumstabant, obseruauit. In *Mespilis* p. 344. stylo- rum numerus inconstans est; *Mespilum chamaemespilum* digynum, et *Crataegum Oxyacantham* monogynum, in *Cotoneastro* 3 et 5, in *Aucuparia* 3 et 4 stylos vidit; hinc *Mespili* characterem naturalem constituunt calicini dentes et petala quinque, stamina quadruplo plura, styli tot, quot locula, bacca infera vm-

- bilicata, calice, filamentis et stylis persistentibus terminata. Coniungit itaque *Crataegum*, *Sorbum*, et *Mespilum*. *Crataegum azarolum* LINN. vero ad *Pyrum* amandauit, cum in fructu locula 5 euidenter
- p. 357. appareant. *Tormentillam*, *Comarum* et *Fragariam* *Potentillae* addidit: si enim *Breynia* est *Capparis*, tunc et *Fragaria* erit *Potentillae* species, et *Tormentilla* ab hac, vt *Gentiana ciliata* ab *asclepiadea* differt.
- p. 369. *Glaucium* a *Chelidonio* iterum separauit; filicquam eius stigmatate quadrilobo, scyphiformi, quod prius erat lamina, stylo applicata, terminatam esse, cognouit, monuitque, si flos in hoc genere, non vero fructus attendendus, tunc nec *Papauer* a *Chelidonio* esse separandum.
- p. 408. *Leonuri* generis essentia adhuc dubia est, sola forte corolla aliquid valet: hinc pro caractere assumsit, galeam integram, et ellipticam: et labium trifidum, segmentis omnibus, aut lateralibus, acuminatis: addenda stamina, villis aspersa: addidit huic generi denuo *Galeopsidem* *Galeobdolon* L. *Stachydem* LINN. retinuit, et pro nota essentiali staminibus exteriora deflorata, lateraliter exserta, et labii laciniam mediam emarginatam assumsit. *Betonica officinalis* easdem quidem notas gerit; sed caret corona villorum, germina protegentium, quae in *Stachyde* adest:
- p. 413. hinc et *Betonicam alopecurodem*, *officinali* multum similem, pro *Betonicae* specie assumere Cl. Auctor noluit, cum eiusdem germina villis quoque
- p. 424. sint tecta. *Serpillum* non solum cum *Thymo* coniunxit, sed etiam *Melissam grandifloram* et *Calamintham* LINN. eidem apposuit, cum et harum calycis fructiferi faux villis conniuentibus clausa deprehendatur.

T.II. Ex *Alyssso calycino* et *montano* LINN. nouum

- p. 13. cum ADANSONIO fecit genus, nomine *Adyseton* et characterem in filicula emarginata, compressa, septoque stylifero, valuis parallelo, posuit; vtriusque

que speciei folia villosis stellis sunt hirsuta. *Biscutella* filiculam habet compressam dispermam, septo contrario styliifero : semen in hac medio septi loco affixum est, quod in *Adyseton* superiori loco appenditur. *Spartium* nunc cum *Genista* combinavit, p. 50.
 cum vexilli maior et minor latitudo certos limites non admittat; *Onobrychidem* autem conseruauit propter legumen monospermum, quod multiloculare est in *Hedysaris*. *Tetragonolobum* quoque a *Loto* legumine tetragono tetraedro, angulis alatis diuersum, prout et *Dorycnium* separatim conseruauit, p. 76.
 et, si vltimum proprium genus non esset, *Trifoliis* potius, quam *Lotis* adiungendum esse, scripsit. p. 87.
Leontodon LINN. plantas complectitur, quibus feminum pappus styipitatus et simplex, et iterum alias, quibus idem sessilis et plumosus est : hanc confusionem vt euitaret Cl. Auctor, ex vno genere bina fecit, quorum vnum *Hedypnoin*, alterum *Leontodon* dixit. Illius character est calix, basi et apice dilatatus, constans squamarum ordinibus tribus, intimo duplo longiore; semina pappo styipitato, simplici, terminata; receptaculum conuexum, alueolatum glabrum; hucque pertinet *Taraxacum officinale*. p. 99.
Leontodon vero Auctoris gerit semen coronatum pappo plumoso, sessili; receptaculum planiusculum, alueolatum; alueolis marginatis, aut membranula lacero dentata vallatis, et comprehendit *Leontodon hispidum*, *hirtum*, et *autumnale* LINN. Inter *Hieracia* et *Sonchos* limites nullos inuenire potuit, nec figuram calicis, aut maiorem minoremue latitudinem eiusdem squamarum diuellere posse genera, pluribus aliis notis inuicem similia, affirmavit: hinc eadem coniunxit, simulque *Leontodon aureum* eidem adiecit, cum et huius pappus simplex sit et sessilis. Species vero *Hieraciorum*, quibus pappus plumosus et receptaculum villosum est, nouum p. 113.

- constituunt genus. Si enim *Andryala* a *Senecione* generice differt, tunc et *Hieracia*, eadem nota diversa, coniungi non debent. Dixit hoc genus *Apargiam* Cl. Auctor, quo nomine proposuerat D A-
LECHAMPIUS plantam, *Achyrophorum* a VAIL-
p. 123. LANTIO dictam. *Serratulam* partim ad *Cirsium*,
partim ad *Carduum* reduxit, *Cirsioque* feminis pappum sessilem et manifeste pilosum, ac thalamum
p. 131. pilosum; *Carduo* autem pappum simplicem tribuit;
praeterea *Cnicum pygmaeum*, *oleraceum*, et *spinosissi-*
p. 134. mum inter *Cirsia* recensuit. *Carthamum lanatum*
nomine generico *Atractylis*, easque *Centaureae* spe-
cies, quae femina, pappo carentia, habent, *Rha-*
pontici genere exhibuit; reliquas, feminibus pappo-
fis ornatas, sub *Centaurea* omnes comprehendit.
p. 147. *Matricariam* et *Pyrethrum*, HALLERO duce, se-
paravit, et priori calicem hemisphaericum, squamis
multis imbricatum, marginalibus minime membra-
naceis, tribuit, a qua *Pyrethrum* feminibus, corona
denticulata terminatis, differt, vti *Sherardia* ab
p. 149. *Asperula*. *Filaginem* LINN. cum *Gnaphalio* con-
iunctim tradidit, communis enim utriusque facies
filamentosa aut tomentosa, nec non medium inter
vtrumque genus *Gnaphalium leontopodium* coniu-
ctionem suadent; posterior planta polygama est, ca-
pitulo medio *Gnaphalii*, lateralibus vero *Filaginis*.
p. 168. *Inulam* etiam *Asteri* denuo associavit, addiditque
huic generi *Doronicum bellidiastrum*, et *Arnica*
p. 176. *scorpioidem* LINNAEI. *Solidaginem*, *virga aurea*
dictam, *Doriae* genere et nomine proposuit. Quo
nomine forsan omnes *Solidagines* comprehendit,
genericum enim hoc nomen nullibi occurrit. *Sa-*
p. 185. *tyriorum* siue *Orchydum* flores, insecto diptero simi-
les, ovarium scilicet ventri, petala alis, opercula
anthennis, scutum capiti, stylus rostro, labium pe-
dibus; hinc ut diptera ex rostro, ita et genera
Saty-



Satyriorum ex stylo dignoscenda esse asseruit. In his plerumque Ill. HALLERUM ducem elegit, imprimis in genere *Orchidis* et *Epipactidis*, quod vltimum vero nomen cum *Serapias* commutauit: retinuit quoque *Coraliorhizam*, addiditque *Ophrydis* genus. *Blitum* cum TOURNEFORTIO ab *Amarantidis*, *Ostryam* quoque cum MICHELLIO a *Carpino* distinxit; e contrario *Elaeagnum* et *Hippophaen* calicis segmentis tot, quot stamina e calice nata, corolla nulla, et in feminis stylo vnico, baccaque globosa, monoppyrena, vt caractere naturali, cum *Osyride* conuenire, et solum numerum partium, sexumque diuersa genera naturalia non constituere perhibuit: hinc tria haec genera combinauit, pro vt et *Lupulum* ad *Cannabim* amandauit. In *Filicibus* et reliquis *cryptogamitis* plerumque LINNAEI genera retinuit, *Struthiopterin* vero et *Osmundam* secundum HALLERUM definiuit. *Lichen-agaricos* MICHELLII, ab HALLERO *Sphaeriae* nomine propositos, a LINNAEO vel *Fungis* adiunctos, vel penitus expulsos, cum ADANSONIO nomine *Valsae* recensuit, et receptaculum sphaericum, aut cylindricum, carbonario puluere plenum, et apice dehiscens, pro caractere exhibuit. *Merulium* denique cum HALLERO ab *Agaricis* separauit, et *Eluelam* GLEDITSCHII assumsit.

P. 237.
P. 243.
P. 260.
P. 262.
P. 288.
P. 397.
P. 461.
P. 476.

A generibus pergamus ad species, quarum plures ad alia reduxit genera, aliasque accuratius definiuit, et veras a spuriiis, siue varietatibus, sedulo distinxit. Plantarum Linnaeanarum, ad alia genera relatarum, indicem alphabeticum Ipse Cl. Auditor operi praemisit, quarum nonnullas modo repetamus, plures ex notatis antea generibus, noua ratione stabilitis, innotescunt.

Aegilops ouata LINNAEI est *Phleum*

Rr 3

Aegi-

<i>Aegilops incurvata</i>	LINNAEI est	<i>Agrostis</i> .
<i>Agrostis arundinacea</i>	-	<i>Arundo</i> *).
<i>Alopecurus paniceus</i>	-	<i>Panicum</i> .
<i>Andromeda polifolia</i>	-	<i>Rhododendron</i> .
<i>Aphanes arvensis</i>	-	<i>Alchemilla</i> .
<i>Arctium Carduelis</i>	-	<i>Cirsium</i> **).
<i>Avena elatior</i>	-	<i>Holcus</i> .
<i>Brassica campestris</i>	-	<i>Erysimum</i> .
<i>Brassica erucastrum</i>	-	<i>Erysimum</i> .
<i>Cacalia alpina</i>	-	<i>Tussilago</i> ***).
<i>Cheiranthus erysimoides</i>	-	<i>Erysimum</i> .
<i>Chlora perfoliata</i>	-	<i>Gentiana</i> ****).
<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	-	<i>Matricaria</i> .
<i>Chrysanthemum corymbosum</i>	-	<i>Pyrethrum</i> .
<i>Cynosurus cristatus</i>	-	<i>Phleum</i> .
<i>Cynosurus durus</i>	-	<i>Poa</i> .
<i>Erysimum Barbarea</i>	}	<i>Sisymbrium</i> *****).
<i>Alliaria</i>		
<i>officinale</i>		
<i>Festuca decumbens</i>	}	<i>Poa</i> .
<i>fluitans</i>		

Festu-


*) Quaerit Cl. Auctor, cur *Agrostis*? cum pappus adeo manifestus, nec arista recta, sed e medio modice refracta sit.

**) Cuius capitula sphaerica constant squamis imbricatis patentiusculis, apice non rectorsum, sed introrsum flexo, filamenta sunt pilosa, ad basin latiora.

***) Quippe quae a Petasitide floribus hermaphroditis quadrifidis, nec alia nota, differt.

****) Quam in Systemate Nat. Edit. XII. eo nomine proposuit LINNAEUS, antea pro *Gentiana* exhibita.

*****) Harum filiqua non tetragona est, qualem exigit *Erysimi* character Linnaeanus; et, cum in *Barbarea* subtrigona sit, haec *Sisymbrium* cum *Erysimo* coniungere videtur.



<i>Festuca ovina</i>	LINNAEI	est	<i>Bromus.</i>
<i>Gypsophila saxifraga</i>	-		<i>Tunica.</i>
<i>Holcus Halepensis</i>	-		<i>Andropogon.</i>
<i>Hyoseris foetida</i>	-		<i>Lapsana.</i>
<i>Inula crithmifolia</i>	-		<i>Senecio.</i>
<i>Leontodon aureum</i>	-		<i>Hieracium.</i>
<i>Lepidium alpinum</i>	-		<i>Draba.</i>
<i> ruderales</i>	-		<i>Nasturtium.</i>
<i>Myagrum alpinum</i>	}	-	<i>Alyssum.</i>
<i> satiuum</i>		-	
<i>Myosotis Lappula</i>	-		<i>Cynoglossum.</i>
<i>Onosma echioides</i>	-		<i>Cerithe.</i>
<i>Ophris spiralis</i>	-		<i>Serapias.</i>
<i>Orchis abortiva</i>	-		<i>Serapias.</i>
<i>Pimpinella glauca</i>	-		<i>Psoralea.</i>
<i>Schoenus aculeatus</i>	-		<i>Agrostis *).</i>
<i>Sisymbrium arenosum</i>	-		<i>Arabis.</i>
<i>Turritis hirsuta</i>	-		<i>Arabis.</i>

Addamus alias, quae species illustrant, obserua- Tom. I.
 tiones. *Circaea alpina* distincta est species, specifi- p. 9.
 cus vero character non consistit in caule adscen-
 dente, nec in vno racemo, neque in calice colorato;
 sed in figura, glabritie, et dentato ambitu foliorum.
Veronica chamaedrys multum variat, et inter hanc
 et montanam LINN. nullum verum discrimen inue- p. 14.
 nire potuit; habitu excepto, qui modo mollior est,
 modo rigidior: hinc vtramque coniunxit, imo et
Veronicam Teucrium non separavit. Nec *multifida*
 et *Austriaca* inter se differunt; *spicata* denique varie
 larvata incedere, et characterem suum occultare
 solet: ideoque et *longifoliam* ab eadem separare non
 potuit.

Rr 4

*) Vel Agrostidis speciem, vel nouum genus esse mo-
 nuit. Flos quilibet calice constat euidente, biglu-
 mi, mutico, petalis duobus, styloque vnice et stigma-
 te simplici.

p. 80. potuit. Inter *Bromos* Linnaeanos, *secalinum*, *squarrosum*, *hordeaceum*, *aruensem*, et *teetorum* certos limites non inuenit, eosque nomine *Bromi polymorphi* coniunxit, et pro diagnosi assumsit: vaginas foliorum villosas, nodos fascia atro rubra notatos, spiculas teretes, lanceolatas, crassas; calicem longitudine petali primi, glumas et petala striata, petalumque internum truncatum, ciliatum: Nomine

p. 87. *Aueneae pilosae* comprehendit varias LINNAEI species, *flauescentem* scilicet, *fatuam*, *pratensem*, *nudam*, et *fragilem*, monuitque essentialem suum characterem hoc gramen mirifice occultare, et staturam spicularum numerumque flosculorum a climate et loco natali variare; in his omnibus panicula est erecta, non adeo longa, racemis et pedicellis tenuibus, calix coloratus, receptaculum pilosum, petalum maius apice incisum, et e dorso proferens aristam tortilem infractam, flosculo duplo longiorem. Ce-

p. 128. *rinthem maiorem*; *minorem* et *maculatam* LINN. *glabrae* nomine coniunxit; omnibus enim vna est facies, eademque florescentia; *maior* gerit folia obtusiora, per aetatem coerulescentia, albis verrucis magis aspersa, nec non corollae segmenta breuiora: *maculata* folia possidet modo glabra et magis maculata, modo ad apicem verrucosa et corollae segmenta longiora; *minor* diuersa est corollae segmentis breuioribus. LINNAEUS in specierum edit. II. *maculatam* Ipse expunxit et *minori* addidit. Nonne

p. 167. corolla clausa et patula euidenter distinguunt maiorem et minorem? An *Ribes alpinum* a *rubro* distinctum esset, dubitauit Cl. Auctor; *Rubri* racemi florales primo erecti sunt; dein vero reflectuntur, quales etiam exhibet figura *Ribesii alpini*, a IOH. BAVHINO data. *Grossulariam* et *Vuam crispam* baccis hirsutis et glabris quoque separauit LINNAEUS; ast, fructu glabro praeditam *Grossulariam* dari,

con-

concedere Cl. Auctor noluit. *Chenopodia* foliis angu- p. 174.
 losis inter se multum conuenire, et *viride* atque *album*,
 forte etiam *murale* ac *rubrum* varietates modo consti-
 tuere asseruit, scripsitque: si *Chenopodium Daturaefoli-*
um, siue *hybridum* a *viridi* natum fuisse suspicari potuit
 LINNAEUS, quidni etiam ex *anserino pede* veterum p. 178.
 varias proles demum natas, dubitabimus? *Gentiana*
campestris et *amarella* vnam constituunt speciem, sunt-
 que notae communes: Corollae, instante pluuiā
 se claudentes, auriculae tenuiter laciniatae, erectae,
 calicinorum dentium margines reflexi, corollae ba-
 sis tam firmiter adhaerens calici, vt auulsa interio-
 rem eius cutem secum rapiat, stigmata lamellosa
 erecta, integerrima et obtusa. Inter *Eringium cam-* p. 185.
pestre et *amethystinum* nullum discrimen obseruauit,
 nisi quod folia in vno minus, in alio magis incisa
 essent. In *alpino* folia caulina pinnatifida, quae
 LINNAEUS descripsit, nunquam vidit; ast capi-
 tulo florali oblongo circumstant folia amethystina,
 quorum alia setacea et reflexa, alia vero pinnatifi-
 da et lanceolata sunt. *Pimpinellae* species bene p. 209.
 distinxit Ill. HALLERUS, quem et secutus est Cl. Au-
 ctor. *Droseram* vero *longifoliam* et *rotundifoliam* p. 232.
 combinauit: cognouit enim ex copiosis specimini-
 bus folia ab vna in alteram speciem sensim degene-
 rare. *Asparagus acutifolius* et *aphyllus* non sunt p. 249,
 diuersae species; si enim folia pro spinis habentur,
 erit *aphyllus*, si vero folia dicas, erit *acutifolius*;
Asparagi aphylli specimina, Cl. Auctori ab amicis
 data, omnes notas habuerunt *acutifolii*. *Iuncus mo-* p. 257.
nanthos a Cl. IACQUINIO dictus, et ab Auctore in
 edit. I. distinctus, culmos vni- bi- et trifloros gerit,
 et hinc eandem pro varietate *Iunci trifidi* LINN.
 nunc exhibuit. *Rosarum* species genuinas cognos- p. 351.
 cere difficillimus est labor, hinc Cl. Auctor scripsit: et 355.
 quid calix, quid figura fructus, quid hirsuties aut

glabrities, quid denique spinæ valeant in determinandis *Rosarum* speciebus, qui plura specimina, eaque in variis regionibus collecta, possidet, et invicem conferre voluerit, facile poterit iudicare; calicis autem fabricam figura fructus constantiorem esse, observavit. An forte unica species, a Deo creata, ex qua reliquæ omnes deinde natae? Cum itaque recentiorum, et LINNAEI etiam observationes Auctori non satisfacerent, nomina tantum EXBAUHNI Pinace repetiit, et aliorum aliquando supposuit, melius esse ratus fateri, quid nesciat, quam sententiae subscribere, a veritate adhuc alienae.

p. 361. *Potentillam auream et vernam, Ranunculum repen-*
p. 394. *tem et Flammulam, forte et Ranunculum Monspeli-*
cum ac Lapponicum a niuali non differre, contendit.

T. II. *Hieracium Pilosella* mire ludit caule unifloro, bi-
p. 105. tri- et quadrifloro, etiam caule ramoso folioso, aliis-
que modis, hinc varias, praeter necessitatem consti-
tutas, fecisse species tradidit, docuitque convenire
omnes stolonibus repentibus pilosis, calicibus pro-
ferentibus spinulas fuscas, carnosas, flavescente
glandula terminatas, calicinis squamis crassis et vil-
losis; semiflosculis non ultra 90; receptaculo pla-
no, foliis ad lanceolatam figuram accedentibus.

p. 157. *Petasitides* a foliis veteres, a figura thyrsi florumque
structura et numero recentiores distinxerunt; attamen omnes, scilicet *Tussilaginem albam, frigidam, hybridam* et *Petasitidem* LINN. vnam forte speciem
constituere, Cl Auctori probabile videtur, notas communes et quomodo flores in diuersis annis et indiui-
duis variare solerent, copiosius annotavit, id quod sen-

p. 240. tentiae suae multum roboris conciliauit. In *Quercus*
genere folia infida esse, constantiores gallas, corticem et cotyla, foliaque in eadem arbore ferrata et
integra occurrere: hinc *Quercum, Smilax* et *Ilex*
dictam, non differre, immo et gramuntiam, et Cer-

ris

ris nominatam prioribus addi posse, asseruit Cl. Auctor. *Quercum Smilacem* ab ipso LINNAEO ad *Ilicem* relatum esse, ex specierum edit. II. constat. In extricandis *Salicum* speciebus maximas difficultates, pluresque a scriptoribus, magni etiam nominis, commissos errores se inuenisse, libere fassus est; hinc etiam suas potius accurate describere, quam ad aliorum nomina reducere laborauit. De *Salice alpina* e. g. quam Tab. 61. delineauit, dubius haesit, an esset *lanata*, an *fusca* LINN. et scripsit: an haec translato pappo volitante genuit reliquas latifolias? vtrum statura pusilla violenta plantae in solo fertili naturalis et elatior euadit? In genere autem monuit, cognitionem specierum difficilem reddere 1) icones non bonas, 2) descriptiones imperfectas, 3) miram efficaciam soli, caloris, frigoris, humiditatis, siccitatis, ventorum, niuis, in mutando earum habitu, statura, hirsutiae, figura foliorum, stipulis, pedunculis, amentis, nectariis, capsulis, gestatione, germinatione, vita etc. In *Cryptogamiis* plures plantas accuratius disquisiuit, et partim nouas species constituit, partim alias varietatibus associauit. *Lichenes*, praecipue illos, qui *scyphiferi* et *fruticulosi* a LINNAEO, et *Coralloides* a DILLENIO dicuntur, per plures annos se collegisse, et omni studio examinasse, limites vero inter species detegere neutiquam potuisse monuit, et, cum probabile sit, omnes hasce plantas *Lichenis pyxidati* varias aetates et degenerationes esse, easdem in species non separare, potius omnes nomine *Lichenis squamosi* proponere voluit.

Praeterea copiosae huic Florae insunt observationes, quae plantarum structuram egregie declarant, et hinc omnem attentionem merentur. In *Hippuri vulgari* anthera iuuenis vere sessilis est, et
locula p. 5.

- locula obscure rubra possidet, floresque non omnes hermaphroditi sunt, sed in eodem verticillo interdum etiam feminei. *Ligustri* corolla vere infundibuliformis non est, filamenta inter receptaculum et corollam prodeunt, etsi eius tubo fere agglutinata sunt, baccam replet sicca spongiosa violacea pulpa, quae sacculos duos monospermos constituit. *Ve-*
- p. 7. *ronica aphylla* non in corymbo floret, sed pedunculos duos tresue ex apice caulis emittit, et, si planta diligentius consideratur, folia non omnia radicalia
- p. 27. videbuntur. *Salvia officinalis* omnino tetrandra est, fulcrum enim sustinet filamentum, utroque extremo gerens antheram fertilem. In *Valeriana*
- p. 33. *dioica* nunquam Cl. Auctor vidit flores dioicos, sed nunc omnes hermaphroditos, nunc filamentis vno altero castrato instructos; nunc masculos et feminos in eadem planta, ita tamen, ut masculi flores continerent rudimentum germinis et styli; sine seminibus perfectis nullam hactenus inuenire potuit.
- p. 40. *Schoenus* LINNAEI a *Scirpo* in eo tantum differre videtur, quod in hoc genere omnes squamae fertiles sint; in eo autem eae solae, quae superiorem capituli partem constituunt, id quod probare voluit Cl. Auctor propria observatione rudimentorum floris et fructus in sinu vno aliove earum squamularum, quas pro glumis calicinis Ill. LINNAEUS habuit.
- p. 49. *Graminum* generibus limites certos non ubique posuisse industriam Ill. LINNAEI Cl. Auctor asseruit; atque hinc, cum inflorescentia et numerus partium floris fructusque non sufficere videantur, eadem potius in sola structura quaerere voluit; et, dum e. g. *Aegyloperon ouatam* ad *Phleum* amandauit, scripsit: *Phleum* voco ex structura floris; nam sexus vix aliquid probat, modo enim flores hermaphroditi sunt: modo stamina sola videntur, modo germina et stamina desunt: et *Alopecurum* ab omnibus aliis grami-

graminibus differre glumis calicinis monophyllis, corollaceis cucullatis ex SCHREBERI litteris adduxit. *Saginat* glandulae nectariferae coniungunt p. 119. cum *Alfine media*, capsula vero quadriualuis cum *Moehringia*; *procumbens* illa petala gerit in syluis maiora, in agris minora. *Drypis* capsulam fert tenuem, calice indurato et conniuyente ita tectam, ut cum eo cadere debeat, antequam dehiscat, hinc capsulam quinqueualuem MICHELII paradoxam esse, neque eam cum LINNAEO circumscissam dici posse, monuit, cum nullum sponte se aperiendi spatium habeat, et culter capsulae pelliculam basi abscedentem quidem repraesentet, sed separatio haec minime naturalis sit. Semen vnicum continet reniforme, ex hilo demittens filum, quo imo loco capsulae affigitur. *Statice armeria* antheras basi bifidas, segmentis inflexis, et germen circumdatum annulo nectarifero quinquelobo, lobis staminiferis ostendit; pili stylorum superiores concolore glandula terminantur, et petala, dempto calice, vi elastica sese subito expandunt. *Distamni albi* fructus constat loculis quinque, superne dehiscentibus, et itidem in medio bidentatis; in loculo quolibet continetur capsula coriacea, in duo crura diuarcata, profunde diuisa, e cuius fundo superne nascitur lamina bifida, carinata, protegens semen vnicum, splendens. *Cherleria sedioides*, in horto culta, produxit nectararia decem integra, nec non filamenta omnia ex receptaculo. In *Cerastio semidecandro* LINNAEI stamina quinque et stylos tres numeravit HALLERUS; stamina vero 10 et quidem omnia antherifera, et stylos 5 obseruauit Cl. Auctor, viditque filamenta exteriora antheras facile et citius dimittere, et hinc nata forte obseruatio LINNAEI de staminibus 5 fertilibus totidemque sterilibus. *Asari Europaea* proles non est mono- p. 328. sed

- sed hexagynia, licet enim styli, primo connati, vnicum prae se ferant; apice tamen sunt liberi, et cum capsula in 6 locula diuiditur, tunc styli separantur, et quilibet suum loculum seorsim terminat; singulum loculum septo longitudinali in duas partes diuiditur, eidemque vtrisque bina femina adhaerent. Ita et *Portulaca oleracea* non mono-sed pentagynia est, vti pridem vidit HALLERUS. Nec *Isopyrum*
- p. 402. polygya erit, sed trigyna potius, germina enim modo duo vel tria euidentissimo stylo terminata, totidemque trispermas capsulas Cl. Auctor vidit.
- p. 386. *Atragene* differt a *Clematide* staminibus exterioribus in nectaria lanceolata, triloba, emarginata et integra degenerantibus, quae LINNAEUS petala vocat, corollam vero pro calice sumit; hanc metamorphosin staminum etiam in *Clematide Vitalba* obseruauit Cl. Auctor. In *Myriophylli* notis genericis non
- T. II. p. 238. conueniunt scriptores. In *spicato* inuenit Cl. Auctor calicem quadridentatum, corollam nullam, stamina 8, germina 4, stigmata papillosa, et femineos inferiores prioribus similes, sed absque staminibus.
- p. 250. *Bryoniam* in Austria dioicam esse, tradidit Cl. IACQUINIUS, quo hac de re certus esset Auctor, ex agro Gorizienfi eandem in hortum transtulit, plantamque florentem monoeciam obtinuit, viditque in masculis filamenta tria bifida, segmentorum marginibus coronatis, et antheras adnatas, in feminis stylum vnum et stigmata duo lunata.

Possemus facile plura ex perfectissimo hoc opere repetere, nisi breuitati studendum esset. Ad ordines naturales sollicite respexit, licet artificialem assumeret, et, quosnam ingredi deberent genera,

T. I. p. 4. saepius annotauerit. Ita *Salicornia* affinitatem habet cum *Salsola* et *Beta*; hinc inter *Oleraceas* recen-

p. 5. senda. *Limnopeuce*, quia stylum ex apice germen emittit, remoueri debet ab *Elaeagnis*, et associari

ciari familiae *Zingiberum*. *Hedera* cum umbelliferis p. 168.
 coniungi nullo modo potest. *Acorus* proximus
Iuncoidi MICH., haec *Scheuchzeriae*, *Scheuchzeria* p. 254.
Antherico: hinc familia *Liliaceorum* ADANSONII
 vere naturalis est. *Alisma* et *Sagittaria* affinitatem
 indubiam habent; sed vtraque gens monocotyledon
 a multifiliis remouenda in ordine naturali: *Buto-*
mus cognatus *Alismae*, *Veratrum* *Sagittariae*, et p. 267.
 cum *Butomus* *Scheuchzeriae* proxime accedat, ita
 quatuor haec genera coniungunt *Iuncos* cum *Lilia-*
ceis. *Knave* affinitatem cum *Thesio* maiorem, p. 298.
 quam cum *Alchemilla* habet, hinc remoueri debet
 a *calycifloris*.

Annotauit etiam frequenter insecta, quae plan-
 tas inhabitare solent, et alia, quae ex plantarum
 disquisitione ad nos redundant, commoda. e. g.
Meloides vesicatorii copiam insignem alit *Ligustrum*;
Oleae infensus *Curculio*, in baccis habitans; *Cheno-*
podium *Scoparia* *Cimices* pellit; *Pinguicula* indicat
 in vicinia latentem *Tophum* siue *Porum aqueum soli-*
dum WALLERII; *Valeriana tripteri* florente *Gryl-*
lus stridet in campis, *Upupa* foetidum nidum aedifi-
 cat, *Rana* in fruticibus laete coaxat. *Rubi fruti-*
cosi foliis laruae *Phal. Bombycis*, defectu *Mori*, nu-
 triri possunt, sed vilius sericum inde obtinetur.

Verum eiusmodi plura commemorare nolumus,
 modo adhuc nonnulla, quae de viribus plantarum
 medicatis Cl. Auctor adduxit, breuiter repeta-
 mus; in primis cum ea, quae in priori Florae edi-
 tione annotauerat, nunc omissa, alia vero addita
 fuerint. *Valerianae officinali* antepilepticam virtutem, Tom. I.
 insigni exemplo Florae edit. I. confirmatam, in aliis P. 33.
 postea casibus felici semper successu expertus est.
Verbascum thapsus in phthisi bouilla laudauerat
 LINNAEUS, et in Carniolia vbique in morbis p. 155.
 pulmonum bouillae gentis pro specifico haberi,
 Auctor

- p. 170. Auctor retulit. *Vincae* minoris decoctum lacteum
p. 266. sanauit raucedinem, aphoniae fere similem. *Oxy-*
mellite Colchico curauit vetulam hydropicam ao. 65.
in duobus autem aliis hydropicis nihil idem profuit.
p. 268. *Aesculi Hippocastani* culturam maximopere commen-
dauit: purgat et sanat equos, vnde nomen accepit,
fructus excorticatus et puluerisatus in aqua tepida
spumescit, eamque aptam reddit purgandis linteis
loco saponis; folia inseruiunt pro pabulo pecorum
cornutorum; cortice coria praeparari possunt; in-
fusum fructus pro maceratione Cannabis inseruit,
hocque ipso melius forte lauari potest sericum cru-
dum, cum vulgaris sapo impediatur, ne sericum sat
viuide coloretur. Cineres etiam dant sal pro depu-
rando serico valde proficuum; ex fructu quoque
paratur amyllum, puluis ab extractione substantiae
saponaceae residuus, ablutus, et cum furfure triti-
To. II. ceo mixtus, nutrit gallinas. Ita et *Pini Piceae* cul-
p. 246. turam et oeconomiam vtilissimam et necessariam
Tom. I. summopere suasit. *Baccae Sorbi Aucupariae* non
p. 346. solum nutriunt pecora et gallinas, sed etiam succum
praebent, ex quo spiritus vini parari potest. *Che-*
p. 369. *lidonii maioris* decocto necantur vermes, qui putri-
To. II. dis equorum vlceribus innascuntur; herba eiusdem
p. 241. cum pinguedine mixta, sanant incolae mictum
cruentum in bobus, quem folia *Quercus*, *robur dictae*,
producere solent. *Thlaspi Bursae pastoris* herba re-
p. 17. cens, cum oleosis tempestiue adhibita, sanat haema-
p. 133. turiam in bobus et tauris. *Onopordi Acanthii* radix
cocta et assumpta in modum Theae, specificum est
p. 285. in gonorrhoea incipiente. *Equisetum sylvaticum* bo-
bus maxime nocium, quippe dentium iacturam et
diarrhoeam efficit.

Reliqua, quae nouas, a Cl. Auctore exhibitas,
vel descriptas, vel icone expressas plantas concer-
nunt, silentio praeterire debemus, licet ex illis
maxi-

maximam quoque aestimationem mereatur opus. Dissertationem de plantis subterraneis promississe Tom. II. p. 473 solummodo adhuc notemus, eamque botanicis gratissimam fore, facile praevidemus.

VI.

Philosophical Transactions giving some account of the present undertakings, studies, and labours, of the ingenious, in many considerable parts of the world. Vol. LIX. for the Year 1769. P. I and II. pagg. 530. tab. aen. 46. London printed for Lockyer and Davis 1770.

i. e.

Transactiones philosophicae, quae laborum, ab eruditis in variis orbis terrarum partibus novissime susceptorum, quandam exhibent notitiam. Vol. LIX. P. I et II. ad annum 1769.

Voluminis quinquagesimi noni pars prima continet sequentes articulos.

I) Epistola Cl. I. MOULT ad Cl. PERCIVALL p. I.
Med. Doct. *in qua nova methodus radicem Salab praeparandi traditur.* Cl. Auctor eodem fere artificio, quod Cl. RETZIUS *) in Suecia adhibuit, etiam *orchidis morionis* radices ita praeparavit, ut similes iis fierent, quae ex Asia sub nomine radicis Salep afferuntur. Potest etiam ex *orchide palmata* praeparari. Vtitur vero Cl. Auctor imprimis
nouis

*) v. Aët. Academ. Suecic. Vol. XXV. p. 245. comm. nostr. Vol. XIV. p. 209.

nouis radicibus, quae antiquis accrescunt, easque, cuticula detracta, in furnum pistorium immittit, in quo intra dimidium quadrantis horae transparentes fiunt. Reliquam exsiccationem in conclauis sicco peragit. Planta ipsa in solo sicco sterili optime crescit, et cultura eius omnino commendari meretur.

p. 4. 2) *Breuis narratio de structura et effectu speculorum causticorum parabolicorum a defuncto Domino HOESERO Dresdae elaboratorum, quae nunc a Domino EHRARD sub arce Dresdenensi habitante possidentur.* Auctore Cl. WOLFE M. D. Recensentur experimenta, a Cl. HOFFMANN cum speculis causticis Hoesianis instituta, quorum maxima pars iam in promptuario Hamburgensi (*Hamburgisches Magazin*) continetur.

p. 9. 3) *Casus rarus de tribus acubus a puella deglutitis, et ex humero suppuratione expulsis;* in epistola Cl. LYSONS ad Cl. NICHOLLS. Haec epistola continet historiam puellae viginti duorum annorum, quae acus tres, in ore detentas, forte deglutierat. Hae in oesophago haerentes chirurgicis quidem instrumentis ante aliquot menses inferiora versus detrusae fuerant, symptomatum tamen vehementia minime remota est, quin potius raucedinem insignem, haemoptysin, dolorem in latere dextro sub costis spuris, tussi qua excruciebatur, et omni corporis motu auctum, et aliquoties conuulsiones experiebatur, quibus rectus inprimis superior oculi dextri musculus ita afficiebatur, vt aperto etiam oculo palpebra pupillam tegeret. Similis effectus in sinistro quoque oculo obseruabatur, sed post aliquot septimanas medicamentis remouebatur. Effluxis tan-

tandem aliquot mensibus, tumor in humero dextro se ostendit, qui tamen paullo post euauit, altero in superiore parte scapulae sinistrae eleuato, qui paulo post in abscessum mutabatur, ex quo, a chirurgo aperto tres acus deglutitae extrahebantur. Vulnus vero illud carnosam trapezii partem occupabat. Ex vita sedentaria aegrae catamenia quidem cessauerant; haemoptoe tamen, qua aegra afficiebatur, ex eorum defectu non explicari poterat, cum ea ab eo ipso tempore, quo acus ex oesophago remotae erant, iam inceperat. Iter harum acuum ex oesophago ad humerum maxime admirandum esse videtur, cum ipsos pulmones affectos, et sputum cruentum, et tussis, diaphragma autem laesum, dolor ad costas spurias ortus indicent. Oculorum tandem affectio, non nisi ex consensu nerui intercostalis cum tertio pare neruorum cerebri ceterisque, explicari potest. Ceterum difficillimum est intellectu, cur, dolore et tumore in dextro latere primum obuiis, aciculae tamen in sinistro latere inventae sint.

4) *Epistola* Ill. WILLIAM HAMILTON ad Cl. p. 18. MATY, in qua variae observationes circa montem Vesuuium aliosque vicinos montes igni vomos occurrunt. Alio loco iam varias observationes Ill. Auctoris circa eruptionem montis huius indicauimus, quarum continuatio hic traditur *). Ex ea patet plurimos Vesuuio vicinos montes et ipsum Vesuuium ignis vi olim ortos fuisse.

S f 2

5) *Epi.*

*) *Philos. Transact.* Vol. LVIII. ad annum 1768. p. I. comment. nostr. Vol. XVII. p. 386.

P. 22. 5) *Epistola* Cl. DAINES BARRINGTON ad Cl. WATSON *de variis arboribus, quae pro indigenis magnae Britanniae vulgo habentur.* Ostendit Cl. Auctor castaneam in Anglia non indigenam esse, sed fatiuam, eaque occasione de aliis arboribus, quae ex aliis regionibus in Angliam primum delatae sunt, disserit.

P. 39. 6) *Relatio de casu, in quo caput ossis humeri a reliquo humero serra, et magna deinde huius ossis portio exfoliationis ope separata est, motu tamen totius artus superstite.* Auctore Cl. WHITE Chirurgo. Ea est admiranda naturae vis in restituendis partibus variis, a reliquo corpore separatis, ut plurimae quoque observationes probent iacturam insignium fragmentorum ossium a natura iterum reparatam fuisse *). En nouum huius rei exemplum ! Adolescent sedecim annorum habitus scrophulosi inflammatione et deinde abscessu in humero sinistro afficiebatur, quo aperto, caput humeri carie affectum deprehendebatur. Cum corporis constitutio et symptomatum vehementia vix amputationem in articulo humeri permetterent, incisionis ope caput humeri, quod luxatum iam erat, Cl. Auctor extraxit et a reliquo osse separauit. Quo facto, paullo post alia quoque ossis pars exfoliatione protrudebatur et intra quatuor menses vulnus ita consolidatum est, ut hoc brachium altero ne vnum quidem pollicem breuius esset, motus brachii omnes eadem, quae antea, facilitate peragerentur et, quantum tactus ope iudicari posset, humeri caput ipsum perfecte restitutum esset. Sub curatione Cl. Auctor nullis fasciis, ferulis, vel aliis machinis brachium in vno eodemque situ seruare conatus est, qua simplici me-

thodo.

*) Conf. Aduers. Med. Practic. Vol. III. p. 45. seq.

thodo sine dubio id obtinuit, vt liber brachii motus etiam post operationem superstes remaneret. Cum in hoc casu caput ossis humeri iam ex parte restitutum videretur, antequam portio ossis corrupta, inter hoc caput et os sanum posita, separata esset: apparuit callum, quo amissa integra ossium frustra refarciuntur, non ex ossis fracti extremitatibus tantum, sed et ex proximis arteriis exsudare et quasi secretionis ope in vacuum locum deponi. Denique haec obseruatio probat amputationem humeri in articulo, capite etiam hoc carie affecto, non semper instituendam esse, cum operatio, quae hic describitur, non adeo periculosa sit, et brachium integrum seruetur. Idem de amputatione femoris in articulo quoque valet *).

7) *Epistola* Cl. WILL. BORLASE ad Cl. P. 47. MORTON, in qua relatio de stanno natiuo in Cornubia reperto continetur. Iam ante aliquot annos stannum natium in Cornubia a Cl. ROSEWARNE repertum fuisse alio loco monuimus **). Nunc aliud huius rei exemplum idem inuenit, stannum nimirum crystallisatum (*tin diamond*, Germanis *Zinngraupe*) rubescens vel granatico colore praeditum (*of the rosin kind*), vbi in cuiusdam crystalli medio fragmentum natiui stanni inclusum est.

8) *Commentarius de origine papyri naturalis, circa urbem Cortona in Toscania reperiundae.* Auctore Cl. IOHN STRANGE. Probat materiam illam
Sf 3 papyro

*) Si iconem contemplamur, suspicio epiphyseos relietae non sine fundamento esse videtur.

**) vid. comm. nostr. Vol. XV. p. 498. Act. Acad. Stockholm. Vol. XXVIII. p. 231. LINNAEI System. Natur. Edit. XII. T. III. p. 236. et Phil. Transact. Vol. LVI. p. 35 et 305. Conf. Cronstaedt. Mineral, ex edit. Cl. BRÜNNICHE p. 199.

papyro (vel panno tenui, ex serico confecto, quod nostrates *Watte* vocant) simili, qua etiam apud nos post inundationes prata obteguntur, non ex fibris diuersarum plantarum filamentosarum, ita inter se intertextis constare, sed ad conferuas pertinere; qua occasione botanicus *conferuae* apud DILLENIIUM et LINNAEUM character varie emendatur, et specimina papyri artificialis, ex hac conferua, nec non ex genista iunceae confectae, describuntur.

P. 59. 9) *Experimenta circa vim lateralem explosionis electricae.* Auctore Cl. JOSEPH PRIESTLEY.

P. 63. 10) *Experimenta varia circa vim explosionis electricae.* Auctore EODEM.

P. 71. 11) *Relatio de terrae motu Macaensi et singulari specie simiarum, cauda nulla instructarum, quae in interiore parte Bengalensis regionis inueniuntur.* Ex litteris Cl. DE VISMÉ ad Cl. BAKER. Simia hic descripta videtur esse ea species, quae ab Ill. BUFFON *) *Gibbon*, a LINNAEO vero in Mantissa altera p. 425 *Homo lar* vocatur. Longitudo tamen manuum in figura hic adiecta non tanta est, quanta a BUFFONIO delineatur. Ab incolis *Golock* dicitur.

P. 74. 12) *Epistola Cl. ROBERTSON a Cl. WELL, in qua demonstratio legis motus corporis deflexi duabus viribus, perpetuo ad duo puncta fixa tendentibus, continetur.*

P. 79. 13) *Epistola Cl. PAXTON ad Cl. MILLES.* In hac fulguris effectus nonnulli indicantur.

14) *Epi-*

*) *Histoir. natur. Vol. XIV. p. 92. comm. nostr. Vol. XV. p. 659.*

14) *Epitome observationum meteorologicarum*, p. 81.
Plymuthia. 1768 factarum. Auctore Cl. FARR.

15) *Relatio de aurora boreali* d. 6 aug. 1768. p. 86.
Lutetiis Parisiorum a Cl. MERCIER observata.

16) *Observationes circa probabilitatem et iudicium* p. 89.
de vitae spatio, de augmento generis humani, de mutuo
nexu amplitudinis et frequentiae urbium, Londini nomi-
natum, quoad salubritatem et numerum incolarum. In
epistola Cl. R. PRICE ad Cl. BEWIS.

17) *Dissertatio epistolaris de ossibus et dentibus* p. 126.
elephantum, aliarumque belluarum in America septen-
trionali aliisque borealibus regionibus obuiis, qua indi-
genarum belluarum esse ostenditur. Auctore Cl. R. E.
RASPE. Ex alio transactionum loco *) patet ossa
maiorum animalium, quae a nonnullis pro carniuo-
ris habita sunt, in America septentrionali ad flu-
vium *Ohio* inuenta fuisse. Illa Cl. RASPE occasio-
nem dederunt, ut paullo accuratius in originem
eorum inquireret. Demonstrat vero ea aliaque
ossa insolitae magnitudinis, quae in Europa et Asia
boreali reperta sunt, alio plane modo sepulta fuisse,
quam corpora marina, quae profundius in lapidi-
bus latent; hinc non esse peregrina, nec marina, et
belluas hasce indigenas, et fato suo aut hominum vi
extinctas fuisse. Belluas has olim in his regionibus
habitasse, et mutatione climatis, vel axis aut figurae
terrae interfectas fuisse plurimi putarunt, qui o-
mnes hic egregiis argumentis a Cl. Auctore refu-
tantur. Cum itaque haec ossa in pluribus ab ele-

Sf 4

phan-

*) vid. Phil. Transact. Vol. LVIII. p. 34. comm. nostr.
Vol. XVII. p. 388. it. v. observationem Cl. COL-
LINSON. Phil. Transact. Vol. LVII. p. 468. comm.
nostr. Vol. XVI. p. 268 et 281.

phantinis aut aliorum animalium cognitorum ossibus differant, aliae cuidam speciei incognitae, et nunc penitus deletae, adscribenda esse Noster putat. Esse potuit elephantorum species in ipso septentrione, reliquis omnibus praecellens frigoris patientia, quae forte in antarcticis nostris terris borealibus parallelis adhuc habitat. Caussam vero, cur tam ingens sceletorum et ossium aceruus in tam breui spatio Americae repertus fuerit, Cl. Auctor ponit in eo, quod belluae salis, quo terra in eo loco abundabat liguriendi deliciis in hanc paludem allectae, paludosa terra ponderi corporis cedente, ibidem sepultae fuerint.

p. 136. 18) *Relatio de singulari ratione incrementi animalculorum, in infusis variorum vegetabilium reperiundorum, cum descriptione noui salis indissolubilis ex seminibus cannabinis, in aqua putrescentibus orti.* Auctore Cl. IOHN ELLIS. Ill. DE MÜNCHHAUSEN in egregio opere, cui titulus (*der Hausvater*) praefixus est *) asseruit, semina fungorum in aqua excludi et viuere et mori, demumque figi et in fungos excrecere; quae res Ill. LINNAEUM eo permouit, vt semina haec, ex animali natura in vegetabile mutata, animalibus infereret, nomineque *chaos fungorum* insigniret **). Inuentum hoc Cel. ELLISIUM eo permouit, vt accuratius in rem tam mirabilem inquireret. Reperit vero semina haec moueri quidem, non tamen motu ipsis proprio et intrinseco, sed ab animalculis minutissimis, vix visibilibus, quae iis feminibus forte vescuntur, motum hunc excitari. Plurimas hac occasione Cel. ELLISIUS circa animalcula infusoria instituit obseruationes et in infuso feminis cannabis animalcula microscopica vidit, quae sponte

*) Vol. I. p. 149.

**) Syst. Ed. XII. p. 1326.

sponte in duo alia animalcula secederent, quam tamen obseruationem se primum Cl. DE SAUSURE debere, candide profitetur. Quod vero fallud indissolubile ex infuso seminum cannabinorum confectum attinet, notandum est illud etiam in infuso seminum lini et tritici reperiri. Aqua non soluuntur eius crystalli, sed, si putredo increfcit, sensim destruuntur. Hinc Cl. Auctor quaerit, num forte partes vegetabilium oleosae, quae in superficie infusorum cum spuma natent, crystallisentur? In tabula adiecta quinque species delineantur, quae ad genus zoophytorum, quod LINNAEUS *voluox* dicit, pertinent. Plurimae ex his pinnis minutissimis mouentur, quae tantum, si animalcula torpida fuerint, conspici possunt, quod arte obtineri possumus, si gutta infusi *geranii zonalis* LINN. infuso, quod microscopio examinatur, addatur.

19) *De computatione distantiae solis a terra ope theoriae grauitatis.* Auctore Cl. HORSLEY. p. 153.

20) *Obseruationes meteorologicae in oppido Bridgewater et Lugdun institutae a. 1768.* Communicatae a Cl. MILLES. p. 155.

21) *Descriptio methodi propositae templum cathedralae Londinense S. Paulo dicatum ab effectibus fulminis defendendi.* p. 160.

22) *Obseruationes circa transitum Veneris per discum solis d. 3. Ian. 1769.* Auctore Cl. I. HORSFALL. p. 170.

23) *Obseruatio transitus veneris per discum solis in Castello Sherborn et Oxonii facta.* Auctore Cl. HORNSBY. p. 172.

p. 183. 24) *Similes observationes* auctore Cl. HORSLEY.

p. 189. 25) *Similes observationes in oppido Kew factae.*
Auctore Cl. I. BEUIS.

p. 192. 26) *Similes observationes*, a Cl. I. CANTON
Londini factae.

p. 195. 27) *Relatio de variis inscriptionibus sepulchralibus et figuris* Bonni in Germania repertis. Auctore
Cl. I. STRANGE, in litteris eius ad Cl. WEST.

p. 198. 28) *Relatio de systemate vasorum lymphaticorum in amphibiiis*, ex epistola Cl. HEWSON ad Cel. HUNTERUM. Clarissimus huius epistolae Auctor, qui in-
ventione vasorum lymphaticorum in auibus inclauit. *) eadem nunc in testudinis anatome detecta exponit. Impletis enim ramis eorum maioribus massa ceracea, minoribus mercurio viuo, obseruavit: differre haec vasa lymphatica a lymphaticis auium in eo, quod maiores rami, in humeri vasa lymphatica excurrentes, nullas glandulas transfirent. In mesenterio vasa sanguifera comitantur, ad cuius radicem in sinistro spinae dorsi latere cum lymphaticis splenis anastomosis faciunt, et rete formant, quod aortae dextrae (notum enim est duas in amphibiiis aortas esse) incumbit. Canalis, qui ex hoc rete exit, vbi paullulum adscendit, ante aortam dextram largum format receptaculum, quod intrant vasa lymphatica ventriculi, pancreatis, duodeni cet. et ex quo ductus thoracici tres exeunt. Horum vnus in dextro latere positus est, in quem vasa lymphatica colli aliarumque partium intrant, qui subclauiae dextrae immittitur, duo vero in sinistro, qui
aortam

*) vid. Philos. Transact. Vol. LVIII. p. 217. comm. nostr. Vol. XVII. p. 396.

aortam finiftram vtrinque cingunt, lymphatica vafa huius lateris recipiunt, deinde coniunguntur, et, facto plexu reticulari, ramum exeuntem fubclauiae finiftrae inferunt. Hic plexus in auibus defideratur. Vafa lymphatica in contextum cellulofum orificiis fuis hiare, et hinc contextum illum ad fyftema vaforum lymphaticorum pertinere, Cl. Auctor probat.

29) *Relatio de fyftemate vaforum lymphaticorum* p. 204. in *pifcibus*, auctore EODEM. Describuntur vafa illa, qualia ea in *Gado aeglefino* Cl. Auctor reperit, quam descriptionem hic omittimus. In pifcibus fyftema lymphaticum glandulis valuulisque penitus deftituitur. Vafa lactea in iis reticulum inter mufcularem villofamque inteftinorum tunicam formant, leniori iniectione, a parte mufculari facta, facile demonftrandum. Praeterea monet Nofter villos inteftinorum in omnibus, quae difquifuit, animalibus ex reticulari fabrica vaforum lacteorum conftare, nec ea in ampullam, vt LIBERKÜHNIIUS ex homine descripfit, terminari, cuius obferuatio etiam hanc ob caufam Noftra fufpecta effe videtur. Addit fub finem epiftolae indicem praeparatorum ad hiftoriam vaforum lymphaticorum in amphibiiis et pifcibus fpectantium, quae Regiae focietati exhibuit.

30) *Litterae* Cl. LANE ad Cl. CAUENDISH p. 216. de *folubilitate ferri in aqua fimplici ope aeris fixi*. Solutionem ferri in aquis mineralibus vt plurimum a chemicis acido cuidam minerali volatili tribui notum eft, quae tamen aquae alcali potius abundant. Cum vero per experimenta Cl. CAUENDISH *) pateat, terram calcaream ope aeris fixi in aqua fufpendi

*) vid. *Philofoph. Tranfact.* Vol. LVI. p. 141. comm. noftr. Vol. XV. p. 504.

pendi, simile quid cum ferro fieri Cl. Auctor suspicatus est, quod et experimenta eius probant. Monemus tamen inter illa quaedam esse, in quibus solutio ferri acido forte subtili, ex materiis fermentescentibus exhalanti, adscribenda est.

- p. 228. 31) *Relatio de variis phaenomenis, sub ingressu veneris in discum solis observatis.* Auctore Cl. HIRST.
- p. 236. 32) *Observatio transitus veneris per discum solis d. 3. ian. 1769 in urbe Leicester, facta a Cl. LUDLAM.*
- p. 241. 33) *Epistola Cl. I. HOPE ad Cl. WATSON in qua rara planta, in insula Skye reperta, describitur.* In loco quodam huius insulae haec planta a Cl. ROBERTSON detecta est, quam Cl. Auctor *Eriocaulum decangulare* esse putat, eiusque descriptionem vberiore hic communicat.
- p. 247. 34) *Observationes astronomicae, a Cl. HOLLAND in America septentrionali factae.*
- p. 253. 35) *Observationes astronomicae in insula Hammerfoft, a Cl. DIXON factae.*
- p. 262. 36) *Observationes similes in Promontorio septentrionali (North Cape) factae, a Cl. BAYLE.*
- p. 273. 37) *Observatio transitus veneris in insula Cou-dre ad Quebecum facta a Cl. WRIGHT.*
- p. 281. 38) *Casus singularis ex epistola Cl. GOOCH ad Cl. WARNER.* Vir quinquaginta annorum, laxiori corporis habitu praeditus, per decem annos febre singulari, in anni spatio bis recurrente, laborare solet,

solet, quae catarrhalis speciem prae se fert, iuncto tamen eo symptomate, ut pruritus insignis cutis, praesertim circa articulos, sentiat, quem maculae in cute rubicundae, tumor exiguus et rigiditas digitorum sequuntur. Quae ubi per viginti quatuor horas durauerint, cuticula in toto corpore separatur, ita ut in quinque digitis manuum pedumque, formae chirotecarum, una cum unguibus secedat, non sine insigni aegri dolore. Reparatur tamen damnum illud mox nova cuticula, quae primis diebus maxime sensibilis est, ungues vero intra sex menses restaurantur.

39) *Observatio ingressus veneris in solem, d. 3. p. 284.*
Iunii 1769. habita Gryphiswaldae a Cl. MAYER.

40) *Observatio eclipsis solis d. 4. iun. 1769 a p. 286.*
Cl. SMEATON habita.

In parte secunda pauciores observationes occurrunt, quae propius ad nos pertinent, cum plurimae ex iis de astronomicis rebus tractent. Reperiuntur vero in ea sequentes :

41) *Relatio de transitu veneris per discum solis in p. 289.*
Pennsylvania d. 3. iun. 1769. observato, communicata a Cl. MASKELYNE.

42) *Observationes eiusdem transitus habitae in p. 327.*
Suecia. Communicatae a Cl. P. WARGENTIN.

43) *Observationes similes a Cl. WILSON, Glas. P. 333.*
gouii factae.

44) *Similes observationes, a Cl. LIND prope p. 339.*
Edinburgum factae.

45) Si-

P. 347. 45) *Similes observationes Gibraltariae factae a*
Cl. IARDINE.

P. 351. 46) *Observationes, a Cl. WINTROP Cantabrigiae in Noua Anglia factae.*

P. 359. 47) *Commentarius de varia quantitate pluuiarum quae in uno eodemque loco in varia altitudine descendere videtur. Auctore Cl. HEBERDEN.*

P. 363. 48) *Observatio eclipsis lunae, prope Edinburgum facta d. 12 dec. 1769 a Cl. LIND.*

P. 367. 49) *Relatio de auroris borealibus duabus, Oxonii observatis a Cl. SWINTON.*

P. 374. 50) *Relatio de transitu veneris per solem Lutetiae Parisiorum observato. Ex litteris Cl. DE LA LANDE et MESSIER.*

P. 378. 51) *Relatio de eodem transitu Londini a Cl. AUBIN observato.*

P. 379. 52) *Relatio de oleo ex Carolina septentrionali a Cl. BROWNRIG transmissio, auctore Cl. W. WATSON. Cum in America olea non crescat, et insignis olei copia quotannis ex Europa huc transferatur, nouum hoc inuentum oleum omnino attentionem meretur. Praeparatur vero ex seminibus plantae, quam LINNAEUS *Arachin* vocat, quae ex Africa a nigris feruis allata nunc in America ubique fere colitur, cum semina eius, ex quibus oleum hoc expressione obtinetur, victus loco adhibeantur. Neque semina, neque oleum ipsum rancidum fieri asseritur. Ab Anglis haec planta *groundpease* vocatur.*

53) *Catalogus quinquaginta plantarum regiae* p. 384.
Societati, ex horto Chelseano a. 1768. exhibitarum a
 Cl. HUDSON.

54) *Descriptio vasorum lymphaticorum vrethrae* p. 392.
et colli vesicae, auctore Cl. W. WATSON. Quam-
 quam multorum eruditorum studium eo fuit con-
 versum, ut lymphaticorum vasorum naturam in
 homine declararent, nondum tamen anatomici eo
 peruenerunt, ut completum vasorum horum syste-
 ma conficere possent. Plures enim partes esse, qua-
 rum vasa lymphatica adhuc ignorantur, neminem
 latet. Inter illas vrethra est et vesica vrinaria,
 quas tamen vasis his non destitui, Cl. Auctoris descri-
 ptio hic tradita probat. Communia habent haec
 vasa plura cum vasis ceterarum partium, ut pro-
 gressum in superficie, teneritatem, pelluciditatem,
 anastomoses, valuulas cet. Incipiunt in utroque
 latere capitis gallinaginis et paruulis orificiis resor-
 bentibus in interna membrana vesicae et vrethrae
 aperiuntur. Excurrunt super prostatam et collum
 vesicae, iunguntur crebrius inter se, continuantur
 in contextum cellulosum tunicae vesicae internae
 substratum, et anastomosis patiuntur cum lym-
 phaticis vasorum feminalium, cum quibus ad vicinas
 glandulas conglobatas et tandem ad ductum thoraci-
 cum, uti omnia fere reliqua lymphatica vasa, ten-
 dunt. In membranacea tantum vrethrae parte,
 eiusmodi vasa reperiuntur, in qua maxima liquoris
 copia inuenitur. Frequens inflammatio et indura-
 tio, quas orificia eorum experiuntur, sine dubio
 causae sunt illius speciei gonorrhoeae benignae, quae
 raro vel nunquam curatur, et ex accumulatione flui-
 dorum tenuium, resorptione eorum impedita, oritur.
 Mediantibus his vasis virus quoque venereum ad
 ipsam massam humorum vniuersalem, sine vilo
 malo

malo locali praegresso transferri potest. Adiecta est huic descriptioni tabula aenea, in qua vasa haec vrethrae et colli vesicae lymphatica delineantur.

- p. 399. 55) *Eclipsis primi satellitis iouis cet. in observatorio Greenwichienfi observata.*
- p. 402. 56) *Observatio similis a Cl. WILSON facta.*
- p. 404. 57) *Observationes astronomicae in Suecia factae ex literis Cl. FERNES.*
- p. 407. 58) *Observatio transitus veneris in vico East Dereham a Cl. WOLLASTON facta.*
- p. 414. 59) *Observatio eiusdem transitus in Pensylvania facta, a Cl. FRANKLIN communicata.*
- p. 422. 60) *Observatio eiusdem transitus in arce Windsorienfi facta a Cl. HARRIS.*
- p. 432. 61) *Explicatio duorum nummorum Samniticorum auctore Cl. SWINTON.*
- p. 444. 62) *Observatio transitus veneris in Marylandia facta a Cl. LEIDS.*
- p. 446. 63) *Experimenta, quae probant causam luminis, quod nocturno tempore in mare observatur, ex putrefactione substantiarum animalium oriri. Auctore Cl. CANTON. Notum est variare multum eruditorum circa originem lucis huius sententias, et recentiores fere omnes illud vermiculis, in aqua marina viventibus, tribuere. Contraria vero ratione Cl. Auctor illud putredinis esse effectum contendit, illudque variis experimentis comprobare tentat.*
Pisci-

Piscibus enim, inprimis *Gado merlango* et *halece* in aquam marinam immisiss, et vase in gradu caloris 54 thermometri Fahrenheitiani graduum detento, putredine accedente piscis lumen spargere incepit, eaque aucta aqua ipsa lucebat. Increuit tamen tantum per viginti quatuor horas, quibus elapsis, nullam amplius lucem edidit. Comparatis vero his phaenomenis cum aqua fluuiatili, in qua piscis putredini relinquebatur, nihil eiusmodi in hac aqua apparuit. Aqua autem simplex, cui sal marinum ea dosi admixtum fuerat, vt aequalem grauitatem specificam cum aqua marina obtineret; idem praestitit, cum e contrario aqua, cui tanta salis copia admiscebatur, quantam continere posset, nullum lumen ederet. Pisces in aqua marina vel modice falsa celerius, quam in dulci, aut in ea, cui maior salis copia addita fuerat, putredinem subeunt.

64) *Observationes astronomicae* Lutetiis Parisiis. p. 454. a Cl. MESSIER factae.

65) *Observationes astronomicae* a Cl. WATER p. 461. et DYMOND factae, in sinu Hudsoniano.

66) *Epitome litterarum* a Reu. Patribus Soc. p. 489. Iesu Pekini in China commorantibus ad Regiam societatem scriptarum, in qua de characteribus Sinenfibus, eorundemque cum hieroglyphicis characteribus Aegyptiorum conuenientia agitur.

67) *Relatio de transitu mercurii per discum solis* p. 505. d. 25 octobr. 1743. Cantabrigiae in noua Anglia obseruato a Cl. WINTHROP.

68) *Methodus lentes obiectiuas telescopiorum refringentium accurate sphaericas parandi.* Auctore Cl. SHORT,

Tom. XIII. P. IV.

Tt

VII.

Pharmacopoea Heluetica in duas partes diuifa, quarum prior materiam medicam, botanico-physico-historico medice descriptam; posterior composita et praeparata modum praeparandi, vires et vsum exhibet, scitu et consensu gratiosi collegii medici Basileensis digesta. Praefatus est Ill. ALBERTUS DE HALLER, accedunt syllabus medicamentorum in classes diuifus et duo indices necessarii, primus morborum et curationum, alter trilinguis lat. germ. gall. Basileae sumptibus et litteris Ioh. Rod. Imhof. et filii. 1771 fol. Alp. 7. pl. II.

Quo latius patent rei medicamentariae fines, eo difficilior est dispensatorii conficiendi labor, relatus inprimis ad adeo diuersum medicorum studium iudiciumque. Siue enim praestantissima tantum selectissimaque cogantur, quae ab haud paucis adhuc desiderantur, supererunt varia; siue amplius moliaris opus, quae abesse malint multi, nunquam deficient. Aequi tamen alienae industriae iudices, atque a prauo partium studio remoti, institutum laudabunt vtrumque, probabuntque vt perutile, proque scribendi consilio diuerso valde quoque necessarium. Et ex ampliorum quidem pharmacopoeiarum genere ea iam est, quam indicamus, Heluetica, conscripta a viris, quorum nomina quidem latent, peritia tamen et doctrina abunde satis elucet; a talibus idcirco, qui digni erant, quorum laboribus praefararetur Ill. HALLERUS. Cuius quidem summi viri praefamen, vti complura habet vtilissime dicta, ita quoque varias de simplicibus continet animaduersiones,

nes,

nes, tum ex proprio obseruationum penu, tum aliunde petitas, quibus, quae in opere ipso dicta sunt, vel emendantur, vel adaugentur confirmanturque. Sic notat inter alia, pro asaro, quod equis, ad vomendum natura non factis, male propinari monet: hominibus thoram venenatam dari in alpibus occidentalibus: tithymali cataputiae grana aluum ducere, esseque grati saporis, neque rari in Aquilecensibus vsus: chamaepityos infusum theiforme in senum arthritide vere profuisse. Colchici radicem recentem rapacei saporis plane, vt vult *) Cl. KRATROCHVILL absque noxa comedi: ob inertiam diffitendum esse anagallidi, lycoperdo ceruino, brunellae, betonicae: ob veneni suspicionem lycoperdo bouistae, coccinellae, granis kermes, euphrasiae, mercurialis, scrophulariae toti classi: ob acre rancidum spermati ceti, foeniculi et meliloti virtuti emollienti: gummi copal minerale esse bitumen: gummi gutta vsus se esse vigesies absque noxa, si flatulentum ventriculi tumorem excipias: ebuli semina potenter mouere vrinam, inesse tamen ingrati quid, quod diu non feras: helleborum, vt ranunculos, per vetustatem forte acrimoniam deponere: iridem palustrem luteam pariter esse acerrimam, aluumque ducere: spongiam vsitam strumas nondum confirmatas soluere, cum saccharo datam, vi, vt videatur, falsa, quum solus aer marinus grandes strumas dissipet. Praefationem excipiunt dissertationiunculae de pharmacopoei dotibus et studiis, de eiusdem officiis, de vsu dispensatorii, atque de medicamentorum nominibus fallacibus, compendiosis, ambiguis, lectu perquam vtilis.

Ipsam opus, vt inscriptio iam docet, bipartitum est, parteque priore simplicia, et quae in officinis

Tt 2

non

*) v. comm. nostr. Vol. XIII. p. 130.

non parantur, sed aliunde transmissa habentur, ordine exponuntur alphabetico, nominibus tum vulgo receptis latinis, francogallicis, teutonicis, tum in historiae naturalis auctorum praestantissimorum veterum recentiorumque monumentis usitatis; indicatis simul optimis vegetabilium depictorum iconibus, remediorum locis natalibus, bonitatisque notis; adiecta praeterea virium medicatarum breui et sobria declaratione. Additus est index tam francogallicorum, quam teutonicorum nominum.

Altera parte praeparata pariter atque composita sistuntur, itidem ad literarum ordinem, non solum ex aliis id genus libris petita vberissima, sed etiam passim noua, nusquam adhuc dicta; vel saltem rectius praescripta; interdum nimia; quae tamen vel nomine tenus tantum laudare breuitatis studiosis nobis haud licet. Subiecta est cuilibet medicamini virtutum modique in morbis vtendi significatio breuis, concinna, non nimium laudatrix, cautelis quoque additis congruae applicationi prospiciens. Allata etiam passim est virorum doctorum fideque dignorum auctoritas, qui de vera medicamentorum praeparatione et vtilitate scienter atque recte praeceperunt. In syllabo repetuntur praeparatorum compositorumque ad classes suas reuocatorum nomina et in indicibus, priore quidem, quaenam cuilibet morbo curando inseruire poterant remedia, intus extusue applicata; posteriore, quibus nominibus illa tum Francogallis, tum Germanis veniant, indicatur. Vnde quidem apparet, qui plenior cupiant pharmacopoeam, iis hanc maximo iure posse commendari.

VIII.

Pharmacopoea Danica regia auctoritate a collegio medico Havniensi conscripta. Havniae apud Heineck et Faber, Bibliopolas, Typis Nicolai Mölleri, Aulae Typographi 1772. 4. mai. Alfab. I. pl. 20. c. praef.

Quo plenior erat Heluetica pharmacopoea, eo haec Danica contractior est. Est et ipsa in duas distincta partes. Prima offeruntur simplicia, non omnia, sed selecta ad trium naturae regnorum ordinem. Addita sunt officinalibus nominibus vernacula Danica, Noruagica, Lapponica, Germanica, inque vegetabilibus Linnaeana triuialia; sique indigena planta est, ubi in Flora Danica icon exhibetur, indicatum fuit. Sequuntur characteres sensibus obuii, saporis, odoris, figurae. Traditur porro locus natalis, canonesque generaliores de collectionis tempore et asservationis modo proponuntur. In notis bonitatis exponendis magna posita est opera, inprimis si de exoticis agitur, et praestantioribus medicamentis, ut sunt cortex Peruvianus, moschus, manna, aliaque.

Altera pharmacopoeae huius pars medicamenta composita et praeparata exhibet. Multa hic compositorum frustra quaesieris, alia tamen egregia et nobilia inuenies, tum ex optimis auctoribus hausta, ut est v. c. Elixir balsamicum WERLHOFII, tum noua quoque haud pauca. Sunt etiam alio plane et concinniori modo praescripta, e quibus tantum Elixir pectorale RINGELMANNI, vulgo Regis Daniae, laudasse sufficiat. Quum enim in aliis dispensatoris formula eius extet amplissima, hic ita descriptum habetur, ut extracti liquiritiae vnciae

sex, aquae foeniculi libra vna, tresque librae spiritus salis ammoniaci anisati inuicem mixtae per viginti quatuor horas digerantur, deinde colentur. Si quae compositiones sunt, quae recentem, dum praescribuntur, exigant praeparationem, asterisco eae fuerunt indicatae. Classibus illis medicamentorum, quorum similis est praeparatio, praefixi sunt sui cuilibet canones. Ordo ceteroquin hac in parte alphabeticus seruatur. De viribus medicaminum, et de morbis, aduersus quos possint valere, additum nihil est, quippe quae medicum rationalem et vere doctum fugere nequeunt.

IX.

Traité des maladies des yeux, et des moyens et opérations propres à leur guérison, par LOUIS FLORENT DESHAIS GENDRON, Professeur et démonstrateur Royal pour les maladies des yeux aux écoles de chirurgie, et adjoint de l'academie Royale de chirurgie Tom. I. à Paris, chés Claude I. B. Herissant 1770. 12. plagg. 16. cum dedicatione et praefatione. Tom. II. ibid. eodem 12. plagg. 17½ cum praefatione.

h. e.

Tractatus de morbis oculorum, eorumque curatione Auct. LUDOVICO FLORENTIO DESHAIS GENDRON, Tom. I. II.

Fusum satis, et ex aliis scriptoribus vt plurimum congestum, offert nobis Cl. Auctor opus : in quo quidem recensendo ideo breuiiores erimus, cum plera-

pleraque iam cognita sint, vel parum ex propria experientia, quamvis per quadraginta annos morbos oculorum tractauerit, probatum adiiciatur.

Continet tomus primus partem anatomico-phy- Tom. I.
siologicam oculi, cum pathologia palpebrarum; al- p. 60.
ter morbos bulbi complectitur. Ex anatomicis ea
notatu digniora nobis videbantur, cum humorem
cristallinum ex arteria lymphatica, per ipsum vi-
treum humorem traducta, quae lympham suam len-
tem inter et capsulam deponat, ubi a lente absor-
beatur, deriuat. Veram porro et solam sedem vi- p. 98.
sus in tunica choroidea ponit. Etsi vero haec sen-
tentia a multis doctis viris reprobata est, nec cum
ipsa experientia conuenire videtur; his tamen argu-
mentis confirmare tentat: 1) substantiam cerebri
insensibilem, ita etiam neruum opticum, Auctore
Cl. MARIOTTE, omnis sensationis expertem esse;
2) pia mater verum organon sensationum esse,
ideo etiam tunicam choroideam, ut propaginem
piae matris, organon visus constituere, praesertim
cum solida ea sit, elastica, admodum sensibilis, et
nigredine sua radios absorbeat. ne diffundantur;
3) in plurimis oculi inflammationibus solam cho-
roideam pati, retina insensibili cet. Quid vero de
hac sententia statuendum sit, et quousque haec ar-
gumenta eam probare possint, non decernimus;
iudicio potius atque perspicuitati aliorum relinquen-
dum putamus.

Iam ad pathologiam palpebrarum cum Nostro P. 133.
accedimus: nec hic omnes morbos, eorumque di-
uisiones, quae multae sunt; neque causas eo-
rum multiplices, vel diagnoses et prognoses; nec
tandem methodum medendi, quae noua ut pluri-
mum non videtur, recensuimus; quaedam potius,
non plane contemnenda, eligemus. Tumores cy- p. 195.
sticos

- fricos palpebrarum Cl. Auctor saepissime per falculinare, aqua solutum, discussit. Si eiusmodi tumores in superficie interna palpebrarum proxime ad cantum oculi internum conspiciuntur, viae lacrymales facillime ab operatione laeduntur; viis vero lacrymalibus ipsis iam laesis, operatio plane cesset; si tumor sedem statim sub cute externa habeat, cutis ipsa transuersim a canto interno ad externum incidatur, ne musculo orbiculari officiamus; interna autem cutis, si tumor ibi appareat, per longitudinem incidatur, vt leuator palpebrae saluus maneat. Instrumentis ab aegro reformidatis, butyrum antimonii inter caustica eminet. Suturam quoque cruentam in vulneribus palpebrarum emplastris glutinantibus semper post habendam esse
- p. 249. defendit, In relaxatione palpebrae superioris h. e. si ea iusto longior sit, fasciam comprimentem, aqua calida et spiritu vini camphorato imbutam, nec non fumigationes ex decocto roborante suadet, cum operatio, qua superabundans pars praescindatur vel anceps sit, vel si aeger aetate prouectior, aut malum iam inueteratum sit, plane nulla iudicetur. Sic
- p. 254. et in retractione palpebrae superioris s. lagophthalamo operationem, accurtatam partem prolongandi, prorsus dissuadet, cum vulnus linteis carptis difficile extendi, nec labia eius a se inuicem ita diduci possint, vt ex lata cicatrice prolongatio palpebrae
- p. 267. sequatur. In ancyloblepharo, vbi palpebrae versus se inuicem, vel cum cornea concretae sunt, solum separationem, per filum sericum, specillo applicandum, vel scalpellis variis instituendam, locum habere asserit, porro ne iterum concrecant, interponenda lamina plumbea caueatur.
- p. 305. Fistulae lacrymalis causas vel extra vias lacrymales deriuat, vel in iis ipsis quaerit. Accidere interdum asserit, vt materia in sacco lacrymali con-
- tenta

tenta, viam, inter somnum aegri, per nasum vltro sibi paret, cuius tamen contrarium paullo post defendit. Cum Cl. s t. y v e s afferat, faccum lacrymarum, stante aegro, plicam formare, qua ductus inferior tegatur; Nostro probabilius videtur, materiam in sacco contentam, transpiratione per noctem dissipatam, denuo inter vigilandum, ex compressione glandulae lacrymalis, et secretione lacrymarum, in faccum vacuum ductarum, restitui. Fusius methodos Cl. LA FOREST, PETIT, ME- P. 340.
JEAN et CABANIS perstringit, docetque, nullam earum semper satisfacere, quippe meliores et faciliores inuentu sint, quam applicatu. Suppuratione facta, iniectionem ex decocto conueniente suadet, cui deinde turundas plumbeas (tente de plomb) subiungit, iisque saepius repetendis multum vtilitatis tribuit. Corpora tandem peregrina p. 378.
in oculum immissa, grauibz symptomatis stipata, cito et vi, si opus est, extrahi monet: sic spinam in puero, ad duos digitos transversales in oculum iniectam, post duos dies vi extraxit, oculo tamen coeco relicto.

Alterum tomum Cl. Auctor ita absoluit, vt mor- To. II.
bos bulbi ipsius, vel partium, quae bulbum cingunt, pertractet, eosque in tunicarum, humorum neruorumque distinguat: earumque partium aegritudines demum subiungat, quae post bulbum in cavitate orbitae conspiciuntur. Ophthalmias primum perpendens corneam interdum ita inflammari docet, vt tota rubeat: oculos vero interdum inflam- p. 5.
mari et rubere, sine vlllo dolore ab aegris percepto, quam ex ruptis vasis sanguineis coniunctivae, sanguineque in contextum cellulosum coniunctivae effuso deriuat. Cum inflammationum oculorum causam in primis viis non quaerat, earum euacuatio-

- num rationem non satis habet: summa enim cautione eas tum, cum morbus in decremento sit, adhibendas esse; interdum tamen, quem quidem statum non definit, in plethoricis purgantia, quid? quod ipsa emetica sub initium morbi requiri. Inter collyria aquam ophthalmicam Cl. DACQUIN *)
- p. 25. admodum commendat. Ophthalmoxysin dissuadet, eique discissionem vasorum varicosorum cum lanceola, cum tutior et minus dolorifica sit, praefert.
- p. 32. In puero Noster bulbum oculi per oedema tunicae coniunctivae, ex cacochymia scrophulosa oriundum, ad oui gallinacei magnitudinem extensum vidit. Operatio in hypopyo ex eo non satis tuta videtur, cum maturitas puris saepissime nos lateat, indeque, quo iusto tempore incisionem instituamus, incerti reddamur: hinc consultius agi, si hypopium sibi relinquatur, donec sibi ipsi viam paret. Pus enim in camera dolores non creare, nec ob crassitiem suam per factam aperturam transire posse, vulnus mox iterum claudi, ut ita pus novam viam sibi faciat necesse sit: duas ergo cicatrices oriri, eamque ex vulnere artificiali maiorem et deformiorem fieri. Quam sententiam Auctor ex adiecto exemplo probat. Quousque vero ea stare possit, numne cum experientia conveniat, non determinamus.

In

*) Aqua haec sic paratur: R. Tutiae Alexandr. in aqua rosar. ter ablut. et super porphyriten tritae; Caryophyll. puluerifat. aa. vnc. vnam et dimidiam; Sacchar. cand. vnc. vnam; Camphor. et aloes aa. drachm. vnam et dimidiam; Vini Hispan. libras quatuor; Aquae rosar. pallid. libram dimidiam; Aquae chelidon. foenicul. euphras. et rutae aa. vnc. duas. Mixta haec digerantur per quindecim dies, et feruentur.

In leucomate porro aloe, et inter topica colly- p. 84.
 rium ex bile lucii piscis vel anguillae, aqua rosarum,
 foeniculi, chelidonii et saccharo cando paratum
 palmam reliquis praeripiunt; operationem vero in-
 utilem iudicat. Sic et compressionem in staphylo- p. 114.
 mate dissuadet, cum ea haud raro totus oculus per-
 ditus sit; operationem vero CELSI commendat;
 quae tamen, si tumor lata gaudet basi, nulla est.
 In exemplo quodam, vbi staphyloma ex ulcere or-
 tum erat, aquam viridem et lapidem infernalem
 salutare habuit. Paracenthesin in hydrophthal- p. 143.
 mia tum demum instituendam esse, cum dolor ve-
 hementia sua excedat, reliquaue medicamina fru-
 stra adhibita sint; noxiam vero, operatione abso-
 luta, compressionem saepissime inuentam fuisse as-
 ferit. Vueam, interdum ad laminam internam cor- p. 270.
 neae accrescentem, a Cl. DEMOURS primum de-
 scribi asserit: hinc et eius consilio plaudit, qui ocu-
 los radiis lucis varie mutatis, h. e. nunc luce, nunc
 tenebris conspicuis, exponi suadet, vt inde vueae
 partes ex situ suo quoque varie mutantur, recteque
 rursus componantur. Hoc consilium et tum va- p. 177.
 lere, si, vulnerata cornea, vuea in vulnus intraue-
 rit; vueam enim, per fortiores radios lucis motam,
 saepissime ex vulnere retrahi, experientia probat.
 Nec ophthalmiis male consuli, si radii lucis in ocu-
 los inflammatos interdum intrarent: oculo enim
 eiusmodi nimis diu omni lumine priuato, pupillam
 omnem sese contrahendi vim amittere, et nimis
 dilatatam manere solere credit. Imagines, oculis p. 210.
 obuersantes, quas fixas et fluctuantes defendit, ex
 maculis opacis, in cornea, capsulae lentis crystallinae,
 vel membrana hyaloidea, sitis, vel in humore aquo-
 so innatante, vel tandem ex lacrymis alienatis deri-
 vat. Cum in gutta serena pupilla aegroti oculi dila- p. 223.
 tata et immobilis maneat, si altera oculi sani contra-
 hitur,

- hitur, etiam vitium externum, quod plurimi aucto-
p. 229. res negant, locum habere monet ; sed nec pupil-
 lam in gutta serena semper praeternaturali modo
 dilatari, interdum insigniter contrahi cum dolore
 premente in osse frontis et radice nasi obseruatum
 est. Exemplum adiicit Cl. Auctor pueri, gutta serena
 post febrem miliarem adfecti, solis emeticis et pur-
 gantibus, saepius repetitis, sanati.
- p. 256.** Cataractae Cl. Auctor varias species, variique
 coloris adfert, quarum et nonnullas haereditarias
 obseruauit. Matura ea tum cognoscitur, si lens
 crystallina tota obscura est, h. e. obscuritas in omni-
 bus eius punctis aequalis, adeo, vt pupilla vel pror-
 sus alba, vel alio colore praedita conspiciatur, nec
 vllum ab aegro obiectum possit discerni, cum ipsis
 non nisi vmbrae appareant. Si malum venereum
 in caussa est, frictiones mercuriales commendat.
- p. 272.** Sic iuueni Auctor, cui dimidia pars lentis crystalli-
 nae post varios morbos venereos obscurata erat, vt
 obiecta ad dimidiam tantum partem conspiceret,
 per frictiones mercuriales bonum restituit visum.
 Cum extractionem depressioni praeferat, duas ad-
 dit conditiones, vbi haec illa tutior Nostro videtur:
 in cataracta complicata h. e. si inflammatio conti-
 nua vel periodica aegrum vexant ; vel si palpebra
 inferior inuersa sit, ne pupilla a palpebris iuste pos-
 sit tegi ; monet vero, in depressione, motus et mu-
 tationes acus in oculo semper esse debere concen-
 tricos, h. e. proportionatos figurae oculi eius, qui
 operationem instituit. Cl. FERREIN methodum,
 etsi aliorum perlustret, non refert ; ipse vero, si cus-
 pidem acus in lente crystallina firmauerit, acum
 cum duobus digitis versus os temporum imprimit.
 Exemplum adiungit, vbi lens inter operationem in
 cameram anteriorem prolaberetur ; quae tamen
 non diu post, per pupillam regrediens, ad fundum
 came-

cameræ posterioris tenderet, vt ita aegro visus re-
stitueretur. In extractione chirurgum attendere p. 288.
iubet, ne humor vitreus, qui difficilius tardiusue
restituatur, copiosius effluat: inde aegrum, quo id
euitetur, inter operationem supine iacere oportet.
Methodum Cl. DAVIEL, cuius instrumentis, ex-
cepto forcipe, simul vtitur, aliis, quas nonnullas
communicat, praefert; ab ipso tamen in eo dis-
sentit, cum operationem in ipsis initiis cataractæ
institui debere neget.

Protuberantiam lentis Noster ex humore cry- p. 314.
stallino, a blanda sua et naturali indole ita rece-
dente, vt volumen eius inde augeatur, pelluciditas
et figura recta perdantur, et lens ipsa iusto solidior
fiat, deriuat. In femina Noster eiusmodi protube- p. 316.
rantiam vidit, quæ et iridem et vtramque camê-
ram occuparet, quid? quod ad corneam vsque fere
accederet, vt ergo plenaria adesset coecitas; cum
vero hoc malum non nisi extractione possit tolli,
iure monet, lentem antea debere extrahi, quam ad
eiusmodi insignem magnitudinem increuerit. Ex
obseruatione adiecta quoque patet, posse oriri hoc
malum ex humore crySTALLINO et vitreo ossificatis,
quam offescentiam etiam membranae ostendunt. Lens p. 320.
porro ex sede sua vi propellitur, vt 1) in capsula
sua versus latera tantum prematur, 2) versus pupil-
lam procedat, 3) pupillae proxima sit 4) in camera
ipsa tandem anteriore propulsa sedem figat, vbi iri-
dem inter et corneam subsistat, cuius exemplum
Noster obseruauit. Lentem in eiusmodi statu vt-
plurimum mox pelluciditatem suam amittere; in-
terdum vero diutius eam seruare solere; Pupillam
semper simul insigni modo dilatari, vt visus inde
obscurior nascatur. Priores species per se ut plu- p. 325.
rimum curantur; vltima vero operationem requi-
rit. Iuuenis lentem per frictionem oculi ex situ
suo

fuo mouit, vt obiecta inde obscure et imperfecte
discerneret; postero vero die lens sponte sedem
p. 327. suam repetiit, et visus recte restitutus est. Absces-
sus lentis ex congestione puris, vel in eius substan-
tia, vel in superficiei tantum declarat Auctor. Auxilia,
quibus myopes presbyopesque iuuantur, plenius
p. 348. recenset. Nonagenarius, iam diu presbyops, post
p. 404. grauem morbum recte restituebatur. Oculus in-
terdum carcinomatica labe afficitur, in quo sola
exstirpatio locum habet: facilius redditur, si humo-
res effundantur, antequam oculus excindatur.
Reliqua omittimus.

X.

D. BALTHAS. LUDOVIC. TRALLES ad
Ill. viri CHRISTIANI GOTTLIEB LUD-
WIGII disquisitionem de vi opii cardiaca,
aduersariis medico practicis *) insertam, hu-
manissima responsio. Vratislaviae sumptibus
Io. Ernest. Meyeri. 1771. 4. pagg. 67.

p. 8. **V**elit Cl. Auctor probe pensitetur, se, dum
opii vim cardiacam vrget, loqui de prima
actione eius in circulum vitalem, neque sollicitum
esse de iis, quae deinde hanc primam et immedia-
tam actionem, tandem expirantem, et absolutam, et
finitam sequantur. Atque ita largitur Noster lu-
benter, sumto opio, languere posse et solere circu-
lum, postquam antea ille auctus fuerit. Id quod
ex torpore et stupore post vsum opii relictis et ex
aliis, quae sequuntur illius vsum, et a Nostro com-
memorantur, symptomatibus luculenter patet.
Quapropter opium Noster nec analepticum, nec robo-

*) Quae Lipsiae prodierunt Vol. I. Parte II. p. 504.
it. comm. nostr. Vol. XVII. p. 506.

roborans, nec excitans medicamentum iudicat, sed cardiacum h. e. quod in cor agit.

His haëtenus disputatis, respondet Noster ad **p. 11.**
 Cl. LUDWIG dubitationes, de cardiaca opii virtute enatas, atque contra WHYTT, VAN SWIETEN et VINTERL vim circuitum sanguinis excitandi et celeriore reddendi i. e. exaestuante vim opii cum Cl. YOUNG defendit. Cl. YOUNG enim in semetipso vim opii exaestuante expertus est. Quapropter opio vis acris et calefaciens et sapor amarus adscribitur. Atque ita non multum dissentire Cl. TRALLES a Cl. LUDWIG vidimus.

Id quod etiam apparet ex canone practico, **p. 28.**
 quem stabiliuit Cl. TRALLES, illoque, quem dedit Cl. LUDWIG, et quem plane similem iudicamus. Praeterea enim in opio exhibendo Cl. LUDWIG respiciendum esse putat ad primas vias, quae liberae esse debent pariter, ac via sanguinis, *). Atque eo redit quoque Ill. TRALLESII sententia, quam complectitur ita: „dum opium prima sua et immediata actione in cor et arterias sanguinemque inibi contentum, est cardiacum, atque circulum accelerat, calorem auget, sanguinemque rarefacit; abstinentum erit sollicite ab opiatibus omnibus, ubi a circulo aucto et accelerato atque humorum incallescencia et raritate, mala qualiacunque corpus adflixerint ac vitae metuendum est., Igitur omnibus febribus omnino acutis et inflammatoriis, opium non conducit.

Omni dolori, cum plethora, orgasmo et febre **p. 36.**
 coniuncto, opium obest. Semper enim tum dolores exacerbantur opio, ut in cephalalgis plethoricis
 quas,

*) v. aduers. med. pract. Vol. I, p. 514, comm. nostr., Vol. XVII, p. 507.

quas, adhibito opio, sopor, imo apoplectici non raro sequuntur insultus. Pari modo non conuenit pleuritidi opium.

p. 42. Actis antea omnibus agendis, febreque lenita, et dolore tamen continuante et a sola fibrarum intestinalium strictione atque conuulsione earumque sensibilitate et irritabilitate pendente, opium ad sopiendos intestinorum dolores vehementiores adhiberi potest. Primis enim viis non depurgatis, nocet opium, dum excretionem aluinam sua dote sistit.

p. 44. Inflammatio et alui obstructio videntur quidem opii usum vetare in voluulo et iliacis; inflammationi tamen et alui obstructioni si remediis occurratur, opioque vel praemittantur vel cum eo coniungantur, posse opium et in his iustum locum habere Ill. TRALLEs arbitratur. Qua occasione de laxantium cum opio coniunctione disputat, insimulque opii usum ad incarceratam herniam, quae saepe est causa ilei morbi, facilius reponendam utilem iudicat et strictiones spasticas ventriculique et intestinorum conuulsuos motus consopiendo, praemissa, uti et praecipit b. SWIETEN, venaesctione.

p. 51. Vix vnquam alibi magis probare opium Nostro videtur dotes anodynas, quam in doloribus sub partu spuriis, ore vterino spastice constricto. Pariter in doloribus post partum, tollendis, qui plerumque a grumis sanguinis aut portionibus placentae retentis pendent.

p. 53. Progreditur Noster ad dolores rheumaticos, arthriticos et podagricos. Nil vero ad hos omnes valet opium, nec in iis a Nostro propinatum est aegris. Commemorat autem exemplum, a HAHNIO notatum, ubi opium podagrigo non solum nihil nocuit, sed et eum iuuuit. Erat autem ille caco-chymicus et cachecticus magis, quam plethoricus laxaque potius, quam strictiore fibra laborabat.

De

De excretionibus, opio moderandis, haec habet P. 57.
 Noster. Si dolor quis cum haemorrhagia adest, ob stimulum, vasa laceffentem et irritantem, aut spasmos remotiorum partium, sanguinem ad partem affectam propellentes, opio locus esse potest, non aliter. In haemoptysi potest illud prodesse ad tussim vehementiorem leniendam, si caetera remedia non iuuant. In vomitu et mictu cruento ex renum vitio nulla est opii indicatio. Quod si vero vesica potissimum afficiatur doloribus, causa indagata et oppugnata, minuuntur hi dolores opio. In haemorrhoidum nimio fluxu prodest opium tum, cum colici dolores concurrunt, eumque nimis augent. Haemorrhagiis vteri iis conducit opium, quae pendent ab irritamento in vtero, cum omnium expulsionem promoueat, vti supra iam monitum est a Nostro apud puerperas.

In diarrhoeis et dysenteriis opii usum breuiter P. 65. demum expendit, illudque ad sopiendos quidem dolores, purgantibus praemissis, locum habere posse putat, suadet tamen, opio adhibito, denuo purgare has vias, illudque circumspiciente in his morbis adhiberi, vti et Cl. ZIMMERMANN *) pariter commendat.

*) vid. comm. nostr. Vol. XV. p. 609.

XI.

CAROLI STRACK M. D. et in vniuersitate Moguntina institut. med. Prof. Publ. Ordin. Eminent. Celsac Princ. Elect. Mog. consil. iud. aulica Elector. vtil. scient. Academ. Erford. et Princ. Hassiens. Societ. Academ. Giefens. focii observationes medicinales de colica pictonum maximeque ob arthritidem. Francof. et Lips. 1772. 8. pagg. 80. cum dedicatione et praefatione.

Observationes has de colica pictonum inseruit olim Cl. STRACK diario medico Parisiensi *), iam eas accuratius collectas, et multis curationum exemplis auctas, proponit hic latino sermone. Dubiam potissimum istius morbi in causam, de qua multum disputarunt auctores, inquit, de eaque aliquid certius an statui queat, tentat Cl. Auctor.

P. 12. Quot causae colicae pictonum numerentur, in primo capite tractatur a Nostro. Alii in plumbo atque cerussa, alii in lithargyrio, stanno, cupro, antimonio crudo: rursus alii in diuersis pigmentis, nec non in pomis, pyris, vuis, non satis maturis quaesuerunt. Quapropter et variis nominibus hunc morbum insigniuerunt, nimirum pictonum, deauratorum, figulorum. Item alii morbum pictonum vegetabilem nominarunt. Germanis hic morbus *Huettenkatze* audit, quoniam metallurgis adeo est familiaris. TRONCHIN octo diuersas morbi pictonum numerat species. IOANNES GRASHUIS arbitratur omnia quaecunque in hoc morbo pro causa haberi posse, quae interiorum intestinorum tunicam mucosam suo

*) Journal de médecine de Paris l' an. 1765. mois d' avril p. 325. et l' an. 1766. mois de fevrier p. 125.



suo orbent; CITESIUS a gente hoc nomen pictonum deriuat. Alii istius morbi rationem plane incognitam pronuntiant.

CL. STRACK autem multorum aegrorum, hac P. 13. colica pictonum laborantium, cum haberet curam, qui non solum has a nobis supra commemoratas causas non admisissent, sed etiam vino puro et optimo vterentur, quorum porro suppellex culinaria diligentius ordinata, nec non a vasis suspectis vacua esset, ad aliam causam, praeter iamiam diuturnas, respiciendum putauit. Atque cognouit CL. STRACK nullam aliam causam huic colicae pictonum inferuire, quam materiam arthriticam vagam, in infimum ventrem delatam: ad quam solam etiam non frustra direxit totam curationem, cuius tanta apud Auctores est diuersitas, quanta causarum variarum multitudo.

Felicem vero suae curationis successum, cum P. 14. arthriticae materiae, vt causae huius morbi, obuiam eat remediis, nunc probat exemplis in capite secundo. Quorum octodecim in hoc capite a Nostro sunt collecta, ex quibus patet, curationis infimul ratione habita, materiam arthriticam, in infimum ventrem conuersam, hanc colicam effecisse. Decoctum enim lignorum, antimonium crudum, balneaque calida et tepida indicationi causali curatoriaeque semper in his exemplis satisfecerunt. Balnea saepe et diu autem erant vsurpanda, inprimis Noster suavit Wisbadenses aquas thermales. Item ad praecauendum morbi reditum balnea commendat. Expertus enim Noster est facilem huius colicae pictonum reditum, eumque tanto certiore, quanto breuius balnea fuerint in auxilium ab his aegris vocata. Quapropter ducentis et ultra eiusmodi aeger vsus est balneis.

P. 40. Inter hos rursus aegros, a Nostro obseruatos, permulti sunt, qui partim ab aliis medicis, partim a semetipso aliis atque aliis tentati fuerint diu et frustra medicamentis; electa autem Nostri methodo medendi, non multum ante commemorata, res aegrorum in melius vergere coeperunt. Id quod probat et illustrat sequens exemplum.

P. 41. Vir labe abdominali laborare Nostro videbatur indeque penitus emaciatus afferebat abdomen contractum, in quo Noster longam scirrhorum seriem tangebatur, qui, iuxta anum orti, retro vesicam vrinariam progredierentur, ad intestini coli curuaturam sigmoideam vsque, mesorectoque inhaererent. Ipsum autem colon conuulsum erat. Direxit itaque, rebus aegri sic sese habentibus, ad scirrhos curationem Cl. STRACK, per tres licet menses, frustra tamen.

P. 42. Interea autem animaduertit abdomen a doloribus magis tendi; his e contrario cessantibus, tensionem remitti. Obseruauit enim intestinum colon, dolore vexatum, planum, durum, crassum, emicans: quo sedato, molle et sano simillimum idem intestinum fuit. Concludebat idcirco, vitii causam consistere in quapiam re, quae iret rediretque, et, ob colorem cinereum faciei, antequam dolor inceperit, luteum autem, dolore sedato, ob vrinam albam difficilemque eius missionem cum sedimento: rursus ob sudorem, qui cutem vrebatur atque pungebat, vti cineres ardentes, omninoque pruritum cum summa scalpendi necessitate, vt signa arthriticae materiae retrogressae, ab arthritide, in inum ventrem sese conuersa, hunc morbum deriuauit. Colicae enim arthriticae signum proprium insuper quoque hic aderat, quod ita a Nostro describitur: *esse medio in tormento abdominales musculos adeo sensibiles contractosque, vt aeger corpus excitare nequirit,*

- curtis

curtis quasi nimium ipsis cornibus ; sed debuisse eum idem incurvum et inclinato capite primum tenere. Quod proprium arthriticae colicae signum esse puto.

Interrupit itaque Noster curationem scirrhi cum P. 44.
eicuta, atque methodum supra memoratam contra arthritidem cum felicissimo euentu et in hoc aegro adhibuit.

Tum perquiruntur diuersae auctorum sententiae in capite tertio. Ex obseruationibus nimirum Cl. Auctoris eae causae, quae supra a nobis iam commemoratae sunt, considerantur atque ex iis monstratur, has causas posse interdum colicam efficere, nunquam autem colicae pictonum inferre. Refutatis itaque auctoribus, qui colicam pictonum, saturninam appellant, asserit Noster cum Cl. MUSGRAVE colicam hanc pictonum arthriticam esse, atque antimonium crudum, quod Cl. TRONCHIN, inter causas huius colicae refert, esse optimum contra colicam pictonum remedium. p. 57.

Porro docetur in capite quarto, per quas notas colica pictonum arthritica distinguatur. Hae autem notae in tam cognitu difficili arthritidis omnino cognitione vel *magnae* sunt et ab vnoquoque facile cognoscuntur : vel *paruae*, quae morbum pro alio quopiam affectu ostendunt, arthritidemque simulant. Vt sunt dolor vagus aliarum atque aliarum partium externarum atque internarum, vbi in abdomen arthritica materia saepe sese confert, facileque ab vnoquoque cognoscitur. p. 68.

At vbi dolor ab initio ventrem occupat fixus, p. 69.
difficilius est scitu, num colica a materia arthritica sit, an ab alia quadam causa pendeat? Distinguitur autem maxime per has notas: si cum istius colicae causa verosimilis nulla alia recte comparari potest, si

dolor vehemens adest, sine febre et inflammatione, cum pulsu paruo et lento. Si cutis color flauus oliueusque, oculi caui, limbo plumbeo cincti, sunt. Si dolores articulares aeger sensit, seu citam et magnam membrorum lassitudinem atque defatigationem, post labores exiguos cum asthma. Si debilitas, somno finito, maior est, quam ante eum. Si sudor cutim vrit, eaque papulis miliaribus rubris referta est. Si in faciei atque potissimum frontis cute titillatio erronea, vbi aeger, admota manu, nihil sentit. Vrina tenuis cum stranguria vrens, seu subalbicans, veluti serum lactis cum sedimento albo, laeue, pingue, mittitur. Haec Nostro signa videntur, quae arthriticam causam huius colicae prodant.

p. 71. Denique de diuerso materiae arthriticae exitu differitur in capite quinto. Egreditur autem haec materia per sudorem, per vrinam et per abscessum, rarissime per alui fluxum. Interdum per sudorem et vrinam alternatim, quibus interueniunt abscessus. Has singulas crises itaque Noster hic pertractat.

p. 73. Bonum signum iudicat Cl. STRACK, intensos dolores iuxta quintum et decimum balneum. Morbi enim materia tum mouetur, atque febris accedit. Magna porro inter sudorem et vrinam est similitudo, cum quoad humores, tum quoad crisin. Vt enim pulsus alter a magno ictu incipit et per minores exit, ita alter a paruo in magnos ictus transit. Aegre per aluum arthritica materia quaerit exitum. Quod si vero fit, alui fluxus non est stercoreus, sed aqueus, singulare et inconsueto foetore coniunctus. Id quod Noster semel expertus est.

p. 78. Singulare prorsus est arthritidi vagae miasma, atque ab omni alio morbo diuersum, nec non hunc mor-

morbum esse epidemicum facileque reuerti posse putat. Non conuenit, etiamsi videatur, cum podagra. Podagricorum enim nodi si exulcerantur, albam calcaream, inodoramque materiam, arthriticorum e contrario, quibus et inde suadet vesicatoria, vlcera nigram, et vt putridum oui vitellum olentem materiam emittunt, quae emplastra et lintea carpta tingit, absque tamen ossium carie. Fonticulus, quem Noster excitari iussit in aegra arthritica, similem materiam nigram atque foetentem alliciebat.

XII.

Noui commentarii Academiae scientiarum Imperialis Petropolitanae. Tom. XIII. pro anno 1768. Petropoli, typis Academiae scientiarum 1769. 4. mai. 3 alph. 8. pl. tab. aen. 14.

Quamquam in vniuersum pauciores commentarii ex actis Petropolitanis ad institutum nostrum pertinent, cum mathematica et astronomica prae physicis copiosiora sint: tamen his ipsis nouissimis annis Cl. PALIAS, GMELIN cet. laboribus et itineribus id effectum est, vt plures nunc ad historiam naturalem spectantes obseruationes hisce commentariis inferantur.

Ex classe physico-mathematica duo tantum commentarii nominandi nobis sunt, scilicet Cl. L. EULERI dissertatio de aequilibrio et motu corporum, flexuris elasticis iunctorum et EIUDEM commentarius de statu aequilibrui fluidorum, cuius sectio tantum p. 305. prima hic traditur.

In classe autem physica sequentes commentarii p. 419. continentur ;

p. 419. 1) Cl. I. A. BRAUN *de calore animalium*. Pleraque animalia, si non omnia, calorem quendam habent addititium, quem quoque vitalem, insitum et innatum vocare solent. Hic tamen calor non in omnibus animalibus vnus idemque est, sed insigniter in variis animalibus differt. Id tamen praecipue in eo omni attentione dignum est, quod in animali sano, idem caloris gradus diuerso tempore et loco constans sit. In aegrotante vero corpore et in statu praeternaturali vel, vt in lipothymia fieri solet, fere euanescit, vel, vt in febre ardente, multum augetur. Haec aliaque, quae huc spectant, egregie experimentis hic additis Cel. BRAUNIVS comprobauit. Vfus vero est ad caloris gradum explorandum thermometro Delisliano in quibus 0, siue ziphra, calorem bullientis aquae et numerus - 150 punctum congelationis aquae indicat. In exploratione ipsa variae cautiones adhibendae sunt, quae Cl. Auctor fusius hic describit. Huc pertinet, vt sufficiens adhibeatur tempus, cum alias minor caloris gradus obseruetur, vt oculus obseruatoris nec supra, nec infra punctum thermometri constitutus sit cet.

p. 422. Iam quod gradum caloris in homine sano attinet, experimenta, quibus eum determinare constituit Cel. Auctor, ita instituit, vt thermometrum in os sani hominis infereret, ibidemque tam diu detineret, donec hydrargyrum in thermometro non amplius adscenderet. Mercurius vero circa numerum 96 et 95 scalae Delislianae stetit, qui cum numero 98 et $97\frac{1}{2}$ scalae Fahrenheitianae conuenit, et ita gradum caloris sani hominis, a FAHRENHEITIO determinatum, paullulum superat. Cum vero alii (vt BOERHAAVIUS, DE HAEN cet. vid. HALLER *Elem. Phys.* T. II. p. 35) gradum minorem repe-

repererint, patet illos non sufficiens in experimentis suis habuisse tempus. Urinae calor cum caloris gradu indicato conuenit, vel eum vno aut $1\frac{1}{2}$ gradu superat, qui gradus sine dubio gradus caloris viscerum adiacentium est. Experimentis vero suis constantem hunc calorem reperit Cl. Auctor adeo, vt nec aetas, nec sexus, nec temperamentum, nec aliae circumstantiae eundem, posita sanitate hominis augere vel imminuere possent, sed fere semper (si vnum aut ad summum $1\frac{1}{2}$ gradum excipias) idem esset gradus. Gradus autem caloris corporis humani minimus est inter corpora animalia quadrupedia. Vituli enim calor 104 graduum thermometri Fahrenheitiani est, cum quo porcelli calor conuenit: capella calorem 101 $\frac{1}{2}$ scalae Fahrenheitianae habet, nec multum agni et ouis calor variat. Maximus caloris gradus, quem in animalibus quadrupedibus Auctor Cel. inuenit 104 graduum est. Aues vero calorem quadrupedum multum superant. In anserem enim est 107 $\frac{3}{4}$ scalae Fahrenheitianae: in auibus autem minoribus maior est, cum v. c. in rubecula ad 111 $\frac{1}{2}$ gradum adscendat, et igitur calorem humanum quindecim fere gradibus superet.

Quod vero animalia sic dicta frigida attinet, notandum est ea, per experimenta Auctoris Cel., omni additio calore carere, sed tantum calorem aquae aut aeris ambientis habere. Saepius hoc in piscibus, branchias agitantibus et pulmone carentibus, Auctor Cel. expertus est, qui omnes, in diuersas aquas diuersae temperiei immissi, eundem caloris gradum assumerunt, quem aqua illos ambiens habebat. Animalia vero marina, quae pulmones habent, additio calore instructa sunt. Ranae autem cum piscibus conueniunt, idemque de animalibus hyeme

p. 427.

sopitis valere, Auctor Cel. suspicatur, licet nulla circa illa experimenta instituerit. Insecta congregata quidem aliquem calorem efficere possunt, qui tamen ad calorem internum proprie referendus non est *). Gradum morbose caloris calorem naturalem in febribus multum superare et ad 105, 106, 107 et 108 gradum scalae Fahrenheitianae adscendere notum est. Monet tamen Cel. BRAUNIUS, pauca huius generis experimenta genuina esse, sed in plerisque non ad legem thermometri, sed ad sensum calorem determinatum fuisse.

P. 430. His praemissis ad quaestionem : num certi et determinati gradus caloris sint, quos tolerare homines et animalia ferre possint aut nequeant? ita respondet, vt doceat, eos in diuersis subiectis diuersos esse, cum homines maiorem vel minorem gradum caloris atmosphaerae, pro consuetudine, ferre et sustinere possint. Hic, vti per experimenta recentiorum patet **) calore sanguinis vitali multo maior est. Ita RICHMANNUS in tepidariis gradum 125 Fahrenheitianae scalae ferre potuit, idemque de se ipso Cl. Auctor asserit. Frigoris vero gradus, quem homines et animalia sustinere possunt, longe difficilius determinatur, vt itaque hic magnus campus nondum cultus supersit, vltioribus eruditorum experimentis excolendus. Quod vero ad originem huius caloris innati spectat, illum Cl. Auctor cum pluribus recentioribus ex motu sanguinis progressiuo et attritu huius fluidi heterogenei inde orto, deriuat.

2) Cl.

*) Conferantur haec experimenta cum iis, quae in T. II. Elem. phys. HALLERI p. 28. seq. ex variis scriptoribus collecta sunt.

**) vid. Cl. TILLET in Mem. de Paris 1764 p. 166. comm. nostr. Vol. XVII. p. 256. HALLER. Elem. T. II. p. 34.

2) Cl. P. S. PALLAS *observationes de ossibus* p. 436.
Sibiriae fossilibus, craniis praesertim rhinocerotum atque
buffalorum. Quamquam posterioribus maxime secu-
lis pluribus in regionibus borealibus elephantum
effossa sint sceleta, in nulla tamen tanta eiusdem
eboris copia reperitur, ac in Siberia, ita vt inter
merces indigenas eiusdem regionis vulgo referatur.
Neminem vero fugit, mire inter se variare erudito-
rum de origine eboris huius fossilis sententias *);
quorum tamen liti Cl. Auctor se non immiscet, sed
ex speciminibus, in Museo Petropolitano ser-
vatis, probat, non elephantos tantum, sed et alia quo-
que calidiorum regionum fera animalia in Siberia
olim habitasse. Describit vero primum varia inte-
gra rhinocerotum crania, et cornua, et hac occa-
sione, cum sceleton rhinocerotis a nullo auctore de-
scriptum sit, de cranii fabrica in hoc animali varia
monet, quae singularis plane est et in multis a stru-
ctura craniorum in aliis animalibus differt. Distin-
ctionem rhinocerotum in vnicornes et bicornes va-
nam esse, cum specie non differant, monet. Den-
tes primores nullos hoc animal habere, licet vulgo
eiusmodi dentes a molaribus remotos, et in vtraque
maxilla solitarios, ei LINNAEUS aliique tribuant; con-
venire potius rhinocerotem dentium conformatione
cum bradypode aut dasypode. Iis vero, quae Cel.
Auctor de fabrica cornuum rhinocerotum filamen-
tosa in vniuersum monet, omittis, ad alterius cuius-
dam animalis reliquias, in Siberia repertas, accedi-
mus, quae idem hic egregie describit. Sunt illae
crania buffalorum gigantea, quae magnitudine
omnium buffalorum et vrorum, hodie cognitorum,
crania longissime superant, cum longitudo eorum
25 pollices aequet. Tandem etiam cornu gazel-
lae *recticornis* (*capra gazella* LINN. *le pasan* BUFFO-

N II

*) vid. Cl. RASPE dissert. sup. p. 647.

NII) in Siberia detectum hic accurate describitur, et de locis in quibus ebur fossile reperiatur, nec non de fabrica dentium elephantinorum in vniuersum varia egregia monentur, tandemque ex sceletorum diuersitate aliisque argumentis probatur, clima Sibiriae olim longe mitius fuisse et animalia omnia, quorum exuuiae hic describantur, quae in calidiore India nunc tantum reperiuntur, in Siberia olim habitasse et se multiplicasse.

- p. 478. 3) Cl. C. F. WOLFF *observationes de formatione intestinorum, in ouis incubatis institutae. Pars tertia, in qua phaenomena amnii spurii interna describuntur, et simul de formatione mesenterii, thoracis, abdominis alarum, pedumque agitur.* De prima et secunda harum observationum parte, quae in duodecimo commentariorum Academiae volumine continentur, vt et de theoria, quam Cl. WOLFF suis experimentis confirmare tentat, iam alio loco *) ad Lectores retulimus. In tertia itaque experimentorum sectione partium embryonis gallinacei, in prioribus dissertationibus secundum externum habitum consideratarum, phaenomena interna, anatomiae microscopicae ope explicata Cel. Auctor, enarrat. Describit vero primum partes in titulo huius commentarii indicatas, quales eae die quarto incubationis apparent, et ex his abdomen, thoracem, peluim, intestina cet. non praeformata esse et deli-
- p. 518. neata, sed successiue generari asserit. Cum enim ex eius obseruatione variae corporis partes, veluti thorax certo tempore nondum existant, neque eo tempore existere possint, cum v. c. eodem loco, quo thorax oriri debet, amnium verum oriatur, quo in fetu totus truncus antequam perficitur, partes has suc-

*) vid. Nou. comm. Acad. Scient. Petropol. Vol. XII. p. 403. Comm. nostr. Vol. XVII. p. 703. seq.

ſucceſſiue productas eſſe ſequitur. Subtiliorem deſcriptionem, quae a Lectoribus ſine iconibus vix intelligi poteſt, omittimus.

4) *Deſcriptio leporis puſilli.* Auſtore Cl. P. S. p. 531.
 PALLAS. Deſcribit Cl. Auſtor hic animalculum, quod in campis Tranſuolgenſibus in itinere, per Ruſſici imperii prouincias Aſiaticas factò, reperit. Forma et magnitudine illud externa ad murinum genus accedit, pedum vero planta hirsuta, digitorum numerus, quinarium in palmis, et quaternarium in plantis, velleris color cet. et dentes superiores duplicati oſtendunt, illud leporino inferendum eſſe. Apertos campos (*Steppen*) colit, ibique in cuniculis ſub terra latet, ex quibus nocturno tempore potiſſimum exit. A Tartaris *Sulgan* vocatur, aeſtate variis herbis ſucculentis paſcitur, hyeme vero excrementis maiorum animalium phytivororum, equorum et ouium victitat. In craſſo inteſtino aſcarides Cel. Auſtor reperit, quae cum iis forma conueniunt, quae in homine cet. occurrunt.

XIII.

IOANNIS FRIDERICI MECKEL noua experimenta et obſeruationes de finibus venarum ac vaſorum lymphaticorum in ductus viſceraque excretoria corporis humani eiſdemque ſtructuræ vtilitate. Berolini apud Frideric. Nicolai. 1772. 8. pl. 7.

Qui iam alio tempore vaſorum lymphaticorum naturam egregie dilucidauerat Cl. Auſtor *) indefeſſus corporis humani ſcrutator, pergit nunc in eorum progreſſu enucleando, et nouo vtiliſſimoque,

*) v. comm. noſtr. Vol. VII. p. 336.

que, obscurorum vasorum iter persequutus, invento scientiam anatomicam adauget. Quinque autem sectionibus lymphae ad sanguinem reditum per vasa resorbentia et lymphatica, cum venis communicantia, nec ex tela cellulosa orientia, demonstrat: et de his, quae ad vniuersum resorptionis genus spectant, primo loco: deinde de ea in mammis, vesiculis seminalibus, hepate et vesica urinaria facta, agit.

Viam ex vasis lymphaticis ad venam cauam iam aliunde cognouerat Noster, nunc eam ex glandulis conglobatis ad truncos venarum per eadem vascula lymphatica illo detexit experimento, quo glandulam lumbarem per ductum lymphaticum mercurio replebat, ex qua vena, ad truncum venae cauae exportecta, tandem pressione mercurii adaperta fuit. Erat autem haec glandula semiscirrhusa. Quo ipso simul intellexit, vasa haec lymphatica inter se et cum minimis venis glandulae immediate committi, quae sane connexio, nondum cognita, in multiplicem a naturae auctore nostri corporis usum facta sit. Glandulae namque lymphaticae, ex innumeris tortuosis lymphaticis ductibus constructae, hanc venarum anastomosis habent, ut lympham depurentur, atque ab heterogeneis et aquosis, siquidem ea gelatinosa esse debet, moleculis liberetur; in morbis vero variis, praecipue in senio, praeter impedimenta, lymphae opposita, crepatura vasorum lymphaticorum et ineuitabilis incurabilisque hydrops praecaueatur: qua ratione vero idem in glandularum obstructione, in truncorum lymphaticorum compressione et obstructione eorum eueniat, docet atque medicamentorum efficacium actionem inde erudite deducit.

p. 24. Mammarum structura, ab aliis studiosissime descripta; Nostro tamen per instituta tentamina noua aliqua

aliqua detegenda reliquit. Fecit autem experimenta, in defunctis puerpera et grauida, mamma quidem tum in situ relicta, tum ex nexu soluta, viditque per papillae tubulos immissum hydrargyrum partim ad venas celerrime transisse, in venam axillarem vsque, partim in vasa lymphatica receptum ad glandulas axillares peruenisse. Immo inopinato euentu lactiferos tubulos in papilla inter se communicare conspexit, nec propinquos tantum, quin etiam remotissimos, ita, vt, dum quinque tantum tubulos repleuisset, quindecim tandem plenos turgidosque obseruaret. Nuckianum tamen circulum, nunquam adsumendum, se inuenisse negat, horum etiam lactiferorum tubulorum anastomosis in minoribus eorum ramis fieri asserit, et hinc euenire, vt lac crudum per venas refluat, acris etiam lymphæ, vt in cancro, facilius per totam glandulam diffundatur. Porro ex his intelligitur, immediatum esse nexum cum vasis lymphaticis tubulorum lactiferorum, nec hæc solum ex tela cellulosa enasci: itemque de venis valere, quæ et cum arteriis, et cum his tubis galactophoris, et cum tela cellulosa communicare conspiciuntur; de arteriarum autem anastomosi dubiam esse sententiam iudicat. Cognitio autem hæc varias demonstrat structuræ utilitates, inter quas est, lac ex arteriis fecerni, nondum perfectum, sed heterogeneousum, cui lymphatica vasa nimiam tenuitatem resorptione sua demant, nimis crassas vero et terrestres, salinasque moleculas venæ absumant, et dulce liquidum blandumque lactis reddant. Quæ animaduersiones ad lactis et nutritis qualitates diiudicandas, quatenus pertineant, docetur, et hinc, iuniores nutrices ætate prouectioribus antepponendas esse, recte iudicatur. Deinde in cognoscendis et medendis morbis inde egregia desumuntur argumenta, ne lactis regressui forte adscri-

- adscribantur morbi, quorum ratio in peruersa sanguinis mixtione haeret, vt potius reditus liberior lactis per adaptata remedia promoueatur. Siquidem febres etiam variae in puerperis ab aliis longe, ac lacte, caussis enascantur, vt defectus lactis morbi effectus potius, quam caussa existat, illudque febre superata feliciter redeat, resorpta vero materia putrida, ex vtero novos morbos generet. Structura etiam mammae declarat, quare obstructions per hydrargyrum cum camphora resoluantur optime,
- p. 68. etiam illae, quae pene scirrhum fecerant. A cicuta parum spei et emolumenti Nostro euenit. Si autem resolutio non fit, nullum, nisi in tempestiua et ante canceri accessum facta extirpatione, auxilium est.
- p. 71. Semen ex vesiculis feminalibus iterum sanguini reaffundi, communis opinio est; viae, quae resorbent, non aequae patent. Huic tamen officio tantum venas praeesse, iniectio Cl. Auctori manifestavit, qua, immissa per ductum deferentem, cera non vesiculae solum replebantur, sed venae hypogastricae etiam et plexus venarum, ad vesiculas reperiundarum; nulla vero vasa lymphatica, quae tenerioribus partibus resorbendis inferuiant. Haec enim, copiose ad testiculum inuenienda, ex illo longa via ad plexus vasorum lymphaticorum lumbares deferuntur, quod, sicuti vehementer optamus, prope diem demonstrare promittit Noster. Simul autem inde patet, nec accumulationem, nec corruptionem huius liquidi in receptaculis metuendam esse.
- p. 82. Bilis deinde in hepate per resorptionem praeparatur. NUCKIUS iamiam, facta in ductum hepaticum iniectione, liquidum per vasa lymphatica facile redire vidit, et Cl. Auctor experimentis idem reperit, cui etiam contigit, vt ex ductu hepatico aditus in venam cauam pateret facile, nunquam in venam portarum aut arteriam hepaticam, multo minus

minus vnquam transitus in cellulofam telam fuc-
cessit. Quod pari ratione in mammis euenit, in
quibus, si cellulosa tela repleta esset, omnis ad vasa
lymphatica progressus protinus cessaret, itidemque
in vasis feminalibus, vt venas et vasa lymphatica
immediata connexione vti euidentissime appareret,
neque ex contextu celluloso demum ad lymphatica
vasa transitus esse perspiceretur. Quare nunc mu-
tat suam, de vasorum lymphaticorum origine, olim
susceptam sententiam Noster; immediatum potius
nexum venas inter et vasa lymphatica, secernendis
liquidis perficiendis, inferuire affirmans, in hepate
potissimum superfluam tenuemque aquam resor-
bendo; reliquam vero bilem accurate miscendo, si-
quidem in morbis etiam per easdem vias bilis ad
sanguinem redeat.

Notatu denique dignum est, ex vesica vrinaria, P. 99.
tum aerem immissum per vrethram, tum ipsam
aquam per venas exitum inuenisse: ficque in statu
etiam naturali non improbabiler aliquam tenuio-
ris fluidi particulam resorberi. Id quod exemplo
declarat ex iuvene, qui, paucio reddito lotio, sub
axillis continuo humorem, odore ac colore lotii
profudit, qualia exempla Nostro varia occurrerunt,
quibus confirmatur, ex vrina subtilissimum liqui-
dum resorberi.

XIV.

*Verzeichniss einer Sammlung von Bildnissen grösstentheils berühmter Aertzte, sowohl in Kupferstichen, schwartzer Kunst und Holzschnitten, als auch in einigen Handzeichnungen: diesem sind verschiedene Nachrichten und Anmerckungen vorgesetzt, die sowohl zur Geschichte der Arzeneyselahrtheit als vornehmlich zur Geschichte der Künste gehören von I. C. W. MOEHSEN, des Königlichen Preussischen Obercollegii medici und Obercollegii sanitatis, wie auch der Römisch Kayserlichen Academie der Naturforscher Mitglied etc. Mit Vignetten. Berlin, gedruckt bey Friedrich Willhelm Birnstiel, Königlicher privilegirter Buchdrucker 1771. 4. mai. Alph. 2. Bog. 14. *)*

i. e.

Index collectionis imaginum maximam partem celebrium medicorum, tam aeri vario modo incisarum, quam ligno, nec non in quibusdam delineationibus. Cui praemittuntur variae relationes et annotationes, historiam medicinae pariter ac potissimum artium attinentes, Auctore I. C. W. MOEHSEN.

CL. MOEHSEN, cuius indefessum historiae literariae studium nuper indicauimus **), iterum hoc opere ad historiam medicinae ac artium multum contulisse nemo negabit. Quapropter huius vtilissimi libri saltem summa indicanda non superfedere nos posse iudicauimus.

Prima

*) Prodiit idem liber quoque ibidem, eodem anno eademque forma, charta tamen et pretio minori apud bibliopolam Christian Freder. Hirnburg.

**) v. comm. nostr. Vol. XVI. p. 678.

Prima pars constat ex introductione, tractatione et explicatione paruarum tabularum aenearum huius operis, ab initio et fine nonnullarum sectionum insertarum. Altera pars sistit catalogum alphabeticum iconum, potissimum clarissimorum medicorum et eorum, qui artem medicam excoluerunt, atque additamenta ad primam partem: denique alphabeticus catalogus pictorum atque delineatorum, nec non chalcographorum, qui delineationes iconum aeri incisarum ipsi effecerunt.

In introductione primae partis necessitas, com- Pars L
moda atque varius usus eiusmodi collectionis imaginum declarantur a Cl. MOEHSSEN. Atque hac occasione de varietate tabularum aenearum, earumque raritate, ut Cl. LIEBERKUHNII effigies: porro minus noti medici, quem CORREGGIO pinxit, cet. et integritate, additis fontibus, e. g. de capite GALENI, HIPPOCRATIS, DIOSCORIDIS e. s. p. docte differitur. Denique de utilitate huius operis in doctorum virorum historia proponitur, et quis dubitabit de utilitate, cum Cl. MOEHSSEN plures, quam quingentos habeat, qui in KAESTNERO desint, et trecentos, quorum Cl. IOECHERUS non mentionem fecerit? Hi quoque asterisco a Nostro sunt distincti.

Iam progreditur Noster ad coniunctionem medicinae cum artibus, atque ad utilitatem, quam medicina artibus attulit, demonstrandam. Veteres amasse omnino magnopere artes, inprimis picturas, probatur a Nostro ex templis, quae multis picturis ornata erant. Templum enim AESCULAPII non solum a medicis, sed etiam ab artificibus, ut APELLE aliisque, multis picturis est donatum. Dum disquiritur, quatenus anatomia artificibus

p. 53.

scitu sit necessaria, de anatomica cognitione veterum medicorum et artificum agitur. Tempore GALENI, vti ipse dicit in suis anatomicis administrationibus, anatomia non multum colebatur a veteribus medicis, cum familiae AESCVLAPII hanc scientiam in suis templis occultarent, et clanculum tractarent, ad quam et HIPPOCRATES est referendus. Quaesitum igitur est, cur nullus HIPPOCRATES, nullus PHIDIAS et nullus APELLES inter recentiores inuenirentur; cum tamen recentiores plura commoda ad artes tractandas et scientias colendas haberent, quam veteres? Ac Noster putat, et nos in temporibus GALENI adhuc viuere ex hac parte.

p. 65. Tum disquiritur: num veteribus artificibus anatomica cognitio aequae necessaria scitu fuerit, quam recentioribus. Ac, si quis largiretur, graecos non adeo anatomiae esse gnaros, iis etiam haec scientia non adeo multum inferuire potuit, quam recentioribus. Spectabant enim quotidie naturam, corpora bene et secundum naturam formata, et in eorum incremento nulla arte impedita atque coacta, carnosa, et formosa. Capita Graecorum non variis linteaminibus atque fasciis, quas GALENUS apud Romanos vituperat, comprimebantur, sed libera et expedita naturalem magnitudinem et pulchritudinem nancisci poterant. Quapropter veterum capita a parte superiori pulchram et naturalem oualem prae se ferunt formam. Ac sic et reliqua vestimenta Graecorum et Romanorum incrementum naturale, flexilitatem, rotunditatem, plenitudinem, eminentiasque corporum nullo modo impediabant. Nam bene recteque nutriebantur. Accedebant dein balnea et corporum exercitia varia apud veteres, in arte gymnastica, quae non minus

minus corpus firmabant et stabiliebant, ac nuda corpora, quae veteres saepe in his exercitiis monstrare oportebat situm, vim, valorem et usum musculorum verum et naturalem, artificibus ante oculos ponebant. Inde et medicis athletarum diaeta et habitus ita erant regenda, ut fierent quidem corpora carnosa, minime tamen obesa. Porro veteres saepe numero poterant in animi commotiones varias inquirere, et iram, iracundiam, dolorem, timorem ceterasque ex vultu cognoscere.

Quapropter necessitas anatomicae cognitionis recentioribus a Nostro nunc monstratur, insimulque, quomodo DE LA TORRE primus sit, qui LEONHARDO DE VINCI, cuius picturae admodum rarae sunt, utilitatem anatomicae cognitionis in sua arte declaret, ostenditur. Anatomia enim pulchritudini et accuratioribus delineationibus magnopere infervit. MUNDINUS Professor Bononiensis, qui 1305 vixit, primus fuit, qui anatomiam coleret et in scriptis posteritati relinqueret. Latino quidem idiomate scripsit MUNDINUS; multae tamen arabicae denominationes, ut *mirach* abdomen, *siphac* peritoneum e. f. p. in eo inveniuntur. Quapropter et arbitratur Noster, non iure MAGNUM HUNDT 1501 professorem Lipsiensem primum anatomicum a nonnullis habitum esse. Possunt porro et recentiores, anatomica cognitione imbuti, veterum delineationes atque picturas diligentius atque accuratius diiudicare, indeque artem suam augere et ditare atque perfectiorem reddere. DE VINCI anatomicam cognitionem dein imitati sunt MICHAEL ANGELO BUONAROTTI et RAPHAEL, qui multum sibi in sua arte per anatomiam consuluerunt.

His praemissis, de meritis VESALII et TITIANI ob anatomiam artificum: item de operibus

VESALII accurate hic refertur a Nostro. Qui scire cupit, quale VESALIUS medicis, chirurgis et artificibus praestiterit auxilium, amandatur hic a nobis ad nostrum Auctorem, qui simul de operis VESALII variis editionibus, et de discrimine figurarum in editionibus 1543 et 1555, cuius et BOERHAAVE *) mentionem fecit, qui suadet, vtramque editionem possidentibus, secundae textum, et tabulas primae consulere, docte differit. Nos vero hoc vnicum solummodo, breuitatis studiosi, per instituti rationem, addimus, Cl. MOEHNSEN, qui vtramque editionem diligenter inter se contulerit, putare, secundam 1555 editam esse optimam, quae emendatiorem textum non solum, sed plures etiam minores tabulas in se contineat: ideoque eam, qui habeat, prima indubitato carere posse.

p. 91. Iam monstrat Noster necessitatem indicis optimorum operum anatomicorum, ab idoneis artificibus curatorum, atque incipit de tabulis anatomicis EUSTACHII, qui primus post VESALIUM fuit. Editae enim sunt hae tabulae 1552 anno, et, cum VESALII figurae ligno incisae fuissent, videtur EUSTACHIUS primus fuisse, qui aeri incidi anatomicas figuras curaret. Nec non has delineasse videtur ipse EUSTACHIUS, quoniam in fronte huius libri legitur: cum figuris aeneis ab ipso Auctore delineatis. Quis vero eas aeri inciderit, non constat.

p. 94. Sequitur nunc relatio de opere CASSERII et EDUARDI FIALETTI et tabulis myologicis IOANNIS BROWNE inde ortis. CASSERII tabulae idoneos et exercitatos artifices produnt. Delineauit enim eas FIALETTI, atque aeri incidit FRANCISCUS

*) v. Meth studiimed. Amstelaedam. 1751. T. I. p. 274

CISCUS VALLESIUS. Constituit autem CASSERIUS secum, theatrum anatomicum perfectum vulgare; quod autem, eo non multum post mortuo, impeditum est. Quapropter et destituti sumus descriptionibus illarum tabularum, et DANIEL BUCRETIUS illas edidit, deformes tamen redditas, ADRIANIQUE SPIGELII operi anatomico nexus. IOANNES BROWNE autem in myographia sua nova, triginta et septem tabulis, a CASSERIO triginta et duas assumpsit, easque 1684 Londini in folio minori vulgavit. CASSERII autem et BROWNE tabulae maxime inter se differunt.

Figurarum aenearum anatomicarum PETRI DE p. 99.
CORTONA haecenus incognitum Auctorem fuisse IOANNEM MARIAM CASTELLANUM, probatur. Tabulae anatomicae a celeberrimo pictore PETRO BERRETTINO Cartonensi, delineatae et egregie aeri incisae nunc primum prodibant, et a CAIETANO PETRIOLI Romano, Doctore Regis Sardiniae, Chirurgo publico, Anatomico et inter Arcades ERASISTRATO COO, notis illustratae Romae 1741. Ex typographia ANTONII DE RUBEIS etc. fol. mai. Hoc opus ita inscriptum partim artificii BERRETTINI adscribitur, partim IOANNI VESLINGIO, cet. Noster autem monstrat ex bibliotheca Romana PR. MANDOSII, CASTELLANUM, dum eius memoriam ibi tradit, huius operis auctorem fuisse, qui GREGORII XV. archia-ter erat, ipse de phlebotomia et arteriotomia scripsit, et librum cum figuris, forsan a LUCA CIAMBERLANO aeri incisis, publici iuris fecit. De CASTELLANA autem opere magno anatomico, quod praeterea ei debetur, et cuius et SEVERINUS de

Xx 4

de recondita abscessuum natura *) mentionem fecit dubitat Noster.

- p. 103. CARL CESIO anatomiam pictorum italice editio IOANNES DANIEL PKEISLER cum sedecim tabulis, minus accuratis, ideoque ad erudiendum non aptis. Duae sistunt ossa humana, quatuordecim carnes.
- p. 104. Iam progreditur Noster ad GODOFR. BIDLOO opus, cuius figuras GERARD LAIRESSE delineavit primus post CASSERIUM. AMANTI BOURDONII tabulas anatomicas octo praegrandes Noster non vidit, quae inter CASSERIUM et BIDLOO editae sunt. Porro de BIDLOO et LAIRESSE figuris aeneis per GUILIELMUM COWPERS, eiusque appendice nonnulla Noster addit. Artium autem cultoribus ex hoc opere non adeo magnam Noster spondit utilitatem.
- p. 111. Traditur hic a Nostro accurata relatio de opere CAROL. ERRARD et BERNARDIN GENGAE, cum hoc opus **) raro occurrat et nimis sumtuosum sit. Erudit multum artifices in anatomia; attamen VESALII figuras tamen iis, qui hoc opus possident, quoque necessarias arbitratur Noster. Id quod exemplis illustrat.
- p. 116. Magna et turpis defraudatio detegitur hic a Nostro cum opere ARCHANGELI PICCOLOMINI, quod ita est inscriptum: Anatomie integra, revisa, tabulis explanata et iconibus mirificam humani corporis fabricam ad ipsum naturae archetypum exprimentibus, cum praefatione et emendatione

*) Lugd. Batav. 1724. fol. p. 318.

**) Anatomia per uso et intelligenza del disegno etc.
Opera utilissima a Pittori et Scultori.

tione IOANNIS FANTONI Anatomici Taurinen-
fis. Veronae, sumtibus *Gabrielis Iulii de Ferrariis*,
1754 fol. Editor refert, se hoc opus PICCOLO-
MINI, circa finem seculi decimi sexti denati, acce-
pisse, et tabulas aeri incidi curasse, post mortem
eius et FANTONI illud emendasse. Comparat
autem Noster hoc opus cum catoptro microcosmi-
co, quod prodiit Francofurti ad Moenum 1660 fol.
mai. et edidit IOANNES REMMELINUS, atque
inuenit, vtriusque esse vnas easdemque tabulas, eam-
demque ipsarum explicationem. Quapropter hic de-
textit hanc fraudem editoris, nec non FANTONI,
cui emendatio operis PICCOLOMINI falso
adscribitur, defendit, et PICCOLOMINI atque
REMMELLINI opera non aliter, nisi titulo, differre
putat Noster. Quid quod Editor Veronensis litteras
has in tabulis non omisit. I. R. I. E. IO. REMMELI-
NUS Inuentor, L. K. I. E. LUCAS KILIAN Sculptor
et STEPHAN MICHELSPHACHER excudit.

Nunc disquirat Cl. MOEHSEN, cur delineatio- p. 118.
nes et figurae aeneae anatomicae, quae medicos
erudire possint, tantis difficultatibus praemantur.
Pertinet ad figuras aeneas, medicis vtilis, fida et ac-
curata potius naturae imitatio, quam magna et ex-
quisita ars. Aliter ars, quae imitationem assiduam
neglexit, eminentias, profunditates, situm partium
et verum vsum medicis occultat. Quapropter acci-
dit, vt optimi quique artifices medicis in hac re
saepe officiant. Id quod probat ex BIDLOO opere, in
quo optimus LAIRESSE *) delineationes curauit.

His accurate demonstratis, enumerat Noster p. 121.
anatomicos, qui figuras aeneas operum suorum ipsi
partim delinearunt, partim delinearunt et aeri inci-
derunt.

Xx 5

*) v. supra p. 696.

derunt. Hi sunt HEISTER, LIEUTAUD, CAMPER aliique.

p. 124. Sequitur iam magnum anatomicum opus ALBINI, C. IO. WANDELAARI delineationibus et figuris aeneis, et TARIN repetitis et contractis figuris. ALBINI celeberrimi opus inter anatomica, iam a Cl MOESEN commemorata, eminere, et artificibus pariter, ac medicis, plurimum inferuire arbitratur Noster, qui hunc inexplicabilem ALBINI laborem, studium, et molestias laudat, ac inprimis, quod sumtibus profecto magnis non pepercerit. Non solum enim Cl. WANDELAAR in domum suam recepit; sed et summam pecuniae viginti et quatuor millia florenorum huic operi perficiendo dicauit, inscio Cel. ALBINO *) num solueretur aliquando haec pecunia. Ob iconum harum itaque accurationem et vtilitatem Cl. TARIN, b. WINSLOVII discipulus, ALBINI myologicum opus minus sumtuosis impensis recudendum curauit. Qua occasione reliquos libros, a Cl. TARIN editos enarrat et laudat, insimulque singularis crassitiei cranii a Cl. TARIN obseruatae historiae, actis naturae curiosorum **) insertae, mentionem facit; nec non pollicetur alia occasione additamenta, ad hanc obseruationem nimis crassi cranii se communicaturum esse.

p. 130. De anatomico opere Ill. ALBERTI ab HALLER secundum ROLLIN et KALTENHOFER delineationes, cum HEUMANI aliorumque figuris aeneis nunc agitur a Nostro. Quemadmodum Cl. ALBINUS ossa et carnes egregie illustrauit: sic arbitratur Noster Ill. HALLERUM caeteras partes anatomiae ita curasse, vt accurata earum cognitione
arti-

*) Eiusdem annotat. acad. lib. III. c. XVI. p. 73. it. ibi lib. I. praef. p. 8.

**) v. vol. VIII. p. 251. seq.

artifices et medicipiane non possent superfedere.
Reliqua lectu digna et scitu necessaria mittimus.

De GAUTIER anatomicis figuris, viuis colori- p. 131.
bus pictis, haec habet Cl. MOEHSEN. Legitur
hic relatio de meritis LE BLOND, ADMIRAL et
GAUTIER. Primum in Gallia prodiit opus ana-
tomicum pictum, cuius Auctor erat pictor, et inscri-
ptio haec est: Essai d'anatomie en tableaux inpri-
mées etc. par M. DUVERNEY, peintes, gravées
et imprimées en couleur etc. par le Sieur GAUTIER.
fol. mai. 1745. Alterum EIUDEM anatomie de
la tête en tableaux imprimées etc. 1748. Tertium,
anatomie générale des viscères en situation etc.
avec angiologie et neurologie de chaque partie du
corps humain. 1751. Accesserunt dein ad primum
duodecim tabulae f. Suite de l'essai d'anatomie.
Nonnulla exemplaria et ita inscripta sunt: la myo-
logie du tronc et des extrémités avec les tables de
la description de tous les muscles du corps humain
1745. Ac idem opus Cl. MOEHSEN vidit cum
viginti et octo tabulis pictis hoc titulo: myologie
complete, en couleur et grandeur naturelle com-
posée de l'essai et de la suite de l'essai d'anato-
mie en tableaux imprimées, ouvrage unique etc.
1746. Ad haec itaque librorum amicis est atten-
dendum. Praeterea autem Noster arbitratur, de-
siderari hic a quolibet curam et studium Ill. ALBI-
NI et HALLERI, cum quoad anatomiam, tum
quoad tabularum rationem. Reperiuntur facile hic
magni errores in plurimis tabulis, et desunt inter-
dum toti musculi, interdum situs, insertio, magni-
tudo connexioque musculorum naturam non pro-
dunt. Cum plura ulterius nequeamus hic tradere,
ad iudicium Ill. BOERHAAVE *) et HAL-
LERI

*) v. nou. comm. acad. sc. imper. Petropol. Tom. II. ad
ann. 1749. Petropol. 1751. 4. mai. p. 194.

LERI *) de hoc opere Lectores amandandi sunt. Opus enim, superbo titulo non respondere, affirmamus cum Cl. MOEHSSEN et BOERHAAVE.

P. 137. Traduntur hic nonnullae relationes de primo vsu figurarum anatomicarum ligno et aeri incisarum cum viuis coloribus: item de LE BLOND, antecessore GAUTIER, quem nonnulli primo loco in hac arte nominant. HUGO autem DE CARPI post annum 1520 eiusmodi tabulas iam quidem curauit; attamen potissimum hic inclaruerunt Cl. viri LE BLOND et L'ADMIRAL. Fit et hic mentio CASPARI ASELLII primi vasorum lacteorum detectoris, qui, eo mortuo, tractatum suum de lactibus seu lacteis venis quarto vasorum meseraicorum genere non ipse curauit. Sed duo medici TADINVS et SEPTALIVS, demortui amici 1627. in 4. Miolani eum vulgarunt, cum quatuor ligno incisis figuris, quae artificii huius culturam et tum produnt. Tum IACOBI CHRISTIANI LE BLOND Francofurtensis ad Moenum primi, vti fertur, qui figuras ligno incisas cum coloribus viuis fecerit, vita hic a Cl. MOEHSSEN accurate narratur, et nonnullae figurae, a LE BLOND factae, quas Noster possidet, commemorantur.

P. 143. Iam sequuntur ADMIRALIS anatomicae icones, coloribus distinctae. Et quis est, qui non delectetur earum adspectu? Iam ante tempora GAUTIER, IOANNES ADMIRAL eiusmodi icones coloribus distinctas scite fecit, et multas quoque dissertationes BERNHARD SIEGFRIED ALBINI, vt de arteriis et venis intestinorum humanorum **) de sede ac causa

*) BOERHAAVE method. disc. med. Tom. I. p. 302. no. 2.

**) EIVSDEM annotat. acad. lib. III. p. 54. seq.

caussa coloris aethiopum et ceterorum hominum, eiusmodi iconibus illustravit. Dein et FREDERICI RUYSCHII praeparata anatomica cum explicatione figurarum, sine ulteriori autem rei tractatione, in latina, Gallica, et Belgica lingua, pinxit. Nimirum icon membranae vasculosae, ad infima acetabuli ossium innominatorum positae, durae matris ex capite fetus humani octo circiter mensium, cranii, perioestio tecti: durae porro matris in concava superficie visae: rursus effigies penis humani cera iniecta praeparati.

BARTHOLOMAEVS SEUTER icones phy- p. 140.
tanzoigraphiae WEINMANNI viginti et quinque primas curavit, reliquas simul cum IOANNE ELIA RIDIGER et IOANNE IACOB. HAID. Antea vero Cl. KIRNHALS in Anglia IOANNIS MARTINI historiam plantarum rarissimarum iconibus eiusmodi illustravit 1728.

Iam ad COWPERI anatomiam reformatam CHE- p. 148.
SELDEN osteographiam Lond. 1737. EIVSDEM- que anatomy of the human body, cuius sexta editio Londini 1741. in 8. mai. prodiit, Noster venit. Additae sunt huic editioni quadraginta tabulae aeneae, per cameram obscuram aeri incidit eas GERARD VAN DER GVCHT. Inter quas duas potissimum amant artifices, decimam nonam nimirum tabulam, vbi *Marsyas* arbori alligatus spectatur, et vigesimam, qua *Hercules* Antaeum manibus attollit. Ambae situm musculorum, integumentis communibus separatis, egregie docent.

Restat

p. 149. Restat nunc I. M. PAPILLON *) tabularum ligno incisarum opus egregium et vnicum, quod ex hac parte perfectum Noster iudicat. Reperitur et in eo inter multas alias res relatio VESALII editionum, cuius prima editio 1534 iam prodisse dicitur, VESALIVMque in quinquagesimo et octauo 1564 aetatis anno mortuum esse. Quam vero relationem interdum Noster minus accuratam esse monstrat, nec non alios errores in huius operis historica parte detexit, quos breuitatis studiosis nobis hic tradere non licet. Practicam autem partem huius operis laudat Noster.

p. 152. Fuerunt autem medici, et chirurgi, qui delinearent, sculperent et pingerent: eorum itaque hic mentio iniicitur. Vt ANTONIO VENEZIANO siue FIORENTINO, GEORGIUS IACOBVS LANGE physicus Norimbergensis, ROMYN DE HOGHE, RVYSDAAT et LA FAGE, chirurgi, porro LVCAS sanctus, Evangelista, medicus et pictor, quem variae medicae societates et academiae pictoriae patronum sibi adsciuerunt, de quo multae res narrantur, etiam theologis vtilis, quas hic repetere non possumus. VRBAN HIAERNE archiater Suecicus dissertationi suae inaugurali: de obstructione lacteorum vasorum et glandularum mesenterii, Andeuagi 1670. annexas tabulas, quatuor aeneas ipse delineauit et incidit, suamque ipsam imaginem reliquit. Fuerunt et medici, qui in numismaticis et geographicis delineationibus emerent, e. gr. IO. CVSPINIANVS, imperatoris MAXIMILIANI archiater: IOH. IACOB SCHEVCHZER Heluetus et eius filius IO. CASPAR. Multas vtilis res oportuit nos hic omittere.

De

*) EIUSDEM traité historique et pratique de la gravure en bois Tom. I et II. et supplement, ou tom. III. a Paris 1766. 8.

De botanicis operibus, cum figuris aeneis, quas p. 136.
 Auctores ipsi delinearunt atque sculpservnt, huc refe-
 rendus est DIOSCORIDES, DILLENIVS, HILL,
 IOANNIS BAPTISTA MORRANDI, FABII CO-
 LVMNAE, CONRADVS IOHRENIVS, qui sumti-
 bus suis floram ad viuum egregie depinxit, quorum, et
 adhuc aliorum opera hic a Nostro diiudicantur. Arbi-
 tratur autem Cl. MOEHSN, horum botanicorum co-
 namina artibus minus vtilia fuisse, quam anatomico-
 rum. Natura enim semper superat artem in bota-
 nicis figuris. Insimulque, quotidiana experientia
 docente, affirmat, botanicum characterem non raro
 in his botanicis iconibus desiderari, eisque potius
 oculos delectari, quam naturae amicos erudiri at-
 que instrui.

Tum et chemiae vtilitas ad artium emolumentum p. 165.
 declaratur. Ac primum quidem ratione colo-
 rum: deinde ratione pastarum terrearum (*Glaspa-*
sten), vbi primus nominandus est Cl. HOMBER-
 GIVS, quem dein LIPPERTVS Dresdensis, gem-
 marum antiquarum causa clarus, longe superavit.

Denique et nonnulli medici motum animalium, vt p. 170.
 BORELLVS, tractarunt: rursus de proportionem et sym-
 metria partium corporis humani egerunt, vt ELS-
 HOLZ et REINHARD. Fatendum autem esse pu-
 tat Noster, ALBRECHTVS DÜRER hanc rem
 iam exhaustisse, et praecepta Cll. virorum TARIN
 et GAUTIER maiorem fructum attulisse.

Catalogus iconum, praecipue medicorum, eo- To. II.
 rumque, qui hanc artem coluerunt, multos in se p. 1.
 continet medicos. Est ille alphabeticus et nume-
 rum millenum superat, additis plerumque delineat-
 ionibus, pictoribus, aere caelatoribus s. sculptoribus
 loco.

locoque natali, academia, qua viuebant, forma, aetate, annis, quibus nati et denati sunt hi viri docti. Et admiramur vel hic maxime profecto assiduitatis studium Cl. MOEHSSEN, et gratias magnas habent illi huius rei amici.

p. 151. Inter additamenta ad indicem medicorum celebrium reperimus imaginem celebris medici et chirurgi FRANC. QUESNAY raram illam, ideoque pretiosam ASTRUCII: porro ROBERT WHITE, FRANC. PATIN, THOMAS BROWNE, ligno incisam imaginem MELCHIORIS SEBICII seu potius SEBISCH. Porro imaginem ANTONII VALLISNERI et ANDREAE VESALII.

p. 157. Indicat porro Noster eas medicorum imagines, qui defunt in hac collectione.

p. 164. Explicat hic compendium scribendi, et refert Noster de operibus, in quibus variae hic commemoratae imagines reperiri possunt, insimulque addit annotationes, ad historiam artium et artificum spectantes.

Sed haec haftenus. Condonabunt Lectores, si paullo diutius in hoc libro indicando, cuius lectio maximopere commendanda est, immorati simus. Utilitas enim eius magna, qua abundat hoc opus profecto, intelligitur non solum ab historiae literariae medicae cultoribus et artium amicis, sed a medicis quoque ac chirurgis, qui in accurata anatomica imprimis cognitione acquirenda occupati sunt.

XV.

IO. ERNEST. IMMAN. WALCHII consil.
aul. Saxo. Vin. et Isenac. eloquent et poes.
P. P. O. antiquitates medicae selectae. Ienae.
suntibus viduae Croekerianae. 1772. 8. c. f.
pgg. 180. sine dedicatione.

Nisi omnes, profecto plurimae res notatu dignae, p. 1.
quae de medicis oculariis Romanis eorumque
collyriis atque sigillis, quibus pyxides vnguentarias
insignire solebant, ideoque thecae vnguentariae o-
percula nuncupabantur, posteritati relictæ sunt, hic
inueniri possunt. Tribus sectionibus hoc a Cl. WAL-
CHIO praestatur: I. Sigillum medici ocularii in agro
Ienenfi repertum: II. figilla medicorum oculariorum
apud veteres Romanos: III. inscriptiones medico-
rum oculariorum.

Septendecim sigilla in altera sectione a Nostro p. 49.
collecta sunt. Exempli loco vnum tale sigillum
afferamus, cum praeterea ampliorem horum sigil-
lorum omnium atque inscriptionum quoque recen-
sionem non ferat instituti nostri ratio.

Est illud decimum tertium Q. IULII MUR- p. 83.
RANII, ita comparatum:

QIVLMVRRANIMELI NVMA DCLARITATEM

QIVLMVRRANISTAGIV MOPOBALSAMATA DCA P

Alia quatuor habent latera, et singulum later
aliter est inscriptum. Horum itaque sigillorum ex-
plicationes addit, easque aliorum eruditorum viro-
rum, vel suis coniecturis Noster probat atque con-
firmat.

p. 103. Porro disquirat Noster, quid sit, medico imperare apud ALFENUM VARUM. Commemorat nimirum Noster locum ALFENI VARI, ubi medicis imperari videtur, illeque similibus locis SENECAE et CICERONIS illustratur. Cum medici autem aegris imperent, nec aegri medicis, GREGORIUS HALOANDER quoque pro imperantes *implorantes* legendum esse coniicit. DIONYSIO GODOFREDO autem, HALOANDRI emendationem haud plane improbanti, non opus videtur hac correctione. Putat enim imperantem hoc loco medicum designare, qui remedia morbo laborantibus praescribere iisdemque sanitatis aut conferuandae, aut reparandae leges indicere soleat. Et sic alii aliter atque aliter hunc locum explicarunt.

His emendationibus eruditos viros plane hic
p. 110. supersedere posse, hisque verbis prorsus immutatis eorumque sensu haud turbato, totam hanc agitatam litem ex ipso apud Romanos medicorum statu, eorumque conditione dirimendam esse Noster arbitratur. Erat nimirum florentissimis reipublicae Romanae temporibus, tum et imperatorum aevo, duplex in vrbe medicorum genus: seruale alterum, vulgare plebeium et maximam saltem partem rude et illiteratum; alterum ingenuum, doctum, bonisque artibus et Graecae potissimum medicinae disciplinis egregie imbutum. Hi itaque medici, quibus imperatum fuisse apud Romanos legimus, erant serui, illudque ipsum imperium attinebat artis exercitium, minime vero medendi methodum spectabat *).

p. 117. Tum historiam Asclepiadarum Noster persequitur. Haud vna olim Asclepiadarum ratio et conditio fuit. Ac primum quidem nomen istud genti fuisse dicitur eorum solummodo proprium, qui vel ab ipso

AES-

*) cf. comm. nostr. Decad. II, Suppl. II, p. 255.

AESCULAPIO genus suum deriuarint, vel per adoptionem in Asclepiadarum olim transierint familiam. In antiquis ideo lapidibus Ασκληπιάδαι τῷ γένει vocantur. Qualis erat DIOCLES CARYSTIUS aliique.

Exstincta vero Asclepiadarum familia, frequen- p. 122.
tius nomen ASCLEPIADAE vsurpari coepit, aliis cognominis loco, nulla gentis aut vitae habita ratione; aliis propter artem, quam profitebantur, id sibi adsciscitentibus, vt illustri hoc nomine auctoritatem sibi, fidem medicamentis, a se praeparatis, conciliarent. Quorum sunt potissimum sex: *Primus* ASCLEPIADES Prusensis medicus. APOLLONII ERASISTRATEI discipulus: *Secundus* ASCLEPIADES iunior, φαρμακίων dictus ob remedium compositionem, quae et GALENUS diligenter descripsit. In DOMITIANI tempora incidit quoque ASCLEPIADIS aetas, cui *tertius* a Nostro adsignatur locus, atque e lapide Reinesiano probatur, quo is L. ARRVNTIVS SEMPRONIANS ASCLEPIADES medicus DOMITIANI appellatur. *Quartus* medicus est CALPVRNIVS ASCLEPIADES, testante antiquitatis monumento.

Sequuntur tandem bini vltimi, quorum vnum, p. 128.
qui ordine *quintus* est pariter antiquo, cognouit, Τ. ΑΙΑΙΟΣ ΛΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ ἱατρός λῃδ. ματ. χειρ. medicus ludi matutini chirurgus; alter et *sex-
tus* appellatur P. NUMITORIVS PVBLII libertus medicus oculusarius e. f. p.

Iam sequitur medicina veterum lapidaris. Hic p. 131.
lapides, quorum vis salutaris, a veteribus laudatur, et a recentioribus, nonnullis lapidibus exceptis, vt magnes, haematites etc. prorsus reiicitur, collecti sunt a Nostro, qui quaedam de lithologia veterum chirurgica hic commentatur.

- p. 141. De Pyrrhonismo medicorum veterum quaedam hic a Nostro traduntur. In Aegypto medicinae ratio vnice in longo rerum vsu multaque experientia sita fuit atque collocata. Deinde autem, quum litterae ex Aegypto in Graeciam migrarent, medici Graeci de morbis quoque philosophabantur, et, quae maiores vsu atque experientia didicerant, ad principia et causas primas revocare, ipsaque veterum de morbis praecepta ad artis et disciplinae formam traducere studebant. Quemadmodum tum in Graecia permultae philosophorum sectae, familiae et disciplinae erant: sic et secta florebat, quae dicebatur Pyrrhonia, cui multi amici strenuique defensores erant.
- p. 149. Huic primum praefuit ΠΥΡΡΗΟ, a quo etiam duxit nomen secta, qui arbitrabatur, rerum naturae causas adeo saepe tectas et abditas esse, vt aegre, quid verum sit, quidue minus, rite possit detegi. Vt ne hanc ob causam falsis opinionibus, sophismatibus idque genus aliis decipiamur, decere philosophum credit, ob virium intelligendi imbecillitatem, et propter tot sensuum fallacias, de quibusuis rebus dubitanter pronunciare, nec quidquam sine clarissimis et euidentissimis documentis, pro vero habere. ΠΥΡΡΗΟΝΕΜ itaque amicum fuisse medicae experientiae, non vero opinionum et sophismatum, ea destitutorum, Noster probat, ita, vt a primis artis medicae initiis, ideoque paullo altius rem repetat.
- p. 157. Rursus de morbis veterum obscuris Noster agit. Ex ΑΡΕΤΑΕΟ duo commemorantur morbi, quos venae cauae acutum morbum, et πνευμῶδες appellat, et in CAELIO AVRELIANO catalepseos species occurrit. Sunt vero haec mala, nostra aetate non obuia, nec satis accurate a veteribus descripta Nostro

stro videntur. Quapropter et medicos Cl. WALCH monet, vt paullo diligentius in haec morborum signa inquirent, eorumque rationem reddant.

Finit hunc librum tractatio de venae cauae p. 167. morbo acuto apud ARETAEVM. Hic morbus ab ARETAEO ita describitur, vt non de duobus diversis venae cauae morbis, sed de vnico tantum sermonem esse, luculenter appareat.

Hoc probato, disquiritur a Nostro: vtrum mor- p. 170. bus iste scissura venae cauae sit, nec ne? Alii enim hunc morbum rupturam seu fissuram cauae venae, alii inflammationem eiusdem esse autumarunt. Rupturam autem non largitur Noster; nam κέδματα fissuram venae cauae non designare contendit. Pariter non credit Noster, ARETAEVM iecoris vitia cum venae cauae inflammatione confudisse.

Ad inflammationem autem ramulorum venae p. 177. cauae, per iecur sparforum, quod attinet, duplex iam oritur apud Nostrom quaestio: altera, quomodo ARETAEVS inflammatos ramulos illos acutum venae cauae morbum dicere possit, quum tamen nusquam apud veteres medicos, neque apud ipsum ARETAEVM ramulis his nomen venae cauae fuerit adsignatum? altera, qua ratione ARETAEVS postea inflammationis genus pro satis frequenti vendicare potuerit. Omnino autem huius morbi ARETAEI descriptio non egere obscuritate Nostro videtur.

XVI.

*Etwas von Fiebern. Erster und Zweyter Abschnitt,
von G. I. BEUTH. Cleve und Leipzig, bey Joh.
Gottlieb Baerstecher, Buchhaendler. 1771. 8.
Seiten 112 u. 107.*

i. c.

Quaedam de febribus. Prima et secunda sectio.
Auctore G. I. BEUTH. M. D.

Ex dedicatione, quae directa est ad Cl. LEIDEN-
FROST, intelleximus, in tribus sectionibus
Sect. I. Nostrum hanc rem esse absoluturum. Prima haec
sectio constat quinque capitibus, quorum pri-
mum agit de idea febris; et de essentialibus
symptomatibus secundum; tertium antece-
dentes causas, quae cernuntur in sex rebus non
naturalibus, pertractat, quae haec febris sympto-
mata efficiunt; in quarto enarrantur effectus, qui
a febribus producuntur, ac quinto denique capite
de accidentalibus febris symptomatibus disputatur.

p. 9. HELMONTIVM primum esse Noster arbitra-
tur, qui naturam febris effectricem iudicavit. Exa-
minatis febris definitionibus HELMONTII, SY-
DENHAMI, STAHLII, BOERHAAVII et SWIE-
TENII, aliorumque veterum et recentiorum, febris
idea a Nostro ita formatur, vt sit febris fortior mo-
tus humorum, quo quaedam peregrina materia e
corpore expellatur.

p. 22. Ad essentialia symptomata febris refert Noster
maius aut minus frigus, caloris varios gradus et
plus minusue celerem pulsum. Horror febrilis cer-
nitur vel in horripilatione vel in frigore vel in ri-
gore,

gore, qui ad conuulsiones propemodum accedit. Calor febrilis potest esse maior et minor, humidus et siccus.

Cibus et potus inferuit febribus vel ex eorum **P. 30.**
acrimonia, vel ex indigestione, quam inducunt in corpus, vel efficiunt.

Palpitatio cordis non est effectus febris, sed materiae febrilis: anxietates cordis solummodo a febre ipsa pendent. **P. 44.**

Ad primum enim stadium pertinent stagnationes, impeditus sanguinis circuitus et cordis anxietates, indeque oritur frigus. Ad alterum autem resolutio tenacis febrilis materiae, qua stagnationes ortae sunt: liberior rursus circulatio, sanguinis calor et rubor. Hic iam vires naturae separandae sunt, quae in contractione cordis, ei propria, cernuntur. Reliqui motus, supra memorati, sunt febris, de cuius salubritate, cruditate, coctione et crisi nunc Noster disputat. Omnes febres vel plena fanitas, **p. 56.**
vel mors, vel alius morbus sequuntur.

Dispersuntur symptomata febrilia a Nostro quoque **P. 59.**
in quatuor classes, quarum vna ea continet, quae omnibus omnino febribus sunt communia, ut horror, calor, celer pulsus. Altera ea complectitur symptomata, quae huic vel illi febre sunt propria, e. g. intermissio febris febribus intermittentibus solemnis solummodo est. Tertia classis ea spectat symptomata, quae quibusdam quidem conueniunt febrium speciebus; tamen et aliis morbis superueniunt, ut sunt peruigilium, delirium, coma, conuulsionesque. Vltima classis attinet ea symptomata, quae accidentium nomine insigniuntur, nec praeterea ad essentiam febris pertinent, ut sitis, nausea, ructus, vomitus, diarrhoea, exanthemata cutanea.

Secl. II. In secunda sectione ordinem febrium Noster persequitur, earumque diuisionem in continentes, intermittentes et continuas addit. Postea continentes benignas, vt ephemeram, synochum simplicem: et malignas, vt synochum putridam et febrem ardentem pertractat. Tum sequuntur intermittentes et remittentes seu continuae e. g. febres catarrhales inflammatoriae, phrenitis, angina, peripneumonia, pleuritis, paraphrenitis, inflammatio ventriculi, intestinorum, nephritis, hepatitis. De his in quatuor capitibus a Nostro disputatur.

p. 8. Eas febres, quas Noster appellat continentes, Cll. BOERHAAVIUS et ELLERUS febres continuas non remittentes nominarunt; et eae, quas Noster ad continuas retulit, continuae remittentes ab illis nuncupatae sunt.

p. 22. Malignitas febrium acutarum cernitur potissimum in prostratione virium, pulsu debili et obscuro et anxietate praecordiorum.

p. 44. Sanguificationis in physiologia difficillima Nostro videtur explicatio. Nam pulmonibus et motui partium solidarum sanguificationem non tribuit. Id quod ex ouis, calori animali subditis, illustrat. Ceterum non negat, se ignorare, quo modo chylus in sanguinem mutetur, vtrum sanguificatio solius sanguinis ope fiat, an aliae functiones s. humores ad eam perficiendam requirantur?

Angina inflammatoria a Nostro cum **REVERTIO** ita definitur, vt sit febris inflammatoria cum impedita respiratione deglutitioneue, vel vtraque. Simul hoc impedimentum vel in faucibus, vel in arteria aspera, vel in oesophago potest latere. Quod si vero hic morbus a vitio abdominis seu pectoris
et

et aliarum partium corporis proficiscitur, non dicitur angina inflammatoria.

Peripneumonia a Nostro dispescitur in pulmonalem et bronchiale: pleuritis in siccam et humidam, in idiopathicam et symptomaticam e. f. p. p. 70.

Inter symptomata, paraphrenitidi potissimum propria, refert Noster tussim cum sternutatione, singultum, risum sardonium et vomitus. p. 86.

Calculus raro excitat dolorem, quam diu in pelvi renum haereat; simulac autem ille peluim reliquerit, potest ad nephritidem conferre: rursus fortior et continua equitatio. p. 93.

Reiicit Noster Cl. BOERHAAVI duplex inflammationum genus, nec attendit in hepatide ad vasa hepatis sanguifera propria et communia, in quorum, si obstructione laborent, diuersitate, apud BOERHAAVIUM spectatur inflammationum varietas. Nam in hepatide non obseruatur marcor hepatis, sed icterus semper propemodum hepatidem comitatur. Symptomata itaque hepatidis semper iudicauit Noster vna eademque. p. 96.

Non raro vermes, ex duodeno in vesiculam felleam repentes ibique morantes, ictero inseruiunt. Reseruat Noster ipse felleam vesiculam viri, ictero mortui, in qua lumbricum crassum et magnum reperit. p. 106.

Quemadmodum in ictero laborantibus albuginea primum: sic tandem ossa ipsa tingi flauo colore, licet raro, Noster arbitratur. p. 107.

IOANNIS BERNHARD. HULLESHEIM
Med. Doct. et Professor. publ. ordin. in
Gymnas. acad. Lingens. gemellarum infan-
tum abdominibus connatarum brevis histo-
ria cum animaduersionibus theoreticis et
practicis, et adiuncta de duobus monstris ap-
pendice; nec non morbi rarissimi historia.
Zwollae, apud S. Clement. 1770. 8. pagg.
28. sine praefatione c. f.

p. 1. **G**emellae hae, de reliquo sanae infantes, sibi inui-
cem abdominibus ab ensiformi processu infra
umbilicum usque accretae, et paullo post partum
mortuae sunt: quarum iconem curauit, ob partum
sane mirum eiusque satis felicem euentum, quem
hic ex relatione obstetricis narrat, nihilque certi
complecti intelleximus. Inter grauiditatem sentie-
bat grauida corpus graue, vt lapidem magnum, vi-
ta carens, nec quidquam fecit aut vidit, quod huic
coalitioni in grauiditate inferuire posset, excepto
hoc, quod duos infantes inter grauiditatem in gre-
mio posuerit, ac ex tenero amore pectori appresse-
rit. Num imaginatio grauidae hic ad coalitionem
quid afferat, iudicio aliorum relinquit Noster.

p. 7. Porro quaerit Noster: an haec concretio, si
viuae ac sanae mansissent hae gemellae, sectione fe-
lici cum successu separari potuerit? negat au-
tem, hoc fieri potuisse ob haemorrhagias oriundas,
nec non ob incertitudinem, vtrum integumenta
communia vtraque habuerit, visceraque abdomina-
lia vtriusque libera fuerint accretae, nec ne?
Quodsi vero alterutra mortua fuisset, tentanda dis-
sectio Nostro videtur.

Describuntur hic duo monstra, quorum vnum p. 11.
ex adspectu capitis equini ficti illud prae se ferebat;
alterum habebat frontem, setis suillis cinctam, ad
oculos vsque pendentibus. Brachia bene erant
comparata, excepto extremo, cui haerebat adnata
ungula porcinae similis, deficientibus cubitis atque
manibus. Illud non diu vixit, hoc per sex menses:
quod pariter Noster terrori et adspectui tribuere, at-
que ita imaginationi grauidarum laesae fauere videtur.

His accedit historia morbi rarissimi, quo labo-
rabat femina viginti sex annorum. Erat cachexia p. 15.
leucoplegmatica scorbutica, coniuncta cum debili-
tate neruosa et fistula intestini recti, in vaginam seu
orificium vteri externum potius, quam in vrethram
penetrante, etiamsi id quoque per vasa haemorrhoi-
dalia interna, ad vrethram tendentia, fieri posse No-
stro videretur. Indeque flatus cum tanto sibilo, vt
adstantes audirent, ac aegra manifeste sentiret, nec
non aliae particulae peregrinae simul cum vrina et
sine ea per vias vrinarias exhibant. Aegra enim re-
tulit, femina duo tribum, praecedente die come-
storum, cum vrina effluxisse.

Quapropter quaeritur a Nostro: quis morbus,
quae causa morbi, prognosis, cura? quae flatuum p. 19.
causa per vrinae vias erumpentium aliarumque pere-
grinarum rerum? Quibus resolutis, hanc raram morbi
ac summe complicati descriptionem tradit HERR-
MANN BOERHAAVE, cuius discipulus Noster
fuit, ideoque consilium sibi expetiit.

Ex additis literis BOERHAAVII cognouimus,
se quidem de acinis, flatibus, aliisque vrinae via e- p. 26.
missis, etiamsi similia exempla occurrant in scriptis
medicorum, dubitare, illudque haud satis capere;
morbum tamen pendere a systemate neruoso debili
et mobili cum siccitate macilenti corporis et magna
obstructione in syntaxi coeliaca ac mesenterica.

Noua physico medica.

Societas scientiarum *Bruxellis* 1769 fundata, cuius instituti rationem supra reddidimus *), per edictum Imperatricis Augustissimae MARIAE THERESIAE die 16 decembris 1772 Academia Caesareo Regia scientiarum elegantiorum literarum et bonarum artium designata est.

*Seelandinam societatem artium et scientiarum Vlissingensem praemium monetae argenteae esse adiudicaturam auctori dissertationis, quae inscripta est: nunc alio nunc rursus alio fit obuia vultu, et tractat illam quaestionem: potestne naturae scrutator excognitis cum observationibus et experimentis etc. **)* nuper relatum legimus. Profiteatur autem suum nomen, rogat societas.

Missis aliis problematibus, ab Academia scientiarum elegantiorum literarum et artium *Rothomagensi*, eruditis cum viris communicatis, nec nos attingentibus, hanc solummodo quaestionem hic repetimus.

Optat nimirum Academia, ut quis differat de *mechanismo secretionis urinae cum descriptione organorum huc spectantium, quaeque celeritatem, quacumque urinae secretio expeditur, iuuent.*

(Sur le mécanisme de la sécrétion des urines avec une description des organes, qui operent et qui concourent à la promptitude avec laquelle cette sécrétion s'exécute).

Pertinet hoc problema ad annum 1773: et is, qui hanc in rem inquireret ex voto Academiae, expectare

*) v. comm. nostr. Vol. XVII. p. 345. it. Vol. hoc p. 252.

**) v. comm. nostr. Vol. hoc p. 538.

Etare potest maximum praemium, monetam auream trecentarum librarum Gallicarum, quod Academia munificentiae Ill. Ducis DE HARCOURT debet.

Commentaria autem ante primum iulii diem 1773 Cl. L. A. DAMBOURNEY, qui ab epistolis Academiae est, tradenda sunt. Praeterea *Eiusdem* nulla nobis lex in scribendis mittendisque elaborationibus constat, quae ab aliarum academiarum legibus ullam prodat diuersitatem.

L' Accessit ab *Eadem* naeta est commentatio poetica, continens literas patris in obitum filii vnici, decimo aetatis anno ex variolarum insitione mortui, cuius Auctor Ill. comes DE LAURENCIN esse dicitur.

Praemia reliqua anatomiae, chirurgiae, arti obstetriciae, botanicae, mathesi et hydrographiae dicata, inter studiosos, his de scientiis optime meritos, sunt distributa.

Regia societas *Parisiensis*, in emolumentum et incrementum rei rusticae conflata, promisit ei praemium quadringentarum librarum Gallicarum, qui ad hanc quaestionem 1774 datam ita responderet, vt expectationi societatis fieret satis.

Est ita quaestio comparata : *Quaenam erat Romanorum agricultura ab initiis inde Reipublicae ad tempora IULII CAESARIS, quatenus imperium, mores, et commercium spectet?* (*Quel étoit l'état de l'agriculture chés les Romains, depuis le commencement de la Republique iusqu' au siecle de IULES CAESAR, relativement au gouvernement, aux moeurs et au commerce?*)

Commentaria sunt ante 1 diem decembris 1774 tradenda atque latino vel franco gallico idiomate scri-

scribenda *). Leges praeterea cum aliis societatibus sunt eadem.

Regia scientiarum et literarum elegantiorum *Berolinensis* Academia problema ex physica vegetabilium consideratione depromptum, *theoriam transplantationis* spectans atque 1770 propositum, iterum communicat cum viris eruditis hoc 1773 anno. Quaeratur ut hoc in superioribus **), rogamus. Ibi enim non solum quaestionem, sed et modum, quo optat Academia, ut respondeatur, inuenies.

Societas oeconomica *Petropolitana*, cuius iam mentionem fecimus ***) duas theses in rem rusticam iudicio eruditorum committit. Ac prima quidem haec est :

Ex diuersa natura soli prouinciarum Russicarum determinetur, quantum terrae requiratur ad domum, agros et id genus alia exstruenda, ubi familia rustica, quae constet ex duobus viris totidemque feminis, et, qui iis respondeat, senum infantumque numero vitam degat, ut habeat familia in eiusmodi habitaculo, unde subsistat, omnibusque negotiis, quae demumcunque sint, subeundis et praestandis par sit.

(De déterminer, d'après les différentes qualités du sol des provinces Russes combien il faut de terrain pour la maison, les champs cet., d'une famille des laboureurs, consistant en deux ouvriers, deux femmes et un nombre proportionné de vieillards et d'enfans; pour que cette famille trouve dans cette habitation une subsistance et un entretien suffisant et qu'elle puisse elle-même suffire à tous ses travaux.)

Ela-

*) v. comm. nostr. Vol. XV. p. 357.

**) v. comm. nostr. Vol. XV. p. 358.

***) v. comm. nostr. Vol. XVI. p. 545.

Elaboratio, quae ad prouinciam Ingriae accommodata sit, centum numorum aureorum, quae et alias prouincias spectet, quinquaginta aureorum deportabunt.

Altera, praemio quinquaginta aureorum numorum Hollandicorum, ita legitur : *Qui esset optimus modus habitaculum rusticum, constans ex aedibus, aula, horeo, horto ceteraque exstruendi, ut simplex illud sit minusque sumtuosum, iis tamen non destituatur, quae rustico ex climatis natura sint necessaria.*

(*Quel seroit le meilleur plan d'une habitation de paysan, maison, cour, ecuries, granges et bâtimens nécessaires, de manière, que cette habitation fût aussi simple et aussi peu dispendieuse, qu'il seroit possible, et qu'elle renfermât néanmoins toutes les commodités nécessaires au paysan, en égard au climat*).

Pertinent hae duae theses ad annum 1773, quarum elaborationes a societate expectantur ante 1 diem octobris eiusdem anni. Quo ipso die conueniet *Eadem* ad has res disquirendas, ac praeterea quinque monetas aureas, singulam pretio centum numorum, quinque chirurgiae studiosis indigenis attribuet, qui per hunc annum 1773 commentarium vel tres obseruationes dignas exhibitas cum societate communicarunt.

Facultatem medicam *Parisinam* numos accepisse a Cl. CUVILLIERS DE CHAMPOYAUX medicinae doctore ad quaestiones cum eruditis viris communicandas, praemiisque ornandas, si elaborationes eorum facultati placeant, nuper retulimus *).

Quaestio, quae ab *Ea* proponebatur, id volebat : *num possent morbi contagiosi praeuideri, arceri, ac, si iam progressi sunt, impediri ?* (*S' il est possible de prévoir les maladies épidémiques, et quels seroient les*

*) v. comm. hoc Vol. hoc. p. 150.

*les moyens de prévenir ou d'en arrêter le progrès ? **).

Atque in hanc rem ita Cl. LEBRUN medicinae doctor inquisuit, vt votis facultatis medicae Parisinae responderet elaboratio et praemium reportaret.

Postea nouam quaestionem tradit *Eadem* facultas, cuius responsionem exspectat 1774. Est haec: *quinam est pestis, si ea est peculiaris morbus, character ? quaenam remedia ad eam curandam et praecauendam ? (si la peste est une maladie particulière, quel en est le caractère, quels sont les moyens de la traiter et de la prévenir ?* Reliqua vide loco paullo ante memorato.

Gothae auctoritate et munificentia serenissimi Ducis in vsum publicum theatrum anatomicum exstructum est, cui Experientissimus GRIMM consiliarius et archiater, est praefectus. Id simul cautum est, ne copia cadauerum deficeret. Demonstrationes quoque iam coeptas esse legimus. Initium factum est praeterito 1772 anno.

Erfordiae experientissimum atque excellentissimum IOANNEM CAROLVM OETTINGER, medicinae professorem publicum extraordinarium designatum fuisse iam indicauimus **).

Adiit illam professionem Cl. OETTINGER translatione, qua de febribus, ab initio fere mensis decembris 1771 per annum 1772 huc vsque Erfordiae, inque eius confiniis epidemice grassantibus, nonnulla commentatur: ac simul pro muneris, sibi clementissime demandati, ratione ad audiendas praelectiones artis salutaris cultores inuitat ***).

Cl. 10-

*) v. ibid.

**) v. comm. nostr. Vol. XVII. p. 719.

***) Quae prodit Erfordii ex officina Nonnii 1772. 4.

Cl. IOAN. AUG. WOHLFARTH *), medicinae doctor in vniuersitate, quae *Halae ad Salam* floret, eiusdem artis professor extraordinarius factus est.

Cl. IOANNEM FRIDERICUM GMELIN, medicinae doctorem, fuisse creatum *Tubingae* professorem extraordinarium medicinae relatum legimus.

Illustris FERDINAND. IACOB. BAIERVS, Academiae naturae curiosorum Praeses **), qui *No-rimbergae* hactenus est moratus, consiliarius aulicus *Onoldinus* factus est, et *Onoldum* iam sese contulit.

Hafniae CHRISTIANVS LODBERG FRIIS medicinae doctor et professor primarius initio huius 1773 anni obiit.

Cassellis die 14 decembris 1772 Cl. THEODORVS AVGVSTVS SCHLEGER medicinae doctor et professor et h. t. Prorektor **), anno aetatis quadragesimo quinto obiit.

Hamburgi die 4 februarii 1773. GEORGIVS FRIDERICVS RICHERZ, medicinae doctor et xenodochii medicus ordinarius, anno aetatis sexagesimo secundo animam efflauit.

Experientissimus BATIGNE praeterito 1772 anno, qui tractatum de digestionem ****) scripsit, *Berolini* vitam cum praematura morte commutauit.

Ibidem

*) v. comm. nostr. Vol. XVII. p. 159.

**) v. comm. nostr. Vol. XV. p. 706.

***) v. comm. nostr. Vol. hoc p. 149.

****) v. ibid. Vol. XVI. p. 96.

Ibidem porro experientissimus LEONELIAS HIRSCHHEL, qui variis scriptis inclaruit, optimo aetatis flore e viuis ereptus est, vltimo anni 1772 mense.

Bernae societas typographica commercium litterarum Ill. ALBERTI AB HALLER inter celeberrimos medicos ac physicos ALBINUM, REAUMUR, NOLLET, WERLHOF, PRINGLE, HEISTER, TREWIUM, MORGAGNI, SENAC, IACQUIN, BURRMANN, TISSOT, ZIMMERMANN, cet. ita publici iuris se facturum esse pollicetur, vt in duodecim voluminibus, quorum singulum viginti et quinque seu triginta plagulis constabit, subinde prodeat in octauo. Octo volumina epistolis, Latino idiomate scriptis, quatuor Teutonico, Francogallico, Anglico et Italico exaratis absolui dicuntur. Quotannis duo vel tria apparebunt volumina.

Praeterea et Ill. AB HALLER spopondit, neglectis rebus domesticis, eas se excerpturum, quae usu suo non destituantur, nec non sparsim, vbi necesse sit, annotationibus loca nonnulla, quae obscuritatem aliquam prodere videantur, illustraturum esse.

Berolini Cl. ZUCKERT materiam medicam b. LOESECKII recudendam curauit.

Magistratus, qui *Insulae* praees, edictum die 14 octobris 1772 in salutem merforum promulgauit, quod cum aliis huius rei institutis, a nobis quoque partim commemoratis *), conuenit.

Tria loca publica cineribus praeparandis destinata sunt. Urbis chirurgus, qui clysmatico instrumento ad fumum nicotianae adhibendum instru-

ctus

*) v. comm. nostr. Vol. XVI. p. 147.

Etus est, quorsum arcessitur, praesto esse debet. Qui mersum detegit et iusto loco indicat, sex florenos accipiet. Caeterum sumtus, qui, vt magistratus voluntati fiat satis, sint impendendi, pari modo reddentur.

Hafniae xenodochium Fridericianum, nuper constitutum, iam vero denuo stabilitum, directores habet praefectum vrbis praesidem, professorem medicinae, qui haecenus erat b. FRIIS**), chirurgiae professorem, qui nunc est Cl. HENNING, vnum ex camera consiliarium, et duos senatores.

Eo inprimis in hoc nosodochio respiciatur, secundum foundationem b. Regis die 6 august. 1756, vt pauperes et aegri ciuium ante omnes ibi excipiantur, auxilio medicamentisque subleuentur; neque vero iis aditus concedatur, qui ex morbo venereo laborent. Cum quoque Regia auctoritate simul iussum sit, vt eorum, qui suis sumtibus ibi viuerent, tot reciperentur, quot loci spatium capit, etiam his omni modo consulitur. Serui porro et omnes omnino sine vlllo discrimine excipiuntur, iisque non solum medicina; sed omnia auxilia ad vitam necessaria offeruntur. Quilibet eorum quotidie vnam libram Danicam (*mark dänisch*) soluat; eos vero, qui vita lautiori vtuntur, duas pendere oportet.

Irkuzskiae in Sibiria ex auctoritate praefecti ducis A BRILL ex munificentia Augustissimae Imperatricis Russorum domicilium, aegris variolis insitis vel inferendis, variolarumque insitioni, sacrum exstructum est. Neque euentus expectationem fefellit. Etenim a die iulii vigesimo sexto 1772, vsque ad duodecimum decembris eiusdem anni, quadringentis

Zz 2

quadra-

*) v. supra p. 721.

quadraginta infantibus variolae sunt implantatae, ita, ut ne vnus quidem eorum periret. Quare et insigni industria Cl. K R A T S C H chirurgi, qui horum aegrorum curam habet, plures in dies permoti parentes liberos non ex vicinia solum, sed qui magis distant, huc ad inferendum deferunt.

Halae ad Salam quidam in arte chemica admodum clarus, tentaminibus, cum cupro institutis, ut eius virtutes et vim venenatam internam paullo clarius distingueret, eandem rem fortuito ita detexit, ut venenum hoc adeo efficax produceret, quod et in minima dosi absque ullo remedio haberet effectum lethalem. Ex nonnullis animantibus, quibuscum pericula fecit, apparuit, cadauer intra viginti et quatuor horas totum in fermentationem ita abiisse, ut omnis eiusdem massa putredinem proderet.

Heilbronnae ex bibliopolio Eckebrechtiano noua et minus sumtuosa historia naturalis cum figuris aeneis proditura est. Quinque sectionibus primo animalia quadrupeda, dein aues, rursus insecta, animalia repentia, sicuti et ranae, bufones, lacertae cet. tum pisces et alia animalia marina et postremo arbores et frutices oeconomice potissimum absolui dicuntur.

Explicatio, ibi, vbi quadrupeda tractantur, ex opere Buffoniano et Daubentoniano *) repetetur ita, ut superflua omittantur, necessaria vero et vtilia feruentur : observationes insimul atque annotationes reliquorum Auctorum aptae et vtilis non praetermittentur.

Figurae ad instar earum, quae a M E R I A N operi Ions-toniano sunt annexae, aeri incidentur, vbi
vero


*) v. comm. nostr. Vol. XVII. p. 540.

vero naturae non respondent, emendandae, et nouis tabulis animalia, Cl. IONSTONO incognita, delinenda sunt.

Quaelibet sectio thalero vno et dimidio constabit; praenumerando autem vno tantum thalero. Iam prima sectio cum viginti tabulis in folio prodit, et altera ad festum paschatos subsequutura dicitur.

In officina libraria Gleditschiana Lipsiae iam olim editae prodierunt 1773. IACOBI THEODORI KLEINII descriptiones tubulorum marinarum, in quorum censum relati sunt lapides, caudae, cancri GESNERI, et his similes belemnitae, eorumque alueoli secundum dispositionem musei Kleiniani: addita est dissertatio epistolaris de pilis marinis. Cum decem tabulis aeneis Gedani et Lipsiae. 4.

Prostant et alia in hac officina scripta Kleiniana, vt historia piscium, echinodermata, stemmata auium, lapides figurati etc. quorum mentionem autem hic solummodo facere possumus.



XIX.

Continuatio indicis scriptorum physico medicorum, quae anno 1770 prodierunt.

SANCTORIUS SANCTORIUS de medicina statica aphorismi. Commentaria, notasque addidit ANNA CAROL. LORRY. Paris. 12.

MICHAEL SARCONI Med. Doct. und obersten Spitalarztes bey dem Schweitzer Regiment von Fauch in Neapel, Geschichte der Kranckheiten, die durch das gantze Jahr 1764 in Neapel sind beobachtet worden. Erster Theil. Aus dem Italiänischen übersezet durch D. IOHANN THEODOR SCHMID VON BELLIKON. Zürich. 8. mai.

Nosologie méthodique dans la quelle les maladies sont rangées par classe, suivant le systême de M. SYDENHAM et l'ordre des botanistes. Traduit du latin de M. SAUVAGE; avec une table alphabétique et raisonnée de matières et de maladies, par M. NICOLS. Tom. I. II. III. à Paris. 8. min.

La pratique du iardinage par M. l'Abbé ROBERT SCHABOL, redigée après sa mort par M. D. Vol. I. II. ibid. 12.

Eiusd. dictionnaire pour la theorie et la pratique du iardinage et de l'agriculture. ib. 8.

JACOB. CHRIST. SCHAEFFER *Empfehlung, Beschreibung und erweiterter Gebrauch des so genannten und zur Erspahrung des Holtzes höchst vortheilhaften Backofens. Nebst fünf Kupfertafeln. Regensb. 4.*

Eiusd. fungorum, qui in Bauaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur, icones. Tom. III. ib. 4.

SAMUEL FRIDERIC. SCHEFFEL spec. inaug. sistens de fetu, natibus in partu prodeunte, observationes et analecta. Gotting. 4.

CAROL. LEBERECHE SCHEFFLERS *Abhandlung von der Gesundheit der Bergleute.* Chemnitz. 8.

GODOFR. WILH. SCHILLING *diatribe de morbo, in Europa paene ignoto, quem Americani vocant Iaws.* Ultrai. ad Rhen. 8.

SALOMON SCHINZ *diff. de stanno eius miscelae cum plumbo in re oeconomica vsu.* Tigur. 4.

ADAM GOTTLOB SCHIRACHS *Pastoris zu Kleinbautzen ausführliche Erläuterung der unschätzbaren Kunst iunge Bierenschwärme oder Ableger zu erziehen. Nebst einer natürlichen Geschichte der Bienenköniginn oder Weyselerzeugung und deren wichtigen Einflüsse in die Oekonomie der Bienen, nach neuen genauen Beobachtungen und physikalischen Erfahrungen.* Budissin. 8.

Versuche mit den Mutterkorn von D. THEOD. AUGUST SCHLEGERN. *Cassel.* 4.

De phascò observationes, quibus hoc genus muscorum vindicatur atque illustratur. Auctore IOH. CHRIST. DAN. SCHREBERO. *Lips.* 4. c. tab. aen.

PHIL. GEORG. SCHROEDER *diff. inaug. circa variolarum distributionem, inprimis ratione februm, cum iis coniunctarum, quaedam analecta Resp. Isaac Daniel Fellingner.* Gotting. 4.

Eiusd. diff. inaug. de viribus naturae debilioribus, in februm decursu recte aestimandis, iisque accommodanda medendi ratione, Resp. Paul Henr. Weis. ib. 4.

IO. FRIEDR. SCHÜTZENS *gründliche Anweisung zur Hebammenkunst.* Hildburgshausen. 8. m. K.

MARTIN WILH. SCHWENKE *Breef an den Heeren EDUARD SANDIFORT behelzende eenige Aanmerkinge over het getal en het ouderdom der gestorvenen aan de Kinderpokies over*

derzelven inenting en de behandeling der natuurlyke ziekte. Te Haag. 8.

10. ANTON. SCOPOLI *Bemerckungen aus der Naturgeschichte. Erstes Jahr, welches die Vögel seines eigenen Cabinets und zugleich einige seltene, die er in dem Kayserlichen Thiergarten und in der Sammlung des Grafen v. THURN gesehen, beschreibet. Aus dem Lateinischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von FRIEDR. CHRIST. GÜNTHER. Leipz. 8.*

Eiusd. annus quartus historico naturalis. Lipf. 8. (Hic liber observationes ex historia naturali et oeconomia continet).

10. ANDREAS VON SEGNER *Einleitung in die Naturlehre. Dritte und verbesserte Auflage. Halle. 8.*

CHRIST. GOTTLIEB SELLE *diff. inaug. continens methodi febrium naturalis rudimenta. Halae. 4.*

CHRIST. GOTTLIEB SEMMLERS *astronomische Beschreibung und Ausrechnung des Cometen von 1769, samt einer mathematischen und philosophischen Schöpfungshistorie der gantzen Welt, zum Beweiß, daß unsre Erde nicht aus einen Cometen geschaffen sey, auch beygefügeter Zeichnung der Cometenbahn und einem Register. Halle. 8.*

IOH. CHRIST. SENCKENBERG *Stiftungsbriefe zum Besten der Arzneykunst und Armenpflege, samt Nachricht wegen eines zu unternehmenden Bürger und Beysaßen Hospitals zum Behufe der Stadt Frankfurth. Nehst Vorbericht von RENAT. LEOPOLD CHRIST. CARL Freyherrn VON SENCKENBERG mit Beylagen und zwey Kupfertafeln. Franckf. am Mayn. fol.*

Traité de l'électricité par M. SIGAUD DE LA FOND Démonstrateur de physique expérimentale

tale de la société royale de Montpeiller. à Paris. 12.

ION. SIDREN diff. inaug. de ischiade. Resp. Carol. Petr. Thunberg. Vpsal. 4.

Eiusd. diff. inaug. de partu ferotino. Resp. et Auct. Henr. Gahn. ib. 4.

IOH. ESAIAS SILBERSCHLAGS *Sendreiben über das am 18ten des Jenners im Jahre 1770 zu Berlin beobachtete Nordlicht an seinen Bruder GEORG. CHPH. SILBERSCHLAG, Pastor an der Peterskirche in Stendal. Mit Kupfern. Berlin. 4.*

IO. IAC. SPIELMANN diff. inaug. sistens olerum Argentoratensium fasciculum alterum. Argentorat. 4.

D. SOLEILHET Med. Doct. Monspeliensis epistola ad A. ROUX circa annotationes nouae pulsum doctrinae, quas nuper ANTON DE HAEN publici iuris fecit, ex gallica in latinam linguam versa cum adiuncta praefatione IOSEPHI HÜTTENBACHER Med. Doct. Viennens. Vienn. 8.

Eloge de la fontaine minérale de l' Epervière à une lieue de la ville d' Angers; par M. DE LA SORINIERE. à Paris. 12.

Traité de sels; dans lequel on démontre qu' ils sont composées d' une terre subtile intimement combinée avec de l' eau. Par M. GEOR. ERNEST. STAHL. Traduit de l' Allemand. à Paris. 12.

GEORG. WILHELM STEIN, *der Arzneygelahrheit Doctors, der Arzney, Wundarzney, und Entbindungskunst Professors am Collegio Carolino, theoretische Anleitung zur Geburtshülfe. Cassel. 8.*

GEORG CONRAD STOCKHAUSENS, *der Weltweisheit und beyder Rechte Doctors, Beyträge zur Rechtsgelahrheit, Oeconomie, Policey und Cammer-*

wissenschaft, wie auch zur Naturgeschichte besonders von Hessen. Des ersten Bandes zweytes Stück. Franckf. am Mayn. 8. (Hoc opus anno 1769 inceptum ita continuabitur, vt per tres menses vna pars vulgetur, quarum quatuor volumen vnum sistunt).

Beschryvinge der waanschappen teeldeelen en waterwegen in een man, en een wercktuig dienende den pis op te vangen. By IAN HENDRIK STOLTE Med. Doct. Zwolle. 8. mai. c. f.

Dictionnaire des prognostics ou l'art, de prévoir les bons ou mauvais événemens dans les maladies. Par M. D. T. Doct. en médecine. à Paris. 12.

ERESIU^S THEOPHRASTUS von den Steinen aus den Griechischen, nebst IOHANN HILLS physicalischen und kritischen Anmerkungen, und einigen in die Naturgeschichte und Chymie einschlagenden Briefen aus dem Englischen übersetzt. Mit Anmerkungen und einer Abhandlung von der Kunst der Alten in Steine zu schneiden, vermehrt von ALBR. HEINR. BAUMGAERTNER. Nürnberg. 8.

De corpore nutritiuo et de nutritione tentamen chymico medicum. Auctore PETRO THOUVENEL. Pro prima Appollinari laurea consequenda in Augustissimo Ludovico medico Monspeliensi, mense aprili 1770 propugnatum. Piscenis. 4.

Trattato del celebre Signore Dottore S. A. D. TISSOT sopra le malati e a cuisous sogette le persone dedite a piaceri del mondo. Tradatto dal Francesce, nella favella Italiana du GIOVANNI VIGNOLI. In Lausanne. 12.

Eiusd. von den Krankheiten des Hofes und der Weltleute. Aus dem Französischen übersetzt. Bern. 8.

Eiusd. Abhandlungen über verschiedene Gegenstände der Arzneywissenschaft. Aus dem Französischen übersetzt. Leipz. 8.

S. A. D. TISSOT traité de l'épilepsie faisant le tome troisieme du traité des nerfs et des leurs maladies. à Paris. 12.

Eiusd. epistolae medico practicae auctae et emendatae. Laufann. 12.

Eiusd. essai sur les maladies des gens du monde. ib. 8.

Della vera influenza degli astri nelli stagioni et mutazioni di tempo saggio meteorologico fondato sopra lunghe osservazioni. Auctore IOSEPHO TOALDO. In Padua. 4.

The present state of midwifery in Paris with a theory of the cause and mechanism of labour. By Lond. A. TOLVER. 8.

IO. ERHARD TRAMPPEL *Beschreibung des Bades zu Meinberg in der Grafschaft Lippe.* Lemgo. 8.

Mémoires et observations de chirurgie par M. TRÉCOURT. à Bouillon et à Paris. 12.

CHRIST. IAC. TREW *Abhandlung von einigen Verschiedenheiten, welche an dem Menschen vor und nach seiner Geburth wahrgenommen werden und denen dabey sich äusserden Spuren der Allmacht und Weisheit Gottes. Aus dem Lateinischen übersetzt und mit einigen neuen Anmerkungen des seeligen Herrn Verfassers vermehrt.* Nürnberg. 4. m. K.

* * DE TREYTORRENT *zwey medicinische Tractate von dem Daseyn Gottes aus der Schöpfung und Zeugung des Menschen und von den Krankheiten des weiblichen Geschlechts.* Lüneburg. 8.

DAN. GUILIELM. TRILLER *diff. inaug. de morbis pubertate solutis.* Resp. Daniel Gotthelf Berthold. Vitemb. 4.

Eiusd. *diff. inaug. de fordidis et lascivis remediis antidyntericis vitandis.* Resp. Immanuel Benedict. Funk. ib. 4.

Die Pflicht eines Wirthschaftsbeamten, wirthschaftlich und nach der Polickey betrachtet und entworfen von

IOH.

IOH. IOSEPH TENKA. *Erster Theil. Frankfurt und Leipz.* 8.

FRANC. XAVER. CASP. TRZEBICZKY diff. inaug. de irritabilitate et sensibilitate partium corporis animalis. Prag. 8. (fine anno)

H. E. VANDERSTADT tractatus de salubritate febris. Parisiis. 8.

Dissertation on a new antivenereal vegetable remedy, intitled M. DE VELNOS antivenereal syrup. Translated from the French. Lond. 8.

Nouveaux secours pour les corps arrêtés dans l'oesophage, ou description de quelques instrumens plus propres, qu' aucun des anciens moiens à retirer ces corps par la bouche etc. inuentés par M. VENEL. à Lausanne. 12.

H. VINK lessen over de herkaauwing der runderen en der woedende veeziekte. Te Rotterdam. 8. mai.

FULGENTII VITMAN, Presbyteri Prof. botanices in Ticinensi academia, de medicatis herbarum facultatibus liber. Faenza. 8. Vol. I.

RUDOLPH. AUGUSTIN. VOGEL *neue medizinische Bibliothek. Des achten Bandes zweytes Stück.* Göttingen. 8.

Eiusd. diff. inaug. de chirurgia medicinae opem flagitante. Resp. Leopold. Godofr. Oehme. ib. 4.

Eiusd. diff. inaug. de lenteria. Resp. Carol. Frider. Biel. ib. 4.

Eiusd. diff. inaug. sistens theses medicas. Resp. Ioh. Henr. Stutzer. ib. 4.

IO. AUG. VNZERS *medizinisches Handbuch nach den Grundsätzen seiner medicinischen Wochenschrift der Arzt von neuen ausgearbeitet. Erster und zweyter Theil. Hamburg und Lüneburg.* 8. mai.

IOS. WALKER diff. inaug. de aqua sulphurea Harrowgatensi. Edimburgh. 4.

10. GOTTSCHALK WALLERIVS *Anfangsgründe der Metallurgie, besonders der chymischen. Aus dem Lateinischen übersetzt. Leipz. 8.*

FERDINAND WARNERS *vollständige und deutliche Beschreibung der Gicht. Aus dem Englischen übersetzt. ib. 8.*

10. WARREN diff. inaug. de cortice Peruuiano. Edimburghi. 4.

1. I. WEBST medicina expulsa, seu systema doctrinae sphygmicæ. Vindob. 8.

Plantas cryptogamicas floræ Gottingensis collegit et descripsit FRIDERIC. GUILIELM. WEISS, Med. Doct. Gotting. 8.

FRID. AUG. WEIZ *vollständige Auszüge aus den besten chirurgischen Disputen aller Akademien nebst Anzeigen der neuesten chirurgischen Bücher und einem Anhangе chirurgischer Neuigkeiten. Zweyter Band. Leipz. und Budissin. 8.*

Die Vortheile, welche der Staat durch die Einführung des Blatterbelzen erlangt, aus Staatsgründen betrachtet von EHRH. FRIEDR. WEINLAND. Zelle. 8.

The vniversal botanist and nurseryman. Containing descriptions of the species and varieties of all the trees, shrubs, herbs, flowers and fruits, natives and exotics and present cultivated in the European nurseries, Greenhouses and stoves, or described by modern botanists; arranged according to the Linnaean system with their Names in English. To which are added a copious botanical glossary several vselful catalogues and Indexes in four volum. By RICH. WESTON. Esq. Lond. 8.

Eiusd. botanicus vniuersalis et hortulanus exhibens descriptiones specierum et varietatum arborum, fruticum, herbarum, florum et fructuum indigenorum et exoticorum per totum orbem, seu cultorum in hortis et viridariis Europæis, siue descri-

descriptorum a botanicis hodiernis, secundum systema magni LINNAEI digestorum. Cum nominibus anglice redditis, quibus addendi sunt indices, catalogi multi vtilis et lexicon botanicum copiosum. Tabulis aeneis illustratis Tomis quatuor. Londin. 8. (*Volumen primum huius operis prodit 1770.*)

Cases in surgery with remarks. Part the first. By CHARLES WHITE F. R. S. surgeon the manchester infirmary. To which is added an essay on the ligature of arteries. By I. AIKIN surgeon. Lond. 8.

10. CHRIST. WIEGLEBS *Apotheckers in Langensalza fortgesetzte kleine chymische Abhandlungen. Langensalza. 8.*

Eiusd. *Vertheidigung der Meyerischen Lehre vom acido pingui gegen verschiedene darwider gemachte Einwürfe. Altenburg. 8.*

Beytrag zur Pockengeschichte von HEINR. AUGUST WRISBERG. Erster Theil. Göttingen. 4. mai.

A cour of experimental agriculture: containing an exact register of all the business transacted during five years. The whole stated in two thousand original experiments, By ARTHUR YOUNG. Vol. I. II. III. IV. Lond. 4.

Sopra lo scorbuto dissertazione del Signor Dottor GIOVANNI VERARDO ZEVIANI, coronata dalla reale academia delle scienze e di belle lettere di Mantova. In Verona 4.

10. FRIEDR. ZÜCKERTS *physicalische diätetische Abhandlung von der Luft und Witterung und der davon abhängenden Gesundheit der Menschen. Berlin. 8.*

Contenta in hac parte.

	Pag.
I Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandſche maatschappye der wee- tenſchappen te Haarlem XII. Deel	579
II THEDENS <i>neue Bemerkungen und Erfahrungen zur Bereicherung der Wundarztneykunft und Medicin</i>	604
III LOBSTEIN diff. de valuula EUSTA- CHII	616
IV DIOBOLDT diff. inaug. de foramine ouali	618
V SCOPOLI Flora Carniolica T. I et II.	619
VI Philosophical Tranſactions Vol. LIX. for the year 1769	641
VII Pharmacopoea Heluetica in duas partes diuiſa	658
VIII Pharmacopoea Danica	661
IX Traité des maladies des yeux etc. Par M. GENDRON	662
X TRALLES ad Cl. LUDWIG diſqui- ſitionem de vi opii cardiaca reſponſio	670
XI STRACK obſervationes medicinales de colica pictonum maximeque ob arthritidem	674
XII Noui commentarii Academiae ſcientia- rum Imperialis Petropolitanae. Tom. XIII. pro anno 1768	679
XIII MECKEL noua experimenta et obſer- uationes de finibus venarum ac vaſo- rum lymphaticorum etc.	685

		Pag.
XIV	MOEHSEN <i>Verzeichniß einer Sammlung von Bildnissen gröſtentheils berühmter Aerzte etc.</i>	690
XV	WALCHII antiquitates medicae selectae	705
XVI	BEUTH <i>etwas von Fiebern. Erſter und Zweyter Abſchnitt</i>	710
XVII	HULLESHEIM gemellarum infantum, abdominibus connatarum, brevis historia etc.	714
XVIII	Noua phyſico medica	716
XIX	Continuatio indicis ſcriptorum phyſico medicorum, quae anno 1770 prodierunt	737



I N D E X.

A.

- A**bdominalium viscerum mirus cum capite consensus 451. situm accurate notandi necessitas 288. inflammatio inopinata peripneumoniā secuta 284
- Abdominis vulnus sanatum 208
- Abilgaard, D. scholae veterinariae Hafniensi praeest 362
- Aboenses incolae vid. *Oboenses*.
- Abortus cura 245
- Abscessus interni, eorum cura 429. hepatis, eos tractandi ratio 242. 244. humeri, ex quo acus tres, deglutitae antea, extractae sunt 642 seq. intestinorum sanatus 200. mammae post vehementem inflammationem 206 sq. substantiae cerebri 201
- Absynthioides, planta 248
- Acajou, arbor 250
- Accipitrum species 513
- Aceti abusus in variolis 417 sq. pomorum sylvestrium vsus in lue bouina 547
- Acidi tartari combinatio cum antimonio, de ea experimenta 96
- Acidum pingue in calce viua negatur 482 sqq. 492 seq. affirmatur 485 sqq. 489 sqq. de eo tentamina chemica 494
- Aconiti vsus et effectus 535. Lycoctoni vsus 42
- Acus tres deglutitae et ex humero suppuratione expulsae 642 seq. in corde ouis re-
perta 460
- Acutis morbis medendi methodus Hippocratica 280 seq.
- Adams, Londini mortuus 545
- Admiralis, Io. iconum anatomicarum praestantia 700 seq.
- Adyseton, plantarum genus 626
- Aegiphila Martinicensis, plantae genus 298
- Aer, ut causa sanitatis et morborum 124. eius differentia et effectus 125. phaenomenorum in corporum combustione explicatio 465. per metallifodinas circulationis vsus, eamque obtinendi media 90 seqq. qualitatis noxiae causae in nosocomiis 255 sqq. in carceribus 257. eam corrigendi remedia 258. fixi absentia in calce viua experimentis probatur 482 seqq. 492 sq. negatur 485 seqq. fixi in corpore humano effectuum explicationi praemium expositum 537
- Aesculi hippocastani vsus multiplex 640
- Aethiopis mineralis vsus in variolosis verminosis 414. vis variolosum miasma corrigendi ibid.
- Agaricorum discrimina 621
- Airae, graminum generis character 622 seq.
- Albiniani operis anatomici et iconum diiudicatio 698
- Alburni arborum structura 309. 315

- Alcali fixum et minerale ex cineribus plantarum, de eo experimenta 79. volatile regni mineralis 66
- Alimentorum per oesophagum impediti transitus causae et diagnosis 262 sqq. 266 sq. 273
- Alsiue viscosa, planta 445
- Alui obstructio difficilis ex fecum duritie 396
- Alumen, quid? 469. muriaticum ibid. Romanum, eius ad Tolfam praeparatio 66 seq.
- Aluminosae fodinae ad Tolfam origo 67
- Ammodenia, plantae genus 45
- Ammoniacy salis, Indici natiui et factitii praeparatio, differentia et vsus 479
- Amphibiorum systema vasorum lymphaticorum explicatum 650 seq.
- Amputatio membrorum minus necessaria 245. eius iustum tempus, locus et modus 590 seq. humeri in articulo 219. 645. pedis paulo supra malleolos nova methodus 398.
- Amstelodamensis societatis meritos vitae restituendi vltiora conamina 541
- Anatomiae historia, praestantia et necessitas 692 seq. vsus ad artes ibid.
- Anatomicae observationes 335. picturae et icones, earum historia vsus et praestantia diiudicata 693 seqq. difficultas 697
- Anatomico practicae observationes 138. 215. 238 sq. 244. 269 sqq. 284 sqq. 398. 400. 404. 406. 412. 597
- Ancyloblephari curatio 664
- Andromedae, plantae vsus 41
- Androsaces septentrionalis vsus 41
- Anemones nemorosae vsus notius 42
- Anevrysmatis distinctio et ortus 31. curatio per fascias 605 sq. arteriae temporalis curatio 31. varicosi observatio 408
- Angina, in ea remedia 615. familiae cuidam epidemica 204. inflammatoria 712
- Angliae Rex ordinem mineruae constitutus 357
- Ani fistulam curandi instrumentum 33
- Animalculorum minimorum in infusis vegetabilium repertiundorum incrementum 648
- Animalis victus principium nutriendi diuersum 500 seq.
- Animalium variorum calor, de eo experimenta 680 seqq.
- Antennarum in insectis differentia et utilitas 585 sq.
- Antimonii crudi vsus in colicis pictonum 675. 677. combinatio cum acido tartari, de ea experimenta 96
- Antliae hydraulicae emendatae 74. pneumaticae nouum genus 4
- Apargia, plantarum genus 628
- Aphthae, in pudendis 449. dysenteriae accedentes 434
- Apocyni syriaci culturae vsus 464
- Aquae renisus, de eo experimenta 85. in glaciem abeuntis figurae et formationis experimentis probata 12 seq.
- riuuli l'Yvette prope Lutetias

- tias Parisiorum salubritas 70.
 frigidae effectus in morbis
 chronicis et acutis 203. in
 affectu hysterico 205. vsus
 in herniis incarceratis 610.
 vsus externus et internus in
 variis morbis 612 seq. 615.
 calcis vsus et effectus in cal-
 culosis 282. marinae com-
 minutio in Suecia 16 sq. 18.
 septentrionalis orae Belgicae
 analysis chemica 468 seqq.
 partes constituentes 470. vir-
 tus medica, in quo consistat
 ibid. vsus 471. splendoris
 causae 78. splendor a putre-
 factione substantiarum ani-
 malium 656 sq. ophthalmi-
 cae Dacquin praeparatio 666.
 vulnerariae s. sclopetariae
 praeparatio 606. vsus mul-
 tiplex ib. seq. 615. aquarum
 mineralium partes consti-
 tuentes 99. eas deregendi
 methodus quintuplex 100.
 ad Abbatiam des Fontenelles
 in Pictavia examen chemi-
 cum 80. totius Europae con-
 spectus s. dispositio systema-
 tica 100 sqq.
- Aquilae volatus altitudo 507.
 oua bina 510. species va-
 riae 511
- Arachis Linn. plantae, seminum-
 que in America cultura et
 oleum expressum 654
- Aranei maioris vsus in febribus
 intermittentibus 428
- Arbor *sucrier*, seu bois à cochon
 dicta 248. *raisinier* ib.
- Arborum corticis exterioris
 structura et vsus 308. cortex
 interior 309. 315. albur-
 num ibid. ligni structura
 310. coronae s. circuli pro-
 pagationis structura ib. me-
 dullae structura 311. vaso-
 rum differentia et structura
 312 sq. 316. incrementi ra-
 tio 314 sq. 316
- Arenae magneticae origo
 275 seq.
- Argillae analysis 459
- Arsenici disquisitioni praemium
 expositum 355. vsus exter-
 nus in vlceribus phagedae-
 nicis 249
- Arteriarum haemorrhagias sine
 ligatura sistendi modus 607 sq.
 minimarum exhalantium tri-
 plex species 126 seq. arte-
 ria intercostalis vid. *Interco-*
stalis.
- Arthritica materia vaga, vt
 causa colicae pictonum 675.
 eius signa 676 seqq. diffe-
 rentia a materia podagrica
 679
- Articulorum ligamenti capsula-
 ris incisio 608 seq.
- Asari Europaei structura sexua-
 lis 637 seq.
- Ascites, de eius curatione re-
 gulae 395 seq.
- Asclepiadarum historia 706
- Asclepiadis Syriacae Linn. cul-
 turae vsus 464
- Asellii operis de vasis lacteis
 historia 700
- Asperulae tinctoriae varietas 49
- Astragali species 52
- Atrabiliariae constitutionis na-
 tura et curatio 436 seqq.
- Atraphaxis spinosa, planta 48
- Atrophiae infantum distinctio
 et curatio 423
- Aaa 2 Attagen,

- Attagen, auis, eius species** 522 seq.
Atti dell' Academia delle scienze di Siena, detta di Fisiocritici. Tom. III. 134
Autumnalium morborum natura et sedes 425
Auditus laesionum consensus cum abdomine 453
Auenae species nouae pilosae character 632
Auium natura in vniuersum notata 507 seqq. **visus** ibid. **auditus et vox** 507 seq. **longaeuitatis causa** 508. **gustus et olfactus dubius** 508 sq. **tactus** 509. **caloris gradus** 681. **specierum numerus et varietas insignis** 505. **icones** 518. 525. **pictarum opus indicatur** 505. **pennarum vsus et differentia** 509. **amoris sensus** ib. seq. **partes generationis** 510. **aquaticarum circa caudam glandularum vsus** 509. **rapacium diurnarum natura et character** 510. **ordines et species** 511 seqq. **nocturnarum natura et character** 515. **haud volantium, sed in terra currentium natura** 516 seqq.
Auripigmenti sulphuris correcti vsus in ophthalmia seroso catarrhali 318 seq.
Aurium cerumen vid. Cerumen.
Axyris, plantae genus emendatum 42 seq. **ceratoides** 42. **amaranthoides** 43. **hybrida** ibid. **prostrata** ib.
B.
Baier, Ferd. Iac. se contulit Onoldum, ibidem consiliarius aulicus factus est 728
Baldinger, Ern. Godofr. prof. med. et affessor Gotting 542. **societatis principalis Hassio-Darmstadiensis socius** ibid.
Balneorum vsus in colica pictorum 675. **in tetano infantum** 209. **in variolis observationibus probatus** 214 sq. **in variolis noxius** 416. **frigidorum vsus in affectu hysterico** 205. **in hydrophobia** 206. **repidorum vsus in affectu hypochondriaco** 205. **in febre tertiana duplicata maligna** 227
Balsamicorum abusus in curatibidorum 400
Balsamum arboris Sucrier 224. 248. *del-Maria* 250
Barnades, Mignel obiit 544
Batigne obiit 721
Battal, ab acad. reg. chirurg. Parisina praemium accepit 353
Begonia obliqua, planta 300
Bermudianae character botanicus 329
Bernae edictum vulgatum de auertenda lue bovina 362
Berolinensis acad. reg. scient. thes. et praem. ad ann. 1773. 355. 718
Betonicae Sibirienfis Walth. vsus 40
Beureria succulenta, planta 298
Beuth, G. I. etwas von Fiebern erster und zweyter Abschnitt 710
Biceps musculus, vid. Musculus.
Biliosae constitutionis natura et curatio 434 seq. **febres** vid. *Febres.*
Bilis,

- Bilis, de ea experimenta chemica 84. ex hepate resorptio declarata 688
 Bistortae varietas et usus 39. 47
 Blackiana sententia de aëre fixo respectu calcis defensa 481 seqq. 492 seq. refutata 484 seqq.
 Blakrie, Alexander, obiit 358
 Boerhaavia caribaea, planta 305 seq.
 Bolten, Ioach. Frid. epist. de nouo quodam zoophytorum genere 466
 Bonasa, auis, eius species 522 seqq.
 Bonn, Andr. anat. et chir. prof. Amstelodam. 542
 Borax, de eo experimenta chemica 73. 322. ei similes crystalli ex tincalo 493. natiuus, eius cum sale ammoniaco vnus idemque ortus 479
 Borlase, Guil. obiit 544
 Botanicae obseruationes 298 seqq. 622 seqq. 631. seqq. 635 seqq. botanicarum iconum artifices 701. 703
 Boucher, ab acad. reg. chirurg. Parisina praemium accepit 353
 Boum recens mactatorum vapor morbosus 72. morbus contagiosus quid? 275 seq. eum arcendi vel eradicandi methodus 276 seq. 362. in eo remedium 547. luis in Belgio a. 1769. grassatae historia 27. symptomata ibid. extispicia 28. prognosis 29. diagnosi et curatio 29. luis seu pestis inoculatio refutata 30
 Bracti, laruarum genus 325. eorum species 326
 Britisch Zoology. Huius versio latina et germanica indicatur 546
 Brizae, plantae glumae et spiculae 304
 Bromi character botanicus 623. polymorphi character 632
 Bronchocele puluere testarum calcinatarum dissipata 216
 Brutorum morbus contagiosus verminosus 228
 Bruxellensis acad. scient. theses et praem. ad ann. 1772. 152 seq. est Caesareo regia scientiarum elegantiorum litterarum et bellarum artium designata 716
 Bryanthus, plantae genus 45
 Bryoniae notae genericae 638
 Bubo, auium genus 516. eius species ibid. natura 515
 Bubonoccele cum symptomatibus insolitis 398
 Bucholz, Wilh. Heinr. Sebast. *Chymische Versuche über das Meyerische acidum pingue* 494
 Buffalorum crania permagna in Siberia reperta 683
 Buffoni ornithologiae Tom. I. et II. 503. eius versio germanica 519
 Burdigalensis acad. reg. scient. thes. et praem. ad ann. 1777. 152
 Büttner, Chph. Gottlieb. *Seltne Wahrnehmung eines an der Zunge seit 24 Jahren aus dem Munde hervorgehangenen Fleischgewächses* 350
 Buteones, auium species 513
 Butyrum,

Butyrum, de eius praeparatione regulae 6. volatile nucis myristicae 472

C.

Cachexiae species, *mal d'estomac* dicta 237. cachexia leucophlegmatica scorbutica cum debilitate nervosa et fistula intestini recti in vaginam vteri 715

Caesarea operatio, de ea monitum 348. quando necessaria 5. feliciter peracta 216. eius modus 401 sq. de ea casus 401

Calcareorum lapidum efflorescentia salina 65. destillatio 482 sq. 485. igni solari expositio 489. 492. 495

Calcinatorum metallorum ponderis incrementi causae 463 seq.

Calculus, eius extractionem in lithotomia differendi utilitas 460 seq. necessitas 461. in intestino duodeno repertus 244. vesicae urinae adhaerens, eius signum ibid. calculus extra pelvim nephritidi seruit 713

Calendarii artuum causa 611

Calli ossium ortus 645. in grauida post editum partum formatio 410

Calomel, eius usus in morbo ischiadico 391

Calor animalium, de eo experimenta 680 seqq. eius gradus, quos homines et animalia ferre possint 682

Calx viua, de ea experimenta 482. 485 sq. 489. 492. 495.

eius acidum pingue negatur 482 sqq. affirmatur 485 sqq. in ea aeris fixi absentia probatur 482 sqq. 492 sq. negatur 485 sqq. eius caustica indoles unde? 483. aqua vid. *Aqua*.

Campanula calicibus e tergo lamellis quinque notatis, pedunculis unifloris 52. liliifolia, eius radices usus 40

Camper, Petr. ab acad. reg. scient. Tolosana praemium accepit 357. 537. Aanmerkingen over de inenting der Kinderziekte, met waarneemingen bevestigd 59

Camphorae artificialis praeparatio 495. ex mentha piperitide parandae modus 476. Sumatranae et Iaponicae differentia 477. in India collectionis modus et species 477. usus in febribus putridis 462

Cancris mammarum cura, de ea monita 615. aperti casus et curatio 616. singularis casus et curatio 122 sq. 214. horrendi aperti et exulcerati in facie casus 320 sq.

Canis rabidi morsus vid. *Rabies*.

Cannabis semen infusi animalcula 648 seq. sal indissolubile 649

Caoutchac vid. *Resina Cayanensis*.

Caput, eius cum visceribus abdominis mirum commercium 451. morborum origo ex abdomine ib. dolorum sympathicorum causae in abdomine latentes 452. vulnerrum

- rum obseruationes 609. fetus, quomodo ut plurimum in partu aperturam peluis intret? 347
- Carbonum ignis violenti actio ad fusionem terrarum, lapidum et calcis metallica 81
- Carcerum noxiae qualitatis aeris causae 257. correctio 258
- Carcinomatici tumoris in collo extirpatio 463
- Cardialgia ab inflammatione hepatis 70
- Carniolica flora 619
- Cartilaginum ossis pubis in partu diductio affirmata 421
- Caruncularum in vrethra natura et curatio 243
- Cassellis Hassorum Carolinae illustris professores medicinae 149
- Casserii tabularum anatomicarum artifices et praestantia 694 seq.
- Castanea Angliae non indigena 644
- Castellani, Io. Mariae merita in anatomen 695
- Castrationis modus 607 sq.
- Casuarii avis descr. 517. oua ib.
- Catalepsis, quid sit? 450. 513
- Catamenia vid. *Menstruus fluxus*.
- Cataputiae granorum vsus 659
- Cataracta, eius differentia et maturitatis signa 668. operationis per depressionem modus et vsus ib. extractio depressione praestantior, de ea monita ib. seq. radiata depositione sanata 459 seq.
- Catarrhalis constitutionis natura, causae et curatio 429 seq.
- Cauticorum vsus in ischiade neruosa 129
- Cauticum in calce viua vnde? 495
- Cecropia peltata, planta 300
- Cedrus libani pini species 338 seq.
- Ceraatii semidecandri Linn. structura 637
- Cerealium recentium esus noxius 148
- Cerebri morbi sympathici ex abdomine oriundi 445. substantiae abscessus 201. et cranii defectus fetus in utero viuentis 335. tumor durus glandulosus ib. septum lucidum duplex ib.
- Cerinthae glabra, planta 632
- Cerumen aurium soluendi tentamina 399
- Chamaejasmes plantae vsus 39
- Chamaenerii nouae species 446
- Chamaepityos vsus in arthritide 659
- Chelidonii maioris vsus 640
- Chelle, Car. Franc. ab acad. scient. Rothomagensi praemium accepit 155
- Chirurgicae obseruationes 31 seqq. 605 seqq.
- Cholerae curatio 434
- Chorea St. Viti electricitate curata 601
- Chorion inuestiens membrana caduca s. decidua 345
- Choroidea oculi tunica in ea sedes visus 663
- Chyli variae mutationis ratio 499 sq.
- Cicutae vsus in tumore hepatis

- tis et lienis 394. in scrophulosis tumoribus 395. in cancro mammarum 406. in eodem dubius 615
- Cimices fugandi remedium 639
- Cimicifugae plantae character 45
- Cinchona caribaea, planta 302
- Circaea alpina, planta 631
- Claudicationis casus et causa 141
- le Clerc, ab acad. reg. chirurg. Parisina praemium accepit 353
- Clupeae cuiusdam esus laetalis 227
- Clysmaticum instrumentum ad fumum nicotianae in anum impellendum 473
- Coccionellae usus ad holoserium splendido rubore imbuendum 89
- Cochlea marina fossilis, non mutata 140
- Coeci intestini fractura singularis in aibus femineis rapacibus 514
- Coecitas ex venere nimio 213
- Coffeae usus in lethargo 245. usus et noxa 246
- Colchici radix innocua 659. oxymellis usus in hydrope 217 sq. 640
- Colette, Car. Franc. ab acad. reg. chirurg. Parisina praemium accepit 353
- Colicae arthriticae signa 676 sqq. biliosae curatio 433. huius et pictionum consensus et curatio 223 seq. pictionum causae et varia nomina 674. causa in materia arthritica vaga in ventrem delata 675. curationis exempla 675 seq. crises 678. venereae ratio 225
- Collyrium Dacquinii, eius formula 666. in leucomate 667. collyria 705
- Colon, ab acad. reg. chirurg. Parisina praemium accepit 353
- Columbarum genus et species 525
- Concharum testarum calcinatarum pulueris usus in bronchocele 216
- Conchyliorum testarum fabrica organica 75
- Contagiosorum morborum prophylaxeos et curae expositioni praemium constitutum 150
- Contrafissurarum cranii origo et causae 86 seq.
- Conuoluulus dissectus, planta 299
- Conuulsionum causae in abdomine latentes 457
- Conuulsiui morbi singularis casus 202. partus historia 318
- Coralliorum natura animalis 76
- Cordis concretio calculosa 88. palpitatio a saburra primarum viarum 203. in fetu descr. et delineationes 142
- Corona arborum seu circulus propagationis quid? 310. eius structura et usus ib. sq. 316. vasa 314
- Corporis humani eiusque artuum a variis causis ampliati vel diminuti dimensiones 9 sq.
- Corporum cohaesionis principium



pium, de eo controuersia	Currus trituratorii	2I
281 sq.	Cuticulae vna. cum vnguibus	
Corticis exterioris lignorum	periodicus secessus et rege-	
structura 308. interioris ana-	neratio singularis	652 sq.
tome et vsus	Cuvilliers de Champoyaux fa-	
309. 315	cultati med. Paris, numos do-	
Cotunnii, Dominic. de ischia-	nauit	150
de neruosa 125. de sedibus		
variolarum syntagma	D.	
411		
Coturnix, auium genus	Danica pharmacopoea	661
525	Daphnes mezerei, plantae vsus	
Crampus, quid?	38	
127	Dauci satiui radicis cataplasma-	
Cranii nimia crassities	tum vsus 399. vsus in can-	
698.	cro mammae	406
offium resonitus origo et	Deglutitionis difficilis caussa	
caussae 86 sq. vulnere ob-	singularis 139 caussae post	
seruationes	mortem detectae 597. ex	
609	pressione oesophagi ortae ob-	
Cranz, Henr. Io. Nepom. exa-	seruationes 265. 269 seqq.	
minis chemici doctrinae	lente progredientis et im-	
Meyerianae de acido pingui	peditae caussae 262 sqq. 266	
et Blackianae de aere fixo	sq. 273. diagnosis, species	
respectu calcis rectificatio	et curatio 265 sq. laesae	
484. opus de aquis mine-	curatio ope clysmatum 87.	
ralibus editurus est	ope glaciei diffractae	88
545	Deleurye, F. A. traité des ac-	
Crataegi oxyacanthae varietas	couchemens	420
49	Deliria consensualia, ex abdo-	
Crax Linn. auium genus eius-	mine oriunda	456
que species	Delphinii varietatum copia	
524	47 seq.	
Crepitula parasitica	Dentium morborum consensus	
140	cum abdomine	454
Crinium electricitas	Desportes, Io. Bapt. Renar.	
25	Pouppe vid Pouppe.	
Crises variae pulsu praenun-	Diabetes letalis casus	598
ciatae	Dictamni albi fructus	637
204	Didus ineptus, Linn. avis	518
Crurum morbus singularis le-	Diez, Io. medicus Petropolin	
talis 387. vlcera sanandi	vocatus	161
modus	Digitale in oesophago haerens	
405	extractum	210
Crystallinae lentis protuberan-	Aaa 5	
tiae caussae et curatio 669.	Digiti	
ex sede sua propulsionis mo-		
di et curatio		
ib.		
Crystallini humoris ortus		
663		
Cucumer acidum		
306		
Cuniculorum dentes incisores,		
monstrose elongati		
88		
Cupri minerarum lazurearum		
ortus 66. cupro tentamina		
funt instituta Halae ad Salam		
724		

Digiti contusi sanatio	207	Dulcamarae vsus	41
Dioboldt, Io. Mich. Diff. inaug. de foramine ouali	618	Dysenteriae curatio	240. pu- tridae curatio 433 sq.
Dionaea muscipula, planta ir- ritabilis	529. eius chara- cter	E.	
Dippelius, falso olei animalis inuentor	584. eius oleum vid. <i>Oleum</i> .	Ebuli feminum vis diuretica	659
Divionensis academiae scient. commentarii Vol. I.	457. hi- storia ib. seq. thes. et praem. ad ann. 1771. et 1774	Ebur fossile, eius origo	647 sq. 683. Sibiriae 683
Dolorum post partum causae	423. post fracturas ossium relictorum et tempestatum vi- cissitudine oriundorum caus- sa	Ecastaphyllum Brown. arbor	15
S. Dominici insulae morborum historia	220 sqq. situs, aqua- rum et aeris insalubritas vt caussa morborum putrido- rum	Elater noctilucus Cayanensis, insectum	73
	221 sq. venti 222. in- colarum differentia ib. con- stitutionum epidemiarum ab anno 1732—1747. historia 223 seqq. febres ibi gras- santes 229 seqq. morbi chro- nici 236 seqq. plantae in- digenae 247 seqq. thermae ibi scaturientes	Electrica ratio turbinis mari- ni	83
Doria, plantarum genus	628	Electricae observationes	77
Dracocephali species mutatae et definitae	50 seq.	Electricitas crinium et metal- lorum fusorum	25 sq. eius effectus in corpore humano 340. de eius applicatione regulae ib. seq. eius vsus in morbis 341 seq. in chorea S. Viti 601
le Dronte, avis	518	Elephantiasis curatio	34
Drummondi, Alexand. Monr. de febris arcendis discutien- disque commentarius	535	Elephantina ossa ad aggerem Bommelsenem reperta	592.
Drury's, D. Illustrations of na- tural History	145	in Sibiria reperta	683. in America septentrionali sub terra reperta, eorum causa et ortus 647 sq.
Drypis, planta, eius fructifica- tio	637	Elixirii pectoralis Ringelmanni formula concinnior	661 seq.
Duclos, Car. Pinot, obiit	157	Ellis, John, Directions for bring- ing over seeds and plants cet. it. de Dionaea musci- pula	526 seq.
		Embriocharum vsus in anchy- losi	609
		Embryonum et liquoris amnios pondera inter se comparata	346
		Enteroepiploceles operatio	207
		Epidemica constitutio quid?	235
		Epidemic;	

Epidemici morbi in insula Barbados a 1769. ratio et curatio 402 seq.
 Epiglottidis status morbosus 139
 Epilepsiae causa singularis 244.
 castrationi superuenientis praecauendae modus 607 sq.
 Equitationis usus in phthisi 399
 Eremita, auis 518
 Ericae cultura et usus in terra sabulosa 23. species quaedam 54
 Eriocaulum decangulare, planta 652
 Erucae arboribus infestae, earum destructionis modi expositioni praemium constitutum 152. secale vernum vastantes 24 seq. falsae pinus deuastantes 24
 Erysipelatis auctumnalis curatio 436
 Eustachiana valuula vid. *Valuula*.
 Eustachii merita et tabularum aenearum anatomicarum praestantia 694
 Extremitatum inuolutionum cum fasciis usus in variis morbis 605

F.

Faciei morborum consensus cum abdomine 453 sq. canceri aperti et exulcerati casus 320 sq.
 Falconum variae species 513 sq.
 Fasciarum extremitates inuolutionum usus in variis morbis 605. 615. de earum applicatione monita 606

Favier, ab acad. reg. chirurg. Parisina praemium accepit 353
 de Fazaras, Ioseph. Pap. a societ. artium et scient. Vlissingensi praemium accepit 538
 Fayence vid. *Porcellana vasa*.
 Febris atrabiliariae. natura et curatio 436 sqq. biliosa, Yellow Fever, vid. *Morbus Siamenfis*. biliosa in itineribus ad Indiam orientalem solennis 397. eius curatio ib. sq. epidemica maligna petechialis a. 1761 et 1762. Divioni grassata 461 seq. epidemica putrida a 1769. in insula Barbados grassata eiusque curatio 402 seq. erysipelacea gangraenosa putrida maligna sanata 198. generans, quid? 347. humoralis seu nervosae natura et curatio 430 sq. maligna Ise-naci annis 1769—1771. epidemice grassata 337. periodica singularis cum pruritu et subsequente cuticulae secessu 652 seq. semitertiana lymphatica infantum 245. tertianae duplicatae in insula S. Dominici ratio et curatio 234 seq. variolosa triplex 418. verminosae ratio 289 sq. signa 290. febris idea, definitio, causae, symptomata 710 sqq. febrium euentus 711. diuisio 712. malignitas ib.
 Febrium contagiosarum causae 535 sq. eas arcendi et discutiendi remedia 536. biliosarum natura et curatio 434

- 434 sq. catarrhalium natura et differentia 429 seq. inflammatoriarum natura et cura 428 sq. intermittentium natura et symptomata 425 seq. differentia ib. seq. prognosis 426. curatio ib. sq. putridarum natura et differentia 432 sq. curatio ib. sq. quartanarum curationis methodus 613. Londini frequentissimarum natura, origo et curatio 424
- Fellea vesicula vid. *Vesicula*.
- Femoris horrenda dilaceratio 324. articuli cum osse coarum ratio in vetula claudicante 141. colli fracturae curatio 212
- Ferri solutio in aqua simplici ope aeris fixi 651 sq.
- Festuca adscendens, planta 22
- Fetus in vtero nutritio triplex 422. ossa per anum excreta 600. humanus biceps 333. monstrosi 715
- Fetuum et liquoris amnios pondera inter se comparata 346. sexus alternantis lex II
- Ficus polycarpus 302. caribaea ib. sq.
- de Fischer, Io. Bernh. obiit 544.
- Fistulae ani curationi inseruiens instrumentum 33. eius sinus 715. lacrymalis causae et curatio 664 sq.
- Flammulae iouis vsus in morbis 532. 534
- Flatus cum sibilo per genitalia muliebria 715
- Flora Carniolica 619. Liptensis 444. Sibirica 37
- Florentiis conditae acad. agriculturae (Georgophili) thes. et praem. ad ann. 1773. 155 sq.
- Fluidorum renisus, de eo experimenta 85
- Foraminis oualis in corde descriptio anatomica 618. delineatio 142
- Forcipis anglicanae inuentio 346 sq. emendatio 347
- Formica leo, insectum 464 sq.
- Fracturarum coalitio a grauiditate impedita 410
- Francolinus, avis 522. 524
- Franklin, Beni. acad. reg. scient. Parisinae socius 357
- Frigore tacti singularis historia, laesiones et mors 198. frigoris gradus, quem homines et animalia ferre possunt, nondum definitus 682
- Friis, Christ. Lodb. obiit 721
- Frisch, Ioseph. Leopold. ab acad. reg. scient. Berolinensi praemium reportauit 355
- Frumenta ope aeris perspirantis siccandi horrea 21. eorum grana curruum ope excutiendi modus ib.
- Fulgura a loco quodam auerendi modus 359. eorum effectus in acum magneticam 593
- Fumaria filiculis ouatis compressis, caule quinquangulo 52. caule ramoso, foliis pinnatis, foliolis extremis lobatis, capsulis ouatis pendulis 53
- Fungorum discrimina 621. ortus non ex semine 459. semina, de iis experimenta 648 G.
- Galli gallinacei prolifica vis 510
- structura et patria 520
- Galli-

- Gallinacei** pulli in ventre gallinae plumis inuestiti reperi-
ti 144
- Gangraenae** ficcae casus 333 sq.
- Gaubii**, H. D. aduersariorum var-
rii argumenti liber vnus 468
- Gautierii** figurae anatomicae
diiudicatae 699
- Gedanensis** societas naturae in-
dagatorum praemium distri-
buit 356
- Gemellarum** coalitarum partus
218. 714. separatio suade-
tur vno mortuo ib.
- Gendron**, Louis Florent. Des-
hais, Traité des maladies des
Yeux Tom. I. II. 662
- Generationis** negotii explica-
tio 344 sq.
- Genitalium** partium in viro
praeternaturalis ratio 603.
deformitas cum hernia vesi-
cae vrinariae 195 seq. ictu
cultri laesarum curatio 209
- Gentiana** floribus terminalibus
diaphanis 53 seq. eius vsus
54
- Genu** tumorum caussa et cura
611
- Geranii** pratensis vsus 41
- Gignoux**. Barthol. ab acad. reg.
chirurg. Parisina praemium
accepit 353
- Glaciei** formatio et figurae ex-
perimentis descriptae 12 seq.
effectus in morbis 203. vsus
in herniis incarceratis 610
- Gladioli** noua species 305
- Glandulae** inguinalis tumor
scirrhus exscissus et per li-
gaturam destructus 319 seq.
pinealis tumor vt caussa, epi-
lepsiae 244
- Glandularum** lymphaticarum
structura explicita eiusque
vtilitas 686. saliuarium af-
fectuum consensus cum ab-
domine 454
- Glaucoma** singulare 602
- Glottidis** in submersis muta-
tio 283
- Glycirrhizae** echinatae radicum
vsus 41
- Gmelin**, Io. Georg. Flora Sibi-
rica s. historia plantarum Si-
biriae Tom. III. et IV. 37
- Gmellin**, Io. Frid. prof. extraord.
medicinae Tubingensis 712
- Gonorrhoea**, in ea specificum
640. ab immodico cereui-
fiae vsu 244
- Gothae** theatrum anatomicum
est exstructum 720
- Gottingensis** academia a Pot.
Angliae Rege instrumenta
microscopica cum camera ob-
scura dono accepit 360.
horti botanici incrementum
545. societatis reg. scient.
thes. et praem ad ann. 1775.
540
- Graminum** generum limites ex
structura determinandi 636
- de la Grange**, acad. reg. scient.
Parisinae socius 542
- Grant's**, William, enquiry into
the nature, rise and progress
of the fevers most common
in London 424
- Grasmann**, Godofr. Ludolph. a
societate oeconomica Petro-
politana praemium accepit
155
- Grauiditas**, eam diiudicandi et
explorandi modus 421. eius
terminus 55. per duodecim
mense

- menses protracta 196. vt
 caussa formationem calli of-
 fsum impediens 410. in ea
 imaginario 714
 Gummi guttae vsus innoxius
 659
 Gutta serena, de ea monita
 667 seq. eius curationis ca-
 sus 668
 Guyabara, arbor 248
- H.
- Haematopoeia, morbus, quid?
 449
 Haemorrhagias arteriosas sine
 ligatura sedandi modus
 607 sq. arteriae intercosta-
 lis sistendi modus 608
 Haemorrhoidum saccatarum cu-
 ratio 608
 de Haen, Ant. rationis meden-
 di in nosocomio practico Pars
 XIII. et XIV. 280
 Hafnienſis collegii regii medi-
 ci praemium ad ann. 1772.
 pro disquisitione morbi epi-
 demici in Dania grassantis
 161. societatis reg. scient.
 theſ. et praem. ad ann. 1773.
 354. xenodochii Frederici-
 ciani constitutio 713
 Halleriani operis anatomici di-
 iudicatio 698
 Haller, Alb. commercium lite-
 rarum editur 7
 Harlemensis societ. scient. the-
 ſes et praem. ad ann. 1774.
 354
 Hartmann, Io. Fridr. *die an-
 gewandte Electricität bey
 Krankheiten des menschlichen
 Körpers* 339
- Haubold, Geo. Gottlieb. obiit
 358
 Hectica febris triplex 426
 Hedypnois, planta, eius chara-
 cter 627
 Heluetica pharmacopoea 658
 Hemicrania vernalis natura et
 curatio 431
 Hemiplegia singularibus sym-
 ptomatibus stipata 395
 Hensler, Phil. Gabr. *Anzeige
 der hauptsächlichsten Ret-
 tungsmittel derer, die auf plötz-
 liche Unglücksfälle leblos ge-
 worden etc.* 147
 Hepar insolitae magnitudinis
 286. monstrosum in funicu-
 lo umbilicali infantis recens
 nati 317. eius vasa bilem
 resorbentia 688. abscessuum
 et tumorum tractatio 242.
 244. inflammatio chronico-
 rum morborum caussa 60 sq.
 cardialgiae falso dictae caussa
 ibid. seq. tumor sponte ru-
 ptus, ex quo 300. hydati-
 des prodierunt, et sanatus 77
 Hepatici fluxus caussa 240
 Hepatitidis symptomata 713
 Hermaphroditum verus sexus
 81. descriptiones et deline-
 ationes 143
 Herniae singularis et letalis ca-
 sus 405 seq. cum gangraena
 curatio 207 sq. vesicae vri-
 nariae umbilicalis singularis
 casus 195
 Herniarum incarceratarum cu-
 ratio 610
 Herniosos tumores tractandi
 methodus 217
 Herr-

- Herrmanni, Io. Gotthelff. obitus et memoria 160
- Hibisci sabdariffae, plantae vsus 299 seq. esculenti fructus vsus 300
- Hieracium saxatile, plantae species 303. pilosella, eius character specificus 634
- Hill's, Iohn, Construction of Timber from its early Growth 307. idem Berolinum vt Prof. botanices vocatus 542
- Hippocastani vsus multiplex 640
- Hippocraticae methodi praesentia in acutis 280 sq.
- Hippocratis operum versio noua latina promissa 361
- Hippomanes fructuum noxa 227. scobis ligni noxa 250
- Hippuris vulgaris, planta, eius structura 635 seq.
- Hirschel Leon. El. obiit 721
- Hirundines, vtrum hieme sub aquis sopitae iaceant, an ad calidiores regiones migrent? 506
- Hirundo Daurica, area temporali rubra, vropygio luteo rufescente 19
- Historia naturalis noua et minus sumtuosa editur Heilbronnae 724
- Histoire et Mémoires de l'academie royale des sciences Année 1766. 1767. 1768. 65
- Histoire et Mémoires de la société royale de Montpellier. Edit. nov. 545
- Histoire naturelle générale et particulière avec la description du cabinet du Roi. Tom. XVI. et XVII. ou Histoire naturelle des oiseaux. Tom. I. et II. 503. eius germanica versio 519
- Hocco, auium genus, eiusque species 524
- Holmiae vrbs incolarum augmentum et decrementum 3
- Holofericum ope coccionellae splendido rubore imbuendi modus 98
- Holothuria physalis Linn. animal 20
- Holothurii genus duplex 139
- Hominis sani calor, de eo experimenta 680 seq. morbose calor 682
- Horologiorum pendulorum correctioni praemium expositum 354
- Hullesheim, Io. Bernh. gemellarum infantum, abdominibus connatarum, brevis historia etc. 714
- Humectantium vsus in morbis nonnullis 196. in affectu hypochondriaco 205
- Humeri ex articulo amputatio 219. colli fracturae curatio 212. ossis caput amputatum et exfoliatum a natura restitutum 644 sq.
- Hydatides 300. ex hepatis tumore rupto 77
- Hydrocephali interni ortus, signa et cura 390. de eo observationes 392. 403
- Hydrophobia, calore solis excitata 206. eius causa singularis 460. symptomatica post sphacelum sponte sublata 319
- Hydrophthalmiae curatio ope paracenteseos 667
- Hydrops,

- Hydrops, eius distinctio 241. sanatio singularis spontanea ibid. oxymelle colchico sanandus 217 seq. nerui ischiadici 127 sq. eius curatio 129. ouarii singularis 14. pectoris faccatus 138
- Hyoſcyami vsus in morbis 535. vsus externus in inflammatione, rheumatismo et arthritide 213. nigri vsus 41
- Hypocoum erectum 49
- Hypnoticus puluis vid. *Puluis*.
- Hypochondriaci morbi natura et curatio 436 seqq. ope balneorum curatio 205
- Hypopyi operatio minus tuta et curatio 666
- Hysterici morbi natura et curatio 436 sqq. curati casus 205
- 1.
- Iacquin, Nic. Ioseph. obseruationum botanicarum iconibus illustratarum Pars II. III. IV. 298. examen chemicum doctrinae Meyerianae de acido pingui et Blackianae de aere fixo respectu calcis 481
- Ichneumon Americana, insectum 146
- Icteri partialis obseruationes 211. ex lumbrico in vesica fellea 713. ictero laborantibus primum albuginea, tandem ossa tinguntur ib.
- Ilei intestini praeternaturalis ratio 398. 400. 406. angustia et voluulus 599. ruptura letalis ex calcitracione equi 324
- Iliacae passionis letalis casus 400
- Imaginatio laesa grauidarum 713. 715
- Indica radix vid. *Radix*.
- Infantum morbi ex abusu alimentorum 614. ex infima plebe educationis disquisitioni praemium expositum 153. vitam seruandi remedium disquisitioni praemium constitutum 154. recens natorum pondus et longitudo 55 seq. a matre vna eademque editorum sexus alternantis lex 11. tussis conuulsiua vid. *Tussis*.
- Inflammatio, quam diu perdurare soleat et possit 291. intestinorum, eius effectus 599. eius duplex genus Boerhaavii 713
- Inflammatoriae constitutionis natura et cura 428 seq. angina 712
- Inguinalis glandulae tumor vid. *Glandula*.
- Inoculatio variolarum, de ea annotationes, obseruationibus firmatae 59. eius praestantia 60. aetas ei apta ib. num a recidiua liberet? negatur 61. ad eam praeparatio parum utilis 61. eius successus sine praeparatione praestantior 211. ad eam puris selectus et differentia 61. quantitas 62. incisioni locus aptus 62. instrumenta opportuna ibid. per eam communicati contagii signa incerta 62. eam subsecuta phaenomena et symptomata 63 sq.

63 sq. phaenomena quoti-
diana 601. eius vsus dubius
589. de ea obseruatio 464.
pestis bouinae, de ea dubia 30
Irkuzkiae infitioni variola-
rum dicatum aedificium ex-
structum est 723
Insecta exotica descripta et de-
lineata 145 seq. pinus de-
populantia 23 seq. eorum
anthennae vid. *Antbennae*.
Intercostalis arteriae laesae
haemorrhagiam sine ligatu-
ra sistendi modus 608. di-
laceratio cum vulnere pul-
monis sanata 208. vulnus
curatum 33
Intestinorum diuerticula seu
appendices 143. abscessus
sanatus 200. inflammationis
effectus, de eo annotatio-
nes 599. villosae tunicae fa-
brica 651. formatio in em-
bryone gallinaceo 684
Intestinum ileum vid. *Ileum*.
Johnson's, Robert Wallace,
new system of Midwifery 343
Ipomoea Eustachiana, planta
300
Irritabilitatis leges quaedam
sancitae 136 seq.
Ischiadici nerui hydrops 127 sq.
eius curatio 129
Ischiadis, morbi distinctio 126.
curatio 391. nervosae diffe-
rentia et sedes 126. caussae
ibid. seq. diagnosi 127. sta-
dia 128. curatio ib. seq.
Isenacensis agri plantae 338
Iuglans foliolis septenis, lanceo-
latis, ferratis, impari sessili
Linn. 15 seq.
Tom. XVIII. P. IV.

K.

Kadelbach, Christ. Frid. facul-
tatis med. Lipsiensis affessor
357
Kali cinerum differentia a ci-
neribus aliorum vegetabi-
lium 79
Kleinii, Iac. Theod. descri-
ptionum tubulorum marino-
rum editio noua est cura-
ta 725
Knight, mortuus 159
Kongl. Vetenskaps Acade-
miens Handlingar för Aor.
1769. Vol. XXX. 3

L.

Labium leporinum singulare fa-
natum 325
Lacrimalis fistula vid. *Fistula*.
Lacrimarium ductuum et pun-
ctorum structura in variis ani-
malibus 71. obstructionis cu-
ratio ib.
Lactis secretio et analogia cum
chylo ac vitello oui 500. se-
cretioni et resorptioni infer-
vientium vasorum connexio
explicata 687. vsus in ven-
tris fluxibus. 241
Lagophthalmi operatio inuti-
lis 664
Lagopi, auis species 522 sq.
Lanii, auium species 514
Lapides ope pulueris pyrii dif-
ficiendi methodus emendata
24. eorum fusio ope ignis
carbonum 81. calcarei vid.
Calcarei. lapidaris medicina
veterum 707
Lapis mutabilis seu oculus mun-
di 322 sq.
Bbb Lauan-

- Lauandulae foliis ouatis, saepe lobatis, vsus 40
- Laudani liquidi Sydenhami, incaute adhibiti noxa 394
- Lebelius, anat. et chir. prof. Ingolstad. 542
- Lebrun praemium reportauit a facultate medica Parisina 718
- Lens crystallina vid. *Crystallina*.
- Leontodon, planta, eius character 627
- Leonuri character botanicus 626
- Leporis pusilli descriptio 685
- Leprae scorbuticae Noruegicae caussarum et curationis expositioni praemium constitutum 541
- Leucomatis curatio 667
- Libani montis arborum genera 338
- Libellulae agri Fridrichsdaliani 324
- Lichen squamosus, quid? 635
- Liene a Minguet, planta 248
- Lienis vsus peculiaris 236. ruptura ex lapsu oborta 330. seq. tumor et ruptura 200
- Ligamentorum capsularium articulorum incisio probata 608 seq.
- Ligni arborum constructio experimentis microscopicis declarata 307 seqq. incrementi ratio 314 seq. 316. structura 310. 316. coronae seu circuli propagationis structura 310. vasorum differentia et structura 312 seq. 316. firmitatis minoris caussae 97. fossilis fodina detecta 458
- Ligustri floris et fructus fabrica 636
- Limacum capita et tentacula resecta de nouo regenerari, experimentum 87
- Linguae affectuum sympathia cum abdomine 454. sarcomatis ortus et caussae 352. extirpatio 351
- Linnaeae borealis vsus dubius 40
- Lipsiensis florum spicilegium 444 seqq.
- Liquoris, *Eau de Luce* dicti, vsus in morfu viperarum 65
- Lithanthracum examen chemicum 66. fodinarum vapores noxii 92
- Lithotomia, eius casus singularis 211. in ea calculi extractionem differendi utilitas 460 seq. necessitas 461. ei inseruiens dilatatorium 462 seq. ei inseruiantis ductoris canaliculati cystotomi, dilatatoris dicti, vsus 66
- Loasa vrens, planta 301
- Lobstein, Ioh. Frid. Diff. de valuula Eustachii 616
- Lochiorum suppressione demortuarum sectio 349
- Lonicerae ligni olei vsus 40
- Lugdunensis acad. scient. elegant. liter. et artium thes. et praem. ad ann. 1773 et 1774 538
- Lumbricus magnus in vesicula fellea 713
- Luna

Luna fixata Ludemanni quid?
477. eius vis antispasmodica
478

Luther, Ernst Adam, a societ.
naturae indagatorum Geda-
nensi praemium accepit 356

Luxati humeri repositioni inter-
uentium machinarum abu-
sus et noxa 210

Lymphae ad sanguinem redi-
tus ratio 686

Lymphatica vasa vid. *Vasa*.

M.

Machridius refutatus 281 seq.

Magnetica acus, eius declinatio
a fulgure 593. arena, quid?
eiusque origo 275 sq.

Magnetis vsus in dolore den-
tum aliisque morbis 202

le Maire, Henr. ab acad. reg.
chir. Parisina praemium ac-
cepit 353

Mal d'estomac, morbus 237. *de*
machoire 243

Mali aurei Curassauici corticum
oleum et sal aromaticus 471.
eius indoles ib. sq.

Malti decoctum vid. *Polenta*.

Mammae abscessus 206 seq.
cancer vid. *Cancer*. obstru-
ctionis et scirrhi curatio 688.
vltus curatum 214

Mammarum vasculosa structu-
ra explicata 687. eiusdem
vtilitatis ibid. tubulorum
lactiferorum papillae ana-
stomosis inter se obseruata
687

Mancanillae fructuum noxa
227

Maniae puerperarum obff. 212

Mantuanac acad. reg. scient.
theses et praem. ad ann. 1772
153 seqq.

Manus defectus in infante, cui
paruula manus in pectore ex-
creuit 596. marina, zoophy-
tum 139

Manustuprationis noxa 213

Marina aqua vid. *Aqua*.

Martini, Ferdinand. *Unterfu-*
chung der Frage: ob ausge-
tretenes Blut wieder aufge-
nommen und dem Triebe des
Herzens unterwürfig gemacht
werden könne? 259

Martini, F. W. H. versio ger-
manica ornithologiae Buffo-
niana, Vol. I. 519

Maurepasia, arbor 250

Maxilla fossilis singularis 139.
inferior sine dentibus 144.
eius spasmus infantibus fata-
lis 243. spasmus ex abdo-
mine oriundus 455. spasmii
caussa et curatio 614. largio-
ris opii dosi opè curatio
339 seq.

Maxillaris sinus vid. *Sinus*.

Meckel, Io. Frid. noua expe-
rimenta et obseruationes de
finibus venarum ac vasorum
lymphaticorum cet. 685

Medical obseruations and In-
quiries by a Society of Phy-
sicians in London. Vol. IV.
387

Medicorum celebrium imagi-
num index 690. medico
quid sit imperare apud Al-
fenum Varum 706. medicina
Bbb 2 veterum

- veterum lapidaris 707. medicorum Pyrrhonismus 708
Medullae arborum structura et
vſus 311. 315. 316
Melancholici temperamenti ſe-
des et diſquiſitio 236
Meleagris gallopauo Linn. auis
521. eius patria ibid.
Mellin, Chph. Iac. *Von dem
Reichbuſten der Kinder, wel-
cher in den Jahren 1768 und
1769 in Langenſalza herr-
ſchete* 131
Membranarum inflammationis
exempla 286 ſeq. inflamma-
tionis et doloris ratio 288 ſq.
ſenſibilitas affirmata 288
Mémoires de l'academie de Di-
jon Tom I. 457
Menſtrua, eorum fluxus origo
343. in vetula 91. anno-
rum 88
Mentha piperitis, ex ea cam-
phoram parandi modus 476
Menyngis durae ſinus ſeu re-
ceptacula 141
Mercurialis remedii peculiaris
praeparatio et vſus 239
Mercurii vſus in variolis 414.
vſus internus in lue venerea
inunctione praefantior 34.
crudi in aqua forti ſoluti
vſus in vlceribus venereis
239. cum gummi arabico
triti vſus 34. cum ſublimato
miſti et in aqua edulcorati
vſus 239. dulcis vſus in
obſtructionibus glandularum
infantium 614. praecipitati
rubri rubedo vnde? 495 ſeq.
Merſi, de iis experimenta et
obſervationes 282 ſeq. iis
medendi modus et auxilia
148. edictum in ſalutem
merſorum magiſtratus Inſu-
lani 722. auxilia afferendi edi-
ctum, auxiliorumque expo-
ſitionis praemium 359. eos
vitae reſtituendi conatus et
ſigna 541
Meſpili character botanicus
625 ſeq.
Metallifodinae, per eas aeris
circulationem obtinendi me-
dia et vſus 90 ſq. earum va-
pores noxii 92
Metallorum calcinatorum pon-
deris auſti cauſſae 463 ſeq.
fuſorum electricitas 25. 26
Meteorum igneum domum in-
cendens 458
Meyeriana ſententia de acido
pingui calcis viuae reſutata
481 ſeqq. 492 ſeq. deſenſa
484 ſqq. 489 ſqq. de ea ten-
tamina chemica 494
Microſcopia acad. Gottingenſi
a Rege Angliae donata
360 ſeq.
Miliaris febris puerperarum
critica, eiusque curatio 349
Miller, Phil. Londini obiit
158
Milui, auium ſpecies 513
Mineras ingeſto puluere py-
rio diſiiciendi methodus
emendata 24
Minervae ordo a Rege Angliae
conſtitutus 357
liene à Minguet, planta 248
Minuart, Iuan. obiit 545
Moehſen, I. C. W. *Verzeichniß
einer Sammlung von Bild-
niſſen*

nissen größtentheils berühmter Aerzte etc. 690

Monro's, Donald Treatise on mineral Waters Vol. I. II. 98

Monstrum gemellarum coalitarum 218. humanum biceps 333. absque manu dextra 596. vaccinum 144. duo monstra 715

Moraviae marchionatus societ. agriculturae thes. et praem. ad ann. 1772. 156

Morbilli putridi a 1763 et 1768 observati 396. eorum symptomata ibid. seq. curatio 397. iis medendi methodi Sydenhamianae defensio 401

Morborum decursus minus consueti 284 sqq. singularium sedes et causae 138. systematici symptomati classis, ordines et genera 448 sqq.

Morbus niger Hippocratis, num curabilis? 438. Plinianus, de eo casus 330. singularis a vapore boum recenter matatorum 72. Siamensis, eius stadia et symptomata 229. prognosis 230 sq. eo demortuorum extispicia 231 seq. curationis stadia et ratio 232 sq. morbi veterum obscuri 708. morbi rarissimi historia 715

Mortem subito ac violenter passorum seu ei proximorum remedia 147. 283. 359

Moschatae nucis olei aetherei analysis 472

Muci corporum nutritiui pro-

prietates et varietas 496. 500 sq.

Mucor crustaceus, erectus, albidus, corymbis globosis, nigris 8 seq.

Müller, Io. Christ. obiit 358. facult. med. Lipsiensi stipendium legavit ib.

Müllner, Wolfg. Iac. *Seltne und höchstmerkwürdige Wahrnehmung von einer sammt dem Kinde ausgefallenen Gebärmutter etc.* 480

Mundinus, primus scriptor anatomicus 693

de Murr, Chph. Gottlieb. versio latina et germanica Zoologiae britannicae indicatur 546

Murray, Io. Andr. reg. societatis oeconomicae Zellenfis socius 357. societ. oeconom. Bernensis socius 542

Musca vegetans, insectum 332

Muscorum vascula microscopio detecta 441

Musculi bicipitis aponeuroseos incisionis usus 404

Musculorum abdominalium rectorum intersectionum tendinearum usus 459

Myosotis scorpioides, eius usus 41

Myriophyllum spicatum 48. eius notae genericae 638

Myrmeleon formicarium, insectum 464 sq.

N.

Nahuys, Alexand. Petr. Diss. de qualitate noxia aeris in nosocomiis et carceribus eiusque remediis 254

- Narium consensus cum abdomine** 453.
- Nepetae plantae noua species** 305
- Nephritidis caussae** 713
- Nhandirobae, plantae vsus** 249
- Nidrosiensis societ. reg. scient. thes. et praem. ad ann. 1773.** 541
- Nitri vsus in haemoptoe** 399.
- murarii explicationi praemium constitutum** 356
- Noctua, auis, eius natura et visus** 515. **auditus exquisitissimi ratio ib. genus et species** 516
- Nolleffot, ab acad. reg. chir. Parisina praemium accepit** 353
- Nonne, Io. Phil. obiit** 158
- Norvegica reg. scient. societas vid. Nidrosiensis.**
- Nosocomiorum noxiae qualitatis aeris caussae** 255 sq. **correctionis remedia** 253
- Nostalgia, morbus** 450
- Noua acta physico medica academiae Caesareae Leopoldino Carolinae naturae curiosorum Tom. III.** 317
- Noui commentarii academiae scient. imperialis Petropolitanae Tom. XIII. ad ann. 1768.** 679
- Nucis aromaticae moschatae olei aetherei analysi** 472 sq.
- Nugent, Thom. obiit** 159
- Numida meleagris Linn. auis, eius historia** 521
- Nutritiui succi, seu muci proprietates et varietas** 496 sqq. 500 sq. **animalis principii diuersitas et indoles** 500 sq. **vegetabilis indoles** 501
- O.
- Oboensis episcopatus incolarum augmentum annis** 30. 19
- Obstetriciae artis compendium systematicum** 420. **systema** 343. **ei inferuentia instrumenta** 347
- Oculi structura in auibus** 507. **fabrica in tetrodone, pisce** 595. **carcinomatici extirpatio** 670. **tumor cysticus extirpatus** 407 sq. **iis obuersantium imaginum caussae** 667. **ocularii medici Romani** 705
- Oculorum morbi** 662 sqq. **morbi ex vitio abdominali oriundi** 453. **morbus singularis** 602
- Oculus mundi, lapis** 322 sq.
- Odontalgiae cum abdomine consensus** 454
- Oedematis curatio** 605. 615
- Oesophagi morbosa dispositio, vt causa deglutitionis laesae** 262. 266 sq. **eius curatio** 265. 273. **de ea observationes** 265 sq. 269 sqq. **per eum difficilis alimentorum ingestorum transitus caussae** 597. **paralyfi ope iniectionis alimentorum medendi modus** 219
- Oettinger, Ferdin. Chph. obiit** 158
- Oettinger, Io. Carol. professor medicinae extraord. Erfordiens.** 720
- Okes, Thom. versionem latinam**

nam Hippocratis editurus
est 361

Olei animalis Dippelii praepa-
rationis modi 584 sq. corti-
cum mali aurei Curassauici
indoles 471 seq. nucis mo-
schatae aetherei analysis 472.
plantae Arachis Linn. semi-
num vsus 654. feminum
fagi vsus 11. piperis nigri
feminum indoles 473 seq.
virtus 475. vitrioli destillan-
di methodus 478

Ophthalmiae differentia et cu-
ratio 665. 667. seroso ca-
tarrhalis curatio 318

Opium vis cardiaca affirmata 670
sq. De eius vsu monita pra-
ctica 671. vsus et abusus
in variis morbis ib. sqq. vsus
in cholera 434. in dolori-
bus sub partu spuris et post
partum 672. in moderan-
dis excretionibus 673. cum
laxantibus combinati vsus
672. largior vsus in spasma
maxillae 393 seq.

Opistotoni largiori opii vsu cu-
ratio 393 seq.

Opuli varietas 49. baccarum
vsus 40

Orbitae tumor cysticus exstir-
patus 407 seq.

Orchidum florum similitudo
cum insecto diptero 628

Ornithologiae imperfecta con-
ditio 506

Ossa fetus per anum excreta
600. permagna ad aggerem
Bommelsenem reperta 592.
in Sibiria 683 sq. in Ame-
rica septentrionali, eorum-

que origo et causae 647 sq.
eorum unitatis solutae obser-
vationes 609

Ossiculum veruecinum deglu-
tium vomitus cruenti leta-
lis causa 328

Ossis humeri capitis amputati,
ossisque partis magnae exfo-
liatae, a natura restitutio
644 seq.

Otis tarda, auis 519. tetrax
Linn. ib. eius variae aliae
species 520

Oua incubata, cum iis insti-
tuta experimenta 684. ouum
venti singulare 602

Ouarii hydrops singularis 14.
scirrhi in grauida 65

Ovium natura et ruminationis
mechanismus 94

Ouliera, arbor 248

Oxycocci baccarum vsus 40

Oxymellis colchici vsus in hy-
drope 217 sq. 640

P.

Palpebrarum pathologia 663 sq.
tumorum cysticorum diffe-
rentia et curatio 664. coa-
litionis curatio ib. palpe-
brae superioris relaxationis
curatio ib. retractionis cu-
ra ib.

Palpitatio cordis vid. Cor.

Paluzzi, de stupenda curatione
cancris mammae 122

Panaritii sedes et curatio 615

Panicum filiforme, planta 304
seq.

Pap de Fayaras, Ioseph. vid. Fa-
yaras.

Papillonii tabularum, ligno in-
cifarum

- cifarum, operis diiudicatio 702
- Papyri naturalis in Toscana reperiundae materiae origo 645 seq.
- Paracentesis, eam in hydrophthalmia instituendi tempus 667. eius in anasarca tempestive administrandae usus 395
- Paraphrenitidis symptomata 713
- Parisiensis reg. societatis quaest. et praem. ad ann. 1774 717
- Parisiis collegium medico pharmaceutico chirurgicum constitutum 537. sepulturae nimis subitae vetitae 161
- Parisiinae acad. reg. chirurg. thes. et praem. ad ann. 1773. 150. ad ann. 1774. 353. varia praemia distributa 353. facultatis med. thes. et praem. ad ann. 1772. 150. ad ann. 1774 718
- Parnassiae palustris usus 41
- Parotides febri acutae accedentes 226
- Partus, cur et quibus viribus fiat 57. conuulsiui historia 318. difficilis, de eo observationes et regulae 348. 422 sq. sani, quem post 17. dies alter secutus est, observatio 598. serotini casus 56. 196. eius criteria 56 sq. serotini illegitimi notae 58
- Passiflorae quaedam species 302
- Pauo cristatus et albus, aues 523. variae aliae eius species 524
- Pectoris cauitas, ex ea sanguinem extrauafatum fugendi methodus 32. hydrops sacculus 138
- Pennant, Th. Zoologiae britannicae versio latina et germanica indicatur 546
- Perdix, auium genus et species 524
- Pericardium, in eius cano effusio sanguinis letalis observata 404
- Peripneumonia, in ea pulsus cur debilis? 286. ei accedens inopinata viscerum abdominalium inflammatio 284. notha, eius natura et curatio 438 seq. pulmonalis et bronchialis 713
- Perficariae angustifoliae C. B. usus 39. 47
- Perspirationis insensibilis ratio 127
- Peruuiani corticis usus et noxa 246. usus et effectus in febribus intermittentibus 427 seq. in synocho non putri 431. usus nimius, ut caussa obstructionis aluinae et duriorum fecum 396
- Pes, praegressa gangraena, sponte delapsus 333 sq.
- Pestis, cur de illa scribendum sit? 292. eam ab aliis morbis distinguendi difficultas ib. eius definitio difficilis 293. cura sudatoria et antiphlogistica 294 sq.
- Petechiarum ratio symptomatica 294
- Petropolitanae acad. scient. novi commentarii Tom. XIII. 679. societatis oeconomicae quaest.

- quaest. et praem. ad ann.
 1773 718
 Pfutsch, Io. Henr. obiit 157
 Phalaena artubus destituta, nu-
 da et vermiformis 331. gla-
 bra et impennis, attamen pe-
 data ib.
 Pharmacopoea Danica 661.
 Heluetica 658
 Phascum, muscorum genus 440
 seq. eius species 442. ea-
 rum partium fructificationi
 inseruientium descr. 443
 Phasianis auis variae species 523
 Philosophical Transactions Vol.
 LIX. P. I. II. for the Year
 1769 641
 Phthiaseos initia et curatio 403
 Physicae observationes 65. 76
 Pians, vlcera venerea 238. 239
 Piccolomini, Arch. opus anato-
 micum, de eo defraudatio
 detecta 696 sq.
 Pigmenti flauis Neapolitani prae-
 paratio 71 seq.
 Pinuum cultura et vsus 22 seq.
 noxa ab insectis 23 seq.
 Piperis nigri seminum examen
 chemicum 473 sq. a caete-
 ris aromatibus differentia
 474
 Piscis marinus albus 596
 Piscium calor, de eo experimen-
 ta 681. vasorum lymphati-
 corum systema explicatum
 651. putrefactio vt caussa
 splendoris aquae marinae
 656 seq.
 Placentae cum vtero adhaesio-
 nis modus 345. cum vtero
 circulus humorum negatur
 422. in ea circuli sanguinis
 ratio 345. eam extrahendi
 modus et regulae 346 sq.
 Plantae, earum classes emen-
 datae 621. genera mutata
 et emendata 42 sqq. 622 sqq.
 species nouae 51 sqq. 302.
 303. 305 seq. mutatae et
 emendatae 46. 50 sq. 446 sq.
 629 sqq. varietates 46 seq.
 affinitas probata 638 sq. va-
 sorum differentia et structu-
 ra 312 sq. 316. eas super
 mare transportandi modus
 527 sq. agri Isenacensis 338.
 Belgio noxiae, earum disqui-
 sitioni praemium expositum
 153. Sconiae 21 sq.
 Plantula sylvulam referens, ex
 capsulis seminalibus con-
 stans 8
 Plenck, Ioseph. Iac. *Sammlung
 von Beobachtungen über einige
 Gegenstände der Wundarzney-
 kunst, zweyter Theil* 31
 Pleurae inflammatio et sensibi-
 litas 288
 Pleuritidis diuifio 713
 Pleuroperipneumoniae letalis
 exempla 284 seqq. extirpi-
 cia 285 sq.
 Polemonii coerulei vsus 41
 Polentae decocti praeparatio
 407. vsus in vlceribus foeti-
 dis 399. 407
 Polygonum, eius species emen-
 datae et definitae 50. va-
 rietates 47. vsus oeconomi-
 cus et medicus 39. auicu-
 lare 48. 50. tataricum 49
 Pomorum syluestrium vsus in
 contagio bouino 547
 Bbb 5 Porcel-

- Porcellana vasa spuria (Fayence)*
parandi modus 464
- Potamogeton heterophyllum* 445
- Pouffierii merita in acad. scient.*
Diuionensem 457
- Poupe Desportes, Io. Bapt.*
Renat. Histoire des maladies
de S. Domingue Tom. I. II.
Traité ou Abbregé des plantes
vsuelles de S. Domingue
220. eius vitae descr. 221
- Psidii pyriferi fructus innocuus*
299
- Pterocarpus Americana, arbor*
15
- Puerperarum morbi, de iis monita* 349. febris miliaris distinctio 423. eadem critica 349 maniae casus 212
- Pulmonia, morbus, eius distinctio* 242
- Pulmonis cum pleura concretio frequens* 286. vulnus cum dilaceratione arteriae intercostalis sanatum 208
- Pulsatillae nigricantis aqua destillata et extractum* 530. horum virtus 534. extracti et infusi effectus 531. 534. vsus in variis morbis experimentis probatus 531 sqq. in morbis oculorum 533 sq.
- Pulsus crises varias praenuncians* 204
- Pulueris, corruptionem arcen- tis, examen* 274. hypnotici praeparatio et vsus 582 sq.
- Puris genesis ratio* 498. metastasis singularis post ictum capitis ad abdomen facta 460
- Putredinem arcen- tis pulueris examen* 274
- Putridae constitutionis causa* 432. stadia 433. curatio ib.
- Pygargus, aquilae species* 511
- Pyrii pulueris diuersa vis et praestantia* 77
- Q.
- Quartanae febris medendi methodus* 613
- Quercus species diminutae* 634 seq.
- R.
- Rabies canina, in ea remedia* 148
- Rachitidis curatio* 424
- Radix Indica, a Io. Lopez denominata, eius descr.* 475. vsus in alui profluuiis ibid. examen chemicum ib. sq.
- Rahn, Io. Henr. de miro inter caput et viscera abdominis commercio* Diff. inaug. 451
- Raisnier, arbor* 248
- Relazione sincera della portentosa guarigione di un cancro esistente nella mammella sinistra della Sgra Parolini* 122
- Renes insolitae magnitudinis et formae* 77
- Resinae elasticae Cayanensis dissolutionis et reductionis modus* 90
- Resonitus vid. Contrafissura.*
- Resorbentium vasorum origo, natura et fines* 686 seqq.
- Rheumatismi sedes, distinctio et a catarrho differentia* 612
- Rhino-

- Rhinocerotis caput et pedes
in Sibiria reperta 362. cran-
nium, cornua et dentes 683
- Rhododendri pontici vsus 41
- Ribium duo semina come-
sta cum vrina effluerunt
715
- Richerz, Georg. Frid. obiit 721
- Rickmann, Christ. obiit 157
- Rifus fardonii caussa 453 seq.
est symptoma in paraphre-
nitide 713
- Rosarum species definitu diffi-
ciles 633 sq.
- Rothomagensis academiae sc.
et elegant. lit. et art. quaeft.
1773 et praemia 716 sq.
- Rouffagnac, Io. Franc. Guel-
bert, ab acad. reg. chir.
Parifina praemium accepit
353
- Roux, A. Journal de Méde-
cine, Chirurgie, Pharma-
cie cet. Tom. XXVII. et
XXVIII. 195
- Rubor sanguinis vnde? 499
- Ruminationis mechanifmus in
ouibus 94
- S.
- Sacchari culturae historia 252.
culturae ratio in infula S. Do-
minici 252 sq. depuratio-
nis et praeparationis modus
253. fpiritus, per fermenta-
tionem parati, vsus ibid. ab-
vsus cauffa fcorbuti 246
- Sagar, Io. Bapt. Mich. fyfte-
ma morborum fyptomati-
cum fecundum claffes ordi-
nes et genera 448
- Sal ammoniacus vid *Ammonia-
cus*. aromaticus natiuus ex
oleo corticum mali aurei
Curaffauici 471 sq. eius in-
doles ibid. feq. indiffolu-
bile ex infuso feminum oleo-
forum 649. metallicum coe-
ruleum ex cupro 66. falia
ex cineribus vegetabilium,
de iis experimenta 79
- Salab, radicem praeparandi mo-
dus 641
- Salicis specierum cognitio dif-
ficilis 635
- Salinae Noruegiae, de iis ob-
feruata 7
- Sanguis, eius natura et indo-
les nutritiua 497 feq. ba-
fis mucofa, de ea experi-
menta ibid. rubor vnde?
499. principium volatile
quid? ibid. cruftae pleuri-
ticae genesis 498 feq. in
cauum pericardii effufio le-
talis 404. extrauafati ex
pectoris cauitate fugendi
methodus 32. ex vafis emis-
fus num reforberi cordis-
que impulsiui fubiici rursus
poffit, negatur 259 feqq.
eius ex vena miffi inflam-
mati figna 279. cruftae in-
flammatoriae origo et gene-
fis 277 feqq. 428. fanguifi-
catio 712
- Saponum historia, natura et
differentia 332 feq.
- Sarcoma circa cardiam 597 feq.
infigne ad linguam 24 an-
nos ex ore dependens 350 sq.
eius extirpatio 351. ortus
cauffae 352
- Saturninorum remediorum vsus
et historia 604. 610
- Saxi-

- | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| Saxifragae bronchialis et crassifoliae usus | 42 | Secale vernum vastans erucae | 24 sq. recens eius usus notius | 148 |
| Scabies in insula S. Dominici frequens | 241 | Seelandina societas scient. et artium vid. <i>Vlissingensis</i> . | | |
| Scarificationis in hydropicis modus et usus 396. in peste usus | 296 | Selenitis origo et formatio | 80 | |
| Scelotyrbes Plinii casus | 330 | Selteranarum aquarum analysis 388. vires et usus | 389 | |
| Scheid, Frid. Aug. medicus Petropoli vocatus | 161 | Semina conseruandi, ficcandi et super mare transportandi modi 527 seq. eorum corruptionis signa ib. | | |
| Schleger, Theod. Aug. obiit | 721 | Seminalium vesicularum vasa resorbentia | 688 | |
| Schoenus compressus, planta | 22 | Seminis virilis resorptio declarata 688. resorptio per venas ex vtero et vagina | 344 sq. | |
| Schreber, Ioh. Christ. Dan. de phasco observationes 440. spicilegium florae Lipsicae | 444 | Senkenberg, Io. Christ. mortuus | 544 | |
| Schroeder, Phil. Georg. obiit | 159 | Sennensis acad. scient. physico criticorum acta Tom. III. | 134 | |
| Scirrhi glandularum inguinalium extirpatio 319 sq. vteri tractatio | 349 sq. | Sepulturae subitae Parisiis vetitae | 161 | |
| Sclopetaria aqua vid. <i>Aqua</i> . | | Sibiriae plantae | 37 | |
| Sconiae plantae | 21 seq. | Sidae species nouae | 302 | |
| Scopoli, Io. Ant. Flora Carniolica, Edit. 2. aucta Tom. I. II. | 619 | Sidren, Ionas, Diff. inaug. de partu ferotino | 55 | |
| Scorbuti natura et curatio | 237 | Sigilla medicorum oculariorum | 705 | |
| Scriptorum physico medicorum, quae an. 1764 prodierunt, indicis supplementum alterum 162 sqq. indicis de a. 1765. supplementum 182 sqq. index de a. 1770. 363 sqq. eius continuatio | 547 sqq. 726 | Siler Rivin. plantae genus | 624 | |
| Scroti abscessus a vulnere sclopetario | 321 | Simiae species singularis | 646 | |
| | | Sinus maxillaris morborum causae et diagnosi 196. 199. eos ope iniectionis per nares curandi modus et observationes | 197. 199 | Sify- |

- Sifyrinchii character naturalis genericus 329
- Sodae, ex herba Varech paratae, analysis 84 sq.
- Solani dulcamarae vsus 41
- Soporosi affectus sympathici ex abdomine oriundi 455 sq.
- Sorbi aucupariae baccarum vsus 640
- Spasmus maxillae vid. *Maxilla*.
- Sphaceli ficci casus 333 sq.
- Spica fecalina ex abscessu in musculis glutaeis protracta 327 sq.
- Spinachia foliis triangularibus, ex sinuato dentatis 51 sq.
- Spiritus vini in morbis chirurgicis vsus et abusus 36
- Spongiae vstae vsus in strumis 659
- Springsfeld, Gottlieb Car. obiit 159
- Stahl, Georg. Ern. obiit 544
- Stannum natium in Cornubia repertum 645
- Staphylomatis cura de ea monita 667
- Statices armeriae structura 637
- Steatites, an terra miraculosa Saxoniae talis sit? 336
- Stella lambens, domum accendens 458
- Stellerae, plantae vsus 39
- Stoerck, Ant. libellus de vsu medico pulsatillae nigricantis 530. successor B. Gerard. van Swieten 157
- Strack, Car. observationes medicinales de colica pictorum maximeque ob arthritidem 674
- Strix Linn. avis species 516
- Struthionis, avis natura et anatome 516 seq. variae species 517
- Submersi vid. *Merfi*.
- Sucrier arbor. vid. *Arbor*.
- Suecicae acad. reg. scient. acta ad a. 1769. Vol. XXX. 3
- Suffocatis medendi modus et auxilia 148. 359. de iis observationes 283
- Sugillationum natura et discussionis ratio 261
- Sulphur auripigmenti vid. *Auripigmentum*.
- Superfetatio, de ea casus 598. in equa 88
- Suppuratio interna, de ea monita 600
- Suttonianae machinae vsus ad correctionem aeris 258
- Swedenborg, Emanuel. mortuus 158
- Swertiae dichotomae et corniculatae character 44
- van Swieten, Gerard. L. B. obiit 159. ei Viennae ab Imperatrice monumentum exstructum 543
- Symphyti tuberosi ab officinali distinctio 304
- Synochi non putris natura, causae et curatio 430 seq. putris natura et periodi 433
- T. Tabaci

T.

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tabaci clysteribus inseruiens instrumentum 473</p> <p>Tabidorum curatio 400. 402</p> <p>Taenia, contra eam remedium 210</p> <p>Taffiae, sacchari spiritus vsus 253</p> <p>Tartari acidum vid. <i>Acidum</i>. terra foliata <i>Terra</i>.</p> <p>Taylor, Io. obitus 159</p> <p>Telluris superficiei mutatio 16 sq. 18</p> <p>Temperamentorum species 235 melancholici explicatio 236</p> <p>Tendinum insensibilitas 405</p> <p>Tenesmi curatio 240</p> <p>Tenthredinum historiae supplementum 325</p> <p>Terra foliata tartari, eius differentia 326. praeparationis modus 327. miraculosa Saxoniae an steatites 336. eius locus natalis ibid.</p> <p>Terrarum fusio ope ignis carbonum 81</p> <p>Teske, Io. Godofr. mortuus 158</p> <p>Testaceorum animalium fabrica organica et natura animalis 75</p> <p>Testiculi humani fabrica 144. peculiaris membrana 141. scirrhusi extirpatio 238</p> <p>Testudinis systema vasorum lymphaticorum 650</p> <p>Tetani natura, causae et curatio 35 seq. 202. 209. 242 sq.</p> | <p>maxillae inferioris causa et curatio 614</p> <p>Tetrao vrogallus Linn. avis 521. tetrrix Linn. 522. bonalia ib. lagopus Linn. ib.</p> <p>Tetrodon laevis compressus, piscis 593. eius anatomica descr. ib. sqq.</p> <p>Theae semina per mare transvehendi modus 527</p> <p>Theden, Io. Christ. Ant. <i>Neue Bemerkungen und Erfahrungen zur Bereicherung der Wundarzneykunst und Medicin</i> 604</p> <p>Thermae, earum dispositio systematica 114 seqq. in insula S. Dominici 250 seq. earum effectus, vsus et noxa 251</p> <p>Thermometricae observationes de calore hominis et animalium 680 seq.</p> <p>Thouvenel, Petr. de corpore nutritiuo et de nutritione 496</p> <p>Thymus, planta camphorifera 476</p> <p>Tibiae fractura in grauida post partum demum occallescent 410</p> <p>Tolosanae acad. scient. thes. et praem. ad ann. 1775. 537</p> <p>Torpedinis piscis vis electrica 360</p> <p>le Touyou, avis 517</p> <p>Tralles, Balth. Ludou. responsio ad Ludwigii disquisitionem de vi opii cardiaca 670</p> <p style="text-align: right;">Trans-</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Transactiones philosophicae
Vol. LIX. | 641 | Vaccinii baccarum vsus | 40 |
| Tremellae motus singularis | 86 | Valerianae dioicae structura | 636. officinalis varietas 49. |
| Trepanationis in variis locis,
praeter cranium, et morbis
vsus | 609 | vsus antepilepticus | 39. 639. |
| Triticum, eius substantia nu-
triciens duplex 502. spica
multiplici | 8 | Valsa, plantarum genus | 629 |
| Trollii europaei varietas | 47. | Valuulae Eustachianae descr.
anatomica 142. 616sq. 618. | |
| vsus | 42 | vsus | 617 |
| Tromsdorff, Guil. Bernh. prof.
med. ord. Erford | 157 | Vaporosus affectus vid. <i>Hyste-
ricus</i> . | |
| Tumoris carcinomatici in collo
exstirpatio 463. cystici in
orbita exstirpatio 407 seq.
inguinalis scirrhusi excissio
et per ligaturam destructio | 319 seq. | Vaporum in metallifodinis no-
xa 92. letiferorum in cauer-
nis naturae et effectuum dis-
quisitioni praemium exposi-
tum | 540 |
| Turbinis marini caussa electri-
ca | 82 sq. | Varicosum aneurysma | 408 |
| Tussis spastico hypochondriaca
cum febre maligna compli-
cata, 329. conuulsivae in-
fantum curatio 216. Lon-
gosalissae a. 1768. et 1769.
epidemicae diagnosi 131.
causae et curatio 132 seq. | | Variolarum inoculatio vid. <i>In-
oculatio</i> . fetus in vtero ob-
servatio 596. fetus in vte-
ro iis affici posse negatur
417. verarum bis in homi-
ne observatarum ratio 586
seq. exempla varia 587 sq.
Diuioni malignitas 459. ra-
tio in nigritis 226. cum fe-
bre verminosa complicata-
rum periculum ib. sedes an
in sola cute? 411 seqq. af-
firmatur 414 seq. sedis in
cute caussa consistit in aeris
liberi accessu 415. sedes spe-
ciatim in corpore mucoso
Malpighiano 417. curatio,
de ea monita 413 sq. 417 sq.
febris triplex 418. regimi-
nis circa eruptionem ratio
416. artificialium prae na-
turalibus praestantia 60.
verarum a spuris discrimen
62. iis demortuorum dis-
sectio | |
| Typhon, meteoron, eius caussa
electrica | 82 sq. | | |
- V.
- | | |
|-----------------------------------------|-----|
| Vacca cultrum sine noxa de-
glutians | 12 |
| Vaccarum nutrimentum | 6 |
| Vaccini fetus caput monstro-
sum | 144 |

- sectio et extispicia 412 seq.
ab iis internae partes cur
immunes sint? 416 sq. ge-
nus duplex 418. vmbilica-
tarum ratio et degeneratio-
nis species 418. vesicula-
rium ratio 419. benignita-
tis notae ib.
- Variolosorum signa verminosa
414
- Vasorum in arboribus differen-
tia et structura 312 sq. 316.
lymphaticorum et resorben-
tium ortus 689. connexio,
progressus et fines 686.
structurae vtilitas ib. lym-
phaticorum vrethrae et colli
vesicae descript. 655 sq. lym-
phaticorum systema in am-
phibiis et testudine 650 sq.
in piscibus 651
- Vegetabilis victus principium
nutriens diuersum 501
- Vena medinensis, morbus ni-
gritarum 245. venae cauae
morbus acutus apud Are-
taeum 709
- Venaesectionis vsus in feбри-
bus biliosis 435. in ischia-
de neruosa 128. in peste
295 seq. vsus et abusus in
gravidis 422. in morbillis
397. in pede vsus prae
illa in brachio 246. de eius
vsu et abusu monita ib.
- Veneni effectus infringendi
modus 536
- Venereae luis cum elephan-
tiasi analogia 34. natura et
curatio in insula S. Domi-
nici 238 sqq. curatio ope
mercurii 34
- Veneris immodicae noxa 213
- Veneris per solem transitus d.
3. Iun. 1769. de eo phae-
nomenon in Suecia obserua-
tum 17.20
- Ventriculi morbi in cadauere
repti 597 seq. conditio
morbosa singularis 272. per-
foratio letalis ab officulo
veruecino deglutito 328. vul-
nus futura pellionum cura-
tum 208
- Verbasci nigri varietas 50.
vsus 41. thapsi vsus in mor-
bis boum 639
- Verhandeligen uitgegeeven
door de Hollandsche Maat-
schappye de Weetenschap-
pen te Haarlem. XI. Deel.
262. XII. Deel 579
- Verminosa signa 290. in va-
riolosis 414
- Verminosae febris ratio 289 sq.
signa 290
- Verminosus animalium morbus
contagiosus 228
- Vermis in glottide infantis re-
pertus 245
- Vernalium morborum natura
et sedes 425
- Versio in partu, de ea monita
422
- Vesalii merita in anatomen et
iconum praestantia. 694
- Vesica vrinaria vid. *Vrinaria*.
- Vesicatoriorum vsus in ischiade
neruosa 130. in peripneu-
monia

- monia notha 438 seq. in pleuritide aliisque morbis 459. in variolis 413. 418. in viscerum inflammationibus et morbis gangraenosis 413. vsus et abusus in febribus putridis et biliosis 435. vsus iteratus in pleuritide 413
- Vesiculae felleae. defectus in cadauere 244. incisio et extirpatio in cane et fele 206. in ea lumbricus reperi- tus 713
- Vesuuii eruptio et ortus 643. lapides, ex quibus constat et quae corpora furibundus eii- cit 67 sq. lauae disquisitio chemica 68
- Veterinariae artis progressus Mediolani 547
- Viburni opuli varietas 49. vsus 40
- Vigiliae chronicae curatio 583
- Viola acaulis foliis digitatis 53. quaedam, cuius radix ipecacuanhae albae substi- tuenda 247
- Vilus sedes in tunica choro-idea 663. ratio in auibis 507. in noctuis 515
- Vitrioli oleum vid. *Oleum*.
- Vlcera crurum sanandi modus 405
- Vlissingensis societ. artium et scient. thes. et praem. ad ann. 1773. et 1774 538 sqq. 716
- Vmbellatarum plantarum cha- racter a semine 623 sqq.
- Vmbilicus, per eum vrina ex- creta 581
- Tom. XVIII. P. IV.*
- Vnguenti helcotici vsus in can- cro 123. vnguentariae the- cae opercula 705
- Vnguis regeneratio in muti- lato digito 200
- Vnguium secessus periodici spontanei et regenerationis casus 653
- Vogel, Zachar. obiit 158
- Voluulus intestini ilei 599
- Vomitus cruentus letalis a de- glutito officulo veruecino 328
- Vrachi structura 579 sqq. vsus 581
- Vrethrae vasa lymphatica 655. carnositatum natura et cu- ratio 243. vulnus circa bul- bum eius, per grandines plumbeas inflictum et sana- tum 326
- Vrinae caloris gradus 681. ex- cretio per vmbilicum obser- vata 581. resorptio affirma- ta 689
- Vrinariae vesicae duplicis obs. 88. ruptura in grauida 391. 409. vasa resorbentia 689. colli vasa lymphatica 655 sq.
- Vstionis vsus in ischiade ner- uosa 130
- Vteri inuersionis casus 601. inuersio letalis 409. fundi inuersi amputatio et cura- tio 589 seq. ruptura ad fi- nem grauiditatis 216. scirr- hi tractatio 349 seq. liga- mentorum rotundorum vsus 343. grauidi cum fetu pro- cidentiae casus 480. eius repositio 481. descensus ac polypi distinctio ib.
- Ccc Vucae

Vuae oculi corneae accrescentis cura 667

Vulnera cranii; de iis observationes 609. fracto vitro facta tractandi modus 201. sclopetaria, eorum tractatio et deligatio 610

Vulnus regioni pubis glande plumbea inflictum, subsequente glandis per anum reiectione 321. per grandines plumbeas circa bulbum vrethrae inflictum et sanatum 326

Vulturum ordo, character et species variae 512

Vulvariae olei destillati vsus in hysteria 450

W.

Walchii, Io. Ern. antiquitates medicae selectae 705

Wells, Io. Iac. *Rechtfertigung der Blackischen Lehre von der figirten Luft etc.* 492

Wiegles, Ioh. Christ. *Verteidigung der Meyerischen Lehre vom acido pingui* 489

Woenfel, P. medicus Petropolin vocatus 161

Wohlfarth, Io. Aug. prof. med. extraord. Halae est factus 721

X.

Xylophthorus, insectum, eius coitus dubius 332

Xylostei, olei vsus 40

Y.

Yellow-Fever. Anglorum vid. *Morbus Siamensis.*

Z.

Zellenfis societ. reg. electoral. scient. thes. et praem ad ann. 1773 156 seq.

Zinci florum actio, vsus et vis antispasmodica 478

Zinniae multiflorae icon 301

Zonneviseh vid. *Tetrodon.*

Zoologiae Britannicae versio latina et germanica indicatur 546

Zoophytorum nouum genus 466. eius descriptio et dissectio 467 sq.

Zückert, Io. Fridr. *Abhandlung von der Luft und Witterung und der davon abhängenden Gesundheit der Menschen* 124. editionem nouam operis de fontibus medicatis. Germaniae molitur 545. editionem nouam materiae medicae Loeseckii curauit 722

E M E N D A N D A.

Pag. 14. lin. 29. pronaeo lege perinaeo. p. 16. lin. vlt. manna
l. magna. p. 47. lin. 4. earum l. eorum. p. 56. lin. 1. multum
l. nullum. p. 57. lin. 31. fauet l. fauent. p. 58. lin. 7. Paucis
l. Paucas. p. 69. lin. 6. eruena l. eruenda. p. 75. lin. 10. ce-
teterisque l. ceterisque. p. 80. lin. 13. gallorum l. gallarum.
p. 90. lin. 16. solutioem l. solutionem. p. 92. lin. 19. Agitatur
l. Agitur. p. 96. lin. 33. harum l. horum. p. 97. lin. 11. fieret
l. fieret. p. 101. lin. 14. Freuirensi l. Treuirensi. p. 116. lin.
17. Venetae l. Veneta. p. 119. lin. 21. impregnatae l. imprae-
gnatae. p. 136. lin. 2 et 3. corrigenguntur l. corriguntur.
p. 160. lin. 1. chirurgici l. chirurgicae. p. 166. lin. 10. 1746.
l. 1764. p. 171. lin. 2. solidaire l. solitaire. p. 174. l. 3. huma-
nae l. humano. ibid. lin. 34. perfectionnet l. perfectionner.
p. 179. lin. 26. STORY l. STÖRK. p. 181. lin. 20. vtilitates l. vti-
litate. ibid. lin. 21. tio l. Differtatio. ibid. lin. 23. 3. l. 4to.
p. 189. lin. 20 of seeds deleatur. p. 192. lin. 17 et 18 guariri-
gione l. guarigione. p. 199. lin. 10. candidi l. candentis.
p. 215. lin. 1. erupta est l. erupit. p. 217. lin. 11 et 12. tumo-
res herniosos l. tumoribus herniosis. p. 221. lin. 1. POUFPE
l. POUPE. p. 222. lin. vlt. deteriores l. deterioris. p. 223.
lin. 10. quo l. qua. p. 227. lin. 14. insultis l. insulis. p. 229.
lin. 12. primarium l. primariam. p. 232. lin. 21. tantem l. tan-
dem. p. 234. lin. 28. feratus l. ferratus. p. 237. lin. 24. cuius
visceris l. cui. p. 238. lin. 13. videtur l. videntur. ibid. lin. 25.
affectus l. effectus. p. 248. lin. 33. foetum l. foetam. p. 254.
lin. 9. indigeat l. indigent. p. 256. lin. 7. ventri l. ventris.
ibid. lin. 12. coercerendos l. coercendos. p. 257. lin. 22. ne-
glecta renouatio l. neglectam renouationem. p. 259. lin. vlt.
negandum. l. negandam. p. 263. lin. 15. natum ortis l. natis,
ortum. p. 278. lin. 29. p. 266. l. p. 396. p. 281. lin. 19. quae-
stionem l. quaestionum. ibid. lin. vlt. Vol. XVI. l. Vol. XIV.
p. 283. lin. 13. pulmonibus l. pulmones. ibid. lin. 19. spasticae
l. spastice. ibid. lin. vlt. p. 174. l. 147. p. 285. lin. 18. erant
l. erat. p. 287. lin. 2. veteris l. veterem. p. 290. lin. 34. na-
turalis largiendam l. naturalem largiendam. p. 298. lin. 29.
quadridendato l. quadridentato. p. 304. lin. 4. medicae l. me-
diae. ibid. lin. 27. flore l. flores. p. 317. lin. 14. post pl. 16.
adde 4to. p. 327. lin. 12. necessaroi l. necessario. p. 330. lin.
24. vulnerata l. vulnerato. p. 337. lin. 4. p. 4. l. p. 115. p. 338.
lin. 28. variae l. varie. p. 341. lin. 11. Alias l. Aliis. p. 345.
l. 17. funiculi vmbilicalis l. funiculo vmbilicali. p. 346. lin. 9.
hebdomate l. hebdomade. ibid. lin. 20. appellant l. appellat.
p. 361. lin. 26. latinum l. latinam. p. 374. lin. 17. färga l. fräga.

Pag. 374. lin. 20. Ar. 1869. l. Aor. 1769. p. 388. lin. 5. hebdomatibus l. hebdomadibus. p. 392. lin. 1. conferua l. conferuae
 ibid. lin. 12. GUILIEKMO l. GUILIELMO. p. 394. lin. 12. hebdomatibus l. hebdomadibus. ibid. lin. 22. epistotonus l. opistotonus. p. 396. lin. 16. succurendum l. succurrendum.
 p. 403. lin. vlt. offerebant l. offerebat. p. 407. lin. 25. superiori l. inferiori. p. 413. lin. 30. disquirere l. disquireret. ibid. lin. 34. transire l. transirent. p. 423. lin. 27. explicat l. agit.
 p. 441. lin. 15. circumdatum l. circumdatam. p. 444. lin. 9. Quem l. Quam. ibid. lin. 23. occurentes l. occurrentes. p. 457. lin. 17. adde 8. p. 475. lin. penult. affussa l. affusa.
 p. 477. lin. 4. cinnanomaea l. cinnamomaea. p. 478. lin. 23. ophthlmiis l. ophthalmiis. p. 481. lin. 29. I. C. R. l. S. C. R. p. 482. lin. vlt. Vnd l. Vnde. p. 489. lin. 31. explicare l. explicari.
 p. 490. lin. 13. Magbridiano l. Macbridiano. p. 495. lin. 15. refinofum l. resinofum. p. 506. lin. 16. nostri l. nostrae. p. 511. lin. penult. differant l. differant. p. 513. lin. 20. Fallo l. Falco. p. 516. lin. 15. cerolinensis l. carolinensis. ib. lin. 28. species l. specie. p. 517. lin. penult. viridiscendem l. viridescentem. p. 519. lin. 12. eorum l. earum. ib. lin. 22. Buffoniani l. Buffoniana. p. 520. lin. vlt. alati l. allati. p. 521. lin. 9. aatatis l. aetatis. ibid. lin. 10. domesticae l. domestica. p. 522. lin. 19. confundunt l. confunduntur. p. 527. lin. vlt. metallinis l. metallicis. p. 530. lin. 26. pharmacopei l. pharmacopoei. p. 542. lin. 26. Berolini l. Berolinum. p. 545. lin. 19 et 24. Montpeiller l. Montpellier. p. 547. lin. 18. scripto physicorum l. scriptorum physico. p. 557. lin. 25. Vorbaungs l. Vorbauungs. p. 564. lin. vlt. Hauswirthschaft l. Hauswirthschaft. p. 573. lin. 20. Beschreibung. l. Beschreibung. ib. lin. 29. ROCH l. KOCH. v. p. 160. p. 581. lin. penult. vesicam l. vesicam. p. 583. lin. 26. de cente l. cedente. p. 587. lin. 23. attentus l. attenta. p. 588. lin. 4 et 5. Nostro eorum l. auctoris. p. 591. lin. 10. 11. partim l. partem. p. 594. l. 4. duobus l. duabus. p. 597. lin. 6. patiebatur l. patiebantur. ib. lin. 7. videbantur l. videbatur. ib. lin. 8. 1760. l. 1769. ib. lin. 14. difficili l. difficili. p. 619. lin. 24. Carniolicae l. Carnioliae. p. 624. lin. 10. alae l. alas. p. 627. lin. 15. stypitatus l. stipitatus. p. 637. lin. vlt. Europaea l. Europaei. p. 645. lin. 7. frustra l. frustra. p. 646. lin. 24. a l. ad. p. 649. lin. 15. obtineri l. obtinere. ibid. lin. 27. Ian. l. Iun. p. 651. lin. 1. sinistram l. sinistram. ib. lin. 11. ommittimus l. omittimus. p. 652. lin. 9. ian. l. iun. p. 659. lin. 16. mercurialis l. mercuriali. p. 680. lin. 18. quae l. quas. p. 697. lin. 22. praemantur l. premantur. p. 703. lin. vlt. delineatonibus l. delineatoribus. p. 704. lin. 15. qui l. quae.
